

COMUNICACIONES BOTANICAS DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

Número 35

1958

Volumen III

CALYTRANTHES HATSCBACHII SP. NOV. (*)

C. DIEGO LEGRAND

Arbor eximia, ramis ultimis dichotomis v. trichotomis, ramulisque bialatis, glabra. Folia opposita, chartacea, petiolata, (petiolo alato 1,5-2 mm.) obovata, breviter et rotundato-acuminata, basi cuneata et in petiolum decurrentia, supra viridia, avenia, subtilissime impresso-punctata, obscurissime pellucida, subtus pallida, nisi nervo medio prominente venis inconspicuis, punctulis ornata, 25-35 mm. long., 11-16 mm. lat.; nonnunquam apicalia angustiora sunt, oblonga usque lanceolata et longe acuminata, 30-35 mm. long. et usque 9 mm. lat.

Paniculae usque ad 5 cm. long., ramis oppositis v. suboppositis 2-3 cm. long. flore singule terminali instructis, raro ramificatis v. dichotomis, ad axillas superiores biseriatae, 3-12-florae. Alabastrum 4 mm. alt., ebractecolatum obovatum, calyptra hemisphaerica subapiculata, obtusa, post anthesin seggregatum; tubo caliceinale basin versus vix pilosulo et supra germen valde producto. Ovarium biloculare, loculis biovulatis; stylus ca. 6 mm. staminis plus minusve aequans.

Arbol de unos 20 m. de alto, glabro, con ramos últimos ramificados dicotómica o tricotómicamente y ramitos jóvenes bi-alados. Hojas opuestas obovadas, con el ápice breve y obtusamente acuminado, cuneada hacia la base y decurrente en el peciolo de 1.5-2 mm.; la lámina mide 25-35 mm. de largo por 11-16 mm. de ancho; a veces el par de hojas apicales es de forma oblonga hasta lanceolada, con acumen mucho más alargado, alcanzando solamente hasta 9 mm. de ancho por el mismo largo que las inferiores.

Las venas son inconspicuas en ambas caras y sólo sobresale el nervio central en la cara inferior. La cara superior de color verde, ofrece glándulas impresas pequenísimas, muy difícilmente visibles al trasluz


(*) Especie dedicada al insigne colector botánico del estado de Paraná, Gert Hatschbach.

y en la cara inferior que es pálida, sobresalen apenas en color negrozco.

Panículas biseriadas en cada axila de la extremidad de los ramos, llegando a los 5 cm. de largo; sus ramos son opuestos o subopuestos, midiendo 2-3 cm. de largo y terminados en una sola flor, raramente subramificados. Alabastro ebracteolado de unos 4 mm. de alto de forma obovada o en forma de copa después de la antésis y con una caliptra hemisférica obtuso-subapiculada; el hipantio se eleva 1,5 mm. sobre el nivel superior del ovario. Estilo de unos 6 mm., más o menos del mismo largo que los estambres. Ovario bilocular con lóculus bi-ovulados.

Brasil. Estado de Paraná, Campiña Grande do Sur, Campininha, leg. Hatschbach 3466 (Typ, MVM).

Obs. — Especie afín a *Ca'yptranthos obovata* Kiaersk. de la que se diferencia netamente por su glabrieie y sus ramitos bialados, principalmente. De *C. obversa* Berg, se diferencia por el tamaño mucho menor de sus hojas, su glabrieie, su alabastro ebracteolado, etc.



Calyptranthes hatschbaecli sp. nov.
Ramo florífero ($\times \frac{1}{2}$)
Alabastro con el opérculo a un lado ($\times 5$)
Alabastro corte sagital ($\times 5$)