FIG. 1. — Mapa del Uruguay con las principales localidades señaladas en el texto



FIG. 2. — Los Distritos Zoogeográficos de América del Sur según Cabrera y Yepes (1940:14).

Orden SPHENISCIFORMES

Familia SPHENISCIDAE

Eudyptes crestatus crestatus (J. F. MILLER)

Pingüino de penacho amarillo

Aptenodytes crestata J. F. MILLER, 1784, Var. Subj. Nat. Hist., *9*, pl. 49. (Islas Malvinas).

Eudyptes chrysocome nigriventris DABBENE, 1920, p. 8; TREMOLERAS, 1927, p. 17; BARATTINI, 1945, p. 14.

Eudyptes crestatus crestatus HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 7-8; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos; raro, no todos los años).

Distribución: Nidifica en la Tierra del Fuego, alrededores del Cabo de Hornos y en las Islas Malvinas. En invierno emigra al norte hasta Buenos Aires en la Argentina y al Uruguay.

Notas: Los ejemplares de la colección del M.N.H.N. proceden de Montevideo (24 de junio de 1957) y Cabo Polonio, Dpto. de Rocha (julio de 1960). También fue observado el 8 de julio de 1956, en la orilla rocosa al oeste de la Barra del Ao. Maldonado, Dpto. de Maldonado.

Spheniscus magellanicus (I. R. FORSTER)

Pingüino común o de Magallanes
Pájaro bobo o pájaro niño

Aptenodytes magellanica I. R. FORSTER, 1781, Comment. Phys. Soc. Reg. Sci. Gotting., *3*, p. 143. pl. 5. (Estrecho de Magallanes).

Spheniscus magellanicus TREMOLERAS, 1920, p. 12; WETMORE, 1926, pp. 42-43; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 171-172; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 11-13; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos; todos los inviernos).

Distribución: Nidifica en la costa de la Patagonia al sur de Puerto Deseado y en el extremo sur de Chile; también en Tierra del Fuego, las Malvinas y otras islas. En invierno emigra al norte, llegando hasta Talcahuano en Chile y por el Atlántico hasta Río de Janeiro, excepcionalmente hasta Bahía.

Notas: Esta especie llega todos los inviernos y es la más común en el país. Relativamente abundante en las costas de Maldonado y Rocha; más escasa en Canelones y Montevideo y sólo excepcionalmente en San José y Colonia. En las costas de Maldonado y Rocha es frecuente encontrar pingüinos y otras aves marinas, muertos por efecto del petróleo y el aceite sobre el plumaje o el tubo digestivo.

Orden RHEIFORMES

Familia RHEIDAE

Rhea americana intermedia ROTHSCHILD & CHUBB

Ñandú — Avestruz

Rhea americana intermedia ROTHSCHILD & CHUBB, 1914, Nov. Zool., *21*, p. 223. (Barra del Ao. San Juan, Dpto. de Colonia, Uruguay).

Rhea americana (no de LINNÉ) APLIN, 1894, The Ibis, p. 214.

Rhea americana Rothschildi TREMOLERAS, 1920, p. 10.

Rhea americana intermedia WETMORE, 1926, pp. 23-27; DEVINCENZI, 1925-28, p. 136; TREMOLERAS, 1927, p. 20; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (1), p. 21.

Distribución: Se extiende por el Brasil central y meridional, desde Minas Geraes hasta Río Grande do Sul y Uruguay. En la República Argentina habita la forma *R. a. albescens*,(1) mientras que la subespecie típica *R. a. americana*(2) vive en el norte del Brasil.

Notas: En el Uruguay el ñandú o avestruz es todavía muy abundante en los campos abiertos de la mayor parte del territorio, sobre todo en los Dptos. del norte. No se le encuentra más en el Dpto. de Montevideo y es muy escaso en lugares poblados, como en los Dptos. de Canelones, Colonia y el sur de San José.

Orden TINAMIFORMES(3)

Familia TINAMIDAE

Rhynchotus rufescens rufescens (TEMMINCK)

Martineta — Perdiz grande

Tinamus rufescens TEMMINCK, 1815, Hist. Nat. Pig. et Gall., *3*, pp. 552, 747. (Paraguay, rara en Brasil); HELLMAYR, 1929:479, sugiere a São Paulo como localidad típica.

Rhynchotus rufescens TREMOLERAS, 1920, p. 11; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 140-141.

Rhynchotus rufescens rufescens HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (1), pp. 82-83.

Distribución: La forma nominotípica de *R. rufescens* habita en el sur del Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

---

(1) *Rhea albescens* LYNCH ARRIBÁLZAGA & HOLMBERG, 1878, El Naturalista Argentino, Vol. I, p. 101 (Buenos Aires, Carhué, Argentina).

(2) *Struthio americanus* LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., *1*, p. 155 (Basado en "Nhanduguacu" de MARCGRAVE): nordeste del Brasil, Pernambuco.

(3) Por las relaciones taxonómicas de los *Tinamiformes* con los *Galliformes*, ver Verheyen (1960:1-11).

Notas: La martineta es sedentaria, vive en campos abiertos y con grandes pastizales. Abunda en muy pocos lugares, difícilmente accesibles para los cazadores, por ejemplo en las cercanías del Paso Mazangano (Dpto. de Cerro Largo).

Nothura maculosa maculosa (TEMMINCK)

Perdiz chica — Codorniz

Tinamus maculosus TEMMINCK, 1815, Hist. Nat. Pig. et Gall., *3*, pp. 557, 748. (Basado en AZARA, "Ynambuí", Apunt., *3*, p. 40, 1805): Paraguay.
Nothura maculosa TREMOLERAS, 1920, p. 11; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 142-143.
Nothura maculosa savannarum WETMORE, 1926, pp. 35-36; TREMOLERAS, 1927, p. 17.
Nothura maculosa nigroguttata (no de SALVADORI) WETMORE, 1926, pp. 33-35; GERZENSTEIN & MUÑOA, 1958, pp. 3-4.
Nothura maculosa maculosa HELLMAYR & CONOVER, 1942, *1* (1), p. 102; CONOVER, 1950, p. 354.

Distribución: La dispersión geográfica de *N. m. maculosa* comprende el sur del Brasil, sudeste del Paraguay, el Uruguay y las Prov. Argentinas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Notas: La perdiz chica es sedentaria y a pesar de la persecución de que es objeto por parte de los cazadores, todavía es muy común en los campos abiertos de todo el país.

Orden PODICIPEDIFORMES

Familia PODICIPEDIDAE

Podiceps dominicus speciosus LYNCH ARRIBÁLZAGA

Macacito gris

Podiceps speciosus LYNCH ARRIBÁLZAGA, 1817, La Ley (Buenos Aires), p. 1, julio 2. (Isla Baradero, Buenos Aires, Rep. Argentina).
Podiceps dominicus brachyrhynchus TREMOLERAS, 1920, p. 12. (Montevideo, Canelones, Maldonado); DEVINCENZI, 1925-28, pp. 166-167.
Colymbus dominicus speciosus HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 21-23.

Distribución: Se extiende desde Colombia y Venezuela hasta la Tierra del Fuego, excepto la región andina.

Notas: Sólo Tremoleras ha encontrado el macacito gris en el Uruguay; nosotros no lo hemos visto, ni conocemos ejemplares de procedencia uruguaya.

Podiceps rolland chilensis LESSON

Macacito — Macá común

Podiceps chilensis (Garnot M. S.) LESSON, 1828, Man. Orn., *2*, p. 358. (Concepción, Chile).

Podiceps americanus TREMOLERAS, 1920, p. 12; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 165-166.

Podiceps chilensis TREMOLERAS, 1927, p. 20 (cambio de nombre).

Colymbus rolland chilensis HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 23-26.

Distribución: Desde Perú, Bolivia y sur del Brasil hasta el Estrecho de Magallanes.

Notas: Muy común en pequeños bañados y lagunas de los Dptos. del sur; en el norte es más raro. En verano frecuenta las costas del Río de la Plata (Punta Carreta, Dpto. de Montevideo).

Aechmophorus major (BODDAERT)

Macá grande — Cornudo

Colymbus major BODDAERT, 1783, Tabl. Pl. Enl., p. 24. (Basado en "Grébe de Cayenne" de DAUBENTON, Pl. Enl., pl. 404, fig. 1): "Cayenne" error.

Aechmophorus major TREMOLERAS, 1920, p. 12; WETMORE, 1926, pp. 48-49; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 168-169; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 23-26.

Distribución: Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, excepto la región andina.

Notas: En la costa oceánica y del Río de La Plata, así como en las lagunas cercanas, es muy común. En el interior del país ha sido registrado en pocos lugares: Dpto. de Lavalleja; en el Río Negro cerca de Mercedes y en el Paso Ramírez, Dpto. de Tacuarembó, al suroeste de la desembocadura del Río Tacuarembó.

Podilymbus podiceps antarcticus (LESSON)

Zambullidor — Macá pico grueso

Podiceps antarcticus LESSON, 1842, Rev. Zool., *5*, p. 209. (Valparaíso, Chile).

Podilymbus podiceps TREMOLERAS, 1920, p. 12; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 169-170.

Podilymbus podiceps antarcticus WETMORE, 1926, pp. 49-50; TREMOLERAS, 1927, p. 20; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 38-39.

Distribución: Sudamérica desde Panamá hasta Córdoba y Buenos Aires en la Rep. Argentina.

Notas: Vive en lagunas y esteros. Es muy común en los Dptos. del sur, sobre todo cerca de la costa marítima. En el norte del país es más raro.

Orden PROCELLARIIFORMES

Familia DIOMEDEIDAE

Diomedea epomophora LESSON

Albatros real

Diomedea epomophora LESSON, 1825, Ann. Sci. Nat. París, VI, p. 95 (Isla Campbell).

Diomedea epomophora PETERS, 1931, *1*, p. 42; MURPHY, 1936, *1*, pp. 575-584.

Diomedea exulans (no de LINNÉ) BARATTINI, 1945, p. 14.

Diomedea epomophora epomophora HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 42-43.

Distribución: Se extiende por el Atlántico desde la Tierra del Fuego hasta São Paulo, Brasil y por el Pacífico hasta las costas del Perú.

Anida en Nueva Zelandia y probablemente en Tierra del Fuego. *Diomedea exulans exulans,*(1) que nidifica en las Islas árticas; Georgia del Sur, Kerguelen y otras, lo mismo que *D. exulans dabbenena,*(2) forma que anida en las Islas Gough y Tristan da Cunha, llegan en invierno hasta la costa argentina y posiblemente al Uruguay.

Notas: Los únicos ejemplares obtenidos en el Uruguay, proceden de los alrededores de la Isla de Lobos (1934) y cercanías de Santa Teresa, Dpto. de Rocha (H. Arredondo, 1936). Ambos ejemplares están en el Museo Municipal "Dámaso A. Larrañaga".

Diomedea melanophrys TEMMINCK

Albatros chico

Diomedea melanophris TEMMINCK, 1828, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 77, pl. 456. (Cabo de Buena Esperanza); corregido a *melanophrys* en Tabl. Méth., livr. 102, p. 103, 29-1-1839.

Thalassarche melanophrys TREMOLERAS, 1920, p. 12; DEVINCENZI, 1925-28, p. 182.

Diomedea melanophris WETMORE, 1926, p. 50 (cráneo encontrado cerca de La Paloma, Dpto. de Rocha, 23 de enero de 1921).

Diomedea melanophrys HELLMAYR & CONOVER, 1948. *1* (2), pp. 45-47; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos).

---

(1) *Diomedea exulans* LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., (1), p. 132 (Cabo de Buena Esperanza).

(2) *Diomedea chionoptera alexanderi* DABBENE, 1926, III, pp. 338-339 (Atlántico austral; lat. S. 38°30′, long. W. 56′, a unas 100 millas de la costa de la Prov. de Buenos Aires. Tipo en el Museo Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, N.° 8478, espec. a).

Diomedea dabbenena MATHEWS, 1929, Bull. Brit. Orn. Club, 50, p. 11 (nuevo nombre para *D. c. alexanderi,* preocupado).

Distribución: Nidifica en las Malvinas, Georgia del Sur y otras islas del Atlántico austral. En invierno frecuenta las costas de Argentina y Uruguay.

Notas: En invierno esta especie es bastante común en aguas uruguayas; más abundante en las islas y raramente en la costa, donde al igual que otras aves marinas, se encuentran muchos individuos muertos.

Familia PROCELLARIIDAE

Macronectes giganteus (GMELIN)

Petrel gigante — Quebrantahuesos

Procellaria gigantea GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 563. (Isla de los Estados).

Macronectes giganteus solandri BARATTINI, 1945, p. 14 (Costa marítima del Uruguay).

Macronectes giganteus HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 50-52; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos).

Distribución: Nidifica en las islas Malvinas, Orkney, Shetland y Georgia del Sur, en Tristán da Cunha, Kerguelen y otras islas del Atlántico e Indico australes. Fuera del tiempo de nidificación se extiende por los Océanos australes, hasta el trópico de Capricornio y no es raro en las costas atlánticas de Sudamérica.

Notas: En la costa uruguaya aparece regularmente en invierno, sobre todo en la Isla de Lobos.

Daption capensis (LINNÉ)

Petrel común — Damero del cabo

Procellaria capensis LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., *1*, p. 132. (Cabo de Buena Esperanza).

Petrella capensis TREMOLERAS, 1920, p. 12 (Costa de Maldonado).

Petrella capensis capensis DEVINCENZI, 1925-28, pp. 180-181.

Daption capensis TREMOLERAS, 1927, p. 20 (cambio de nombre); HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2). pp. 52-53; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos).

Distribución: Nidifica en Georgia del Sur y otras islas del Atlántico austral. En invierno llega hasta Perú y Brasil, siendo muy común en la costa argentina.

Notas: Aparece todos los inviernos en la Isla de Lobos. No sale a la costa del continente, pero llega nadando hasta muy cerca de ésta.

Pachyptila belcheri falklandica (MATHEWS)

Petrel azul de pico delgado

Heteroprion belcheri falklandicus MATHEWS, 1939, Bull. Brit. Orn. Cl., 59, p. 104. (Islas Malvinas, tipo en el Museo Británico).

Heteroprion desolatus banksi (no *Pachyptila banksi* SMITH) TREMOLERAS, 1920, p. 12.

Heteroprion belcheri DEVINCENZI, 1925-28, pp. 181-182; TREMOLERAS, 1927, p. 20 (cambio de nombre).

Pachyptila belcheri falklandica HELLMAYR & CONOVER, 1948. *1* (2), p. 57.

Distribución: Anida en las Islas Malvinas y llega hasta Chile central por el Océano Pacífico y hasta el sur del Brasil por el Atlántico; siendo bastante común en la costa argentina.

Notas: En invierno estos petreles aparecen en la costa uruguaya; en su gran mayoría, se trata de individuos muy enfermos o cansados. En julio de 1954, toda la costa desde Malvín hasta Carrasco (Dpto. de Montevideo) y detrás del Ao. Carrasco hacia el Parque Roosevelt (Dpto. de Canelones), estaba sembrada de petreles azules muertos; había no menos de tres mil individuos.

Fulmarus glacialis glacialoides (A. SMITH)

Petrel gris plateado — Pamperito

Procellaria glacialoides A. SMITH, 1840, Ill. Zool. S. Afr., *11*, pl. 51. (Cerca de la costa Sudafricana).

Priocella antarctica HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 58-59; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos).

Fulmarus glacialis glacialoides OLROG, 1958, p. 24; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 3-5.

Distribución: Nidifica en las islas antárticas (Orkney del Sur, Shetland del Sur, Reina María, Adelie y otras). En invierno emigra al norte, hasta el Cabo San Roque en el Atlántico y por el Pacífico hasta Perú.

Notas: Regularmente aparece todos los inviernos en la Isla de Lobos. El 17 de agosto de 1958, fue recogido un ejemplar muy enfermo en la costa de La Paloma, Dpto. de Rocha. También se encuentra en las Islas de Torres, Castillo Grande y en las costas del Dpto. de Rocha, donde en setiembre de 1953 se obtuvieron siete ejemplares. A menudo se ven nadando cerca de la costa, pero no salen a la orilla.

* *Adamastor cinerea* (GMELIN)

Petrel gris

Procellaria cinerea GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 563. (Basado en "Cinereous Fulmar" LATHAM, Gen. Syn. Bds., *3* (2), p. 405): Círculo Antártico = Mares de Nueva Zelandia, lat. 48° S.

Priofinus cinereus cinereus DABBENE, 1923, p. 7.

Profinus cinereus DEVINCENZI, 1925-28, p. 179.

Adamastor cinerea PETERS, 1931, *1*, p. 51; MURPHY, 1936, *2*, p. 649; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 60-61.

Distribución: Océanos del hemisferio austral, entre los 25° y 55° lat. S. hasta el norte del Perú y las costas del Brasil. Accidentalmente hasta las costas de California. Anida en las Islas Gough, Tristán da Cunha, Macquarie y Kerguelen.

Notas: DEVINCENZI (1925-28:179) cita esta especie para el Uruguay, basándose probablemente en un ejemplar naturalizado existente en las colecciones del M.N.H.N. Lamentablemente dicho ejemplar no tiene indicada la procedencia, aunque es muy posible que sea de la costa uruguaya.

Procellaria aequinoctialis aequinoctialis LINNÉ

Petrel de barba blanca o de pico amarillo

Procellaria aequinoctialis LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., *1*, p. 132. (Cabo Seas).

Procellaria aequinoctialis TREMOLERAS, 1920, p. 12.

Procellaria aequinoctialis aequinoctialis WETMORE, 1926, p. 52; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 179-180; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 61-62; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22. (Isla de Lobos).

Distribución: Nidifica en las Malvinas, Georgia del Sur y otras islas del sur de los Océanos Atlántico e Indico. En invierno se extiende por el Pacífico hasta Perú y por el Atlántico hasta el sur del Brasil.

Notas: En invierno este petrel se ve no sólo en alta mar siguiendo los barcos o en las islas, sino también cerca de la costa uruguaya. Lo hemos observado en Malvín y Carrasco, Dpto. de Montevideo (26 de junio de 1955) y cerca de Punta Ballena, Dpto. de Maldonado (25 de agosto de 1957). Llega regularmente todos los inviernos a la Isla de Lobos.

Puffinus gravis (O'REILLY)

Petrel pardo

Procellaria gravis O'REILLY, 1818, Voyage Greenland, Adj. Seas, p. 140, pl. 12, fig. 1. (Cabo Farewell y Staten Hook hasta Newfoundland).
Puffinus gravis WETMORE, 1926, p. 51 (encontrado muerto en la playa de La Paloma, Dpto. de Rocha, 23 de enero de 1921); TREMOLERAS, 1927, p. 17; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 65-66; CUELLO & ZORRILLA DE SAN MARTÍN, 1961.

Distribución: Nidifica en la Isla Tristán da Cunha y otras del Atlántico. En invierno se distribuye por la parte norte del Océano Atlántico hasta el círculo ártico. No es raro en alta mar frente a la costa sudamericana.

Notas: Este petrel fue encontrado en el Uruguay por WETMORE (1926:51), en La Paloma, Dpto. de Rocha. Los cinco ejemplares existentes en la colección de la Soc. Taguató (2 ♂ y 3 ♀), proceden de la misma localidad y fueron encontrados muertos después de un temporal (19 de mayo de 1961).

Puffinus griseus (GMELIN)

Petrel oscuro

Procellaria grisea GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 564. (Nueva Zelandia).
Puffinus griseus TREMOLERAS, 1920, p. 12; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 67-69.
Puffinus griseus chilensis (no de BONAPARTE) DEVINCENZI, 1925-28, p. 178.
Paranectris griseus stricklandi ZOTTA, 1935, p. 16.

Distribución: Nidifica en las Malvinas, islas del Estrecho de Magallanes y en muchas otras de los Océanos australes hasta Nueva Zelandia. En invierno emigra al norte hasta Siberia, Norteamérica, Groenlandia y Europa.

Notas: Los ejemplares del M.N.H.N. proceden del Dpto. de Montevideo y Punta Ballena, Dpto. de Maldonado y fueron obtenidos en el mes de agosto de 1957.

Puffinus puffinus puffinus (BRÜNNICH)

Petrel del Atlántico Norte

Procellaria puffinus BRÜNNICH, 1764, Ornithologia Borealis, p. 29. (Islas Faeroes, Noruega).
Puffinus puffinus puffinus WETMORE, 1926, p. 50; MURPHY, 1936, *1*, pp. 677-681; STEULLET & DEAUTIER, 1935-46, p. 230; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 70-71; MURPHY, 1952, pp. 8-10; CUELLO & ZORRILLA DE SAN MARTÍN, 1961.

Distribución: Anida en las islas del Atlántico Norte Faeroes, Islas Británicas, Azores, Madeira, Bermuda y otras. Como emigrante ha

sido registrado al sur del Ecuador, llegando ocasionalmente a las costas del Brasil, Uruguay y Argentina.

Notas: El único ejemplar de *P. p. puffinus* obtenido en el Uruguay es el de la Soc. Taguató N.° 784 ♀, encontrado muerto en la playa Pocitos, Dpto. de Montevideo, el 12 de diciembre de 1960.

Familia HYDROBATIDAE

Oceanites oceanicus oceanicus (KUHL)

Petrel chico de las tormentas

Procellaria oceanica KUHL, 1820, Beitr. Zool. Vergl. Anat., *1*, p. 136, lám. 10, fig. 1. (Sin localidad típica indicada = Georgia del Sur, según MURPHY, 1918:128).

Oceanites oceanica TREMOLERAS, 1920, p. 12. (Costas de Maldonado).

Oceanites oceanicus oceanicus DEVINCENZI, 1925-28, pp. 175-176; HELLMAYR & CONOVER, 1948 *1* (2), pp. 87-88; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22 (Isla de Lobos).

Distribución: Nidifica en las Malvinas, islas del Atlántico austral y en los alrededores del Cabo de Hornos. En invierno emigra al norte, llegando hasta Canadá. Accidentalmente en la costa Pacífica de América.

Notas: En invierno se encuentra a veces en las islas y costa uruguayas. En el Dpto. Zool. Vert. F.H.C., existe un ejemplar procedente de los alrededores de Pando, Dpto. de Canelones, obtenido durante una tormenta.

Pelagodroma marina marina (LATHAM)

Petrel o golondrina de las tormentas de cara blanca

Procellaria marina LATHAM, 1790, Ind. Orn., *2*, p. 826. (Océanos australes = frente a la desembocadura del Río de la Plata, lat. 35°-37° S.).

Pelagodroma marina APLIN, 1894, The Ibis, p. 212. (Cerca de la costa del Uruguay); TREMOLERAS, 1920, p. 12. (Costa uruguaya del Estuario del Plata).

Pelagodroma marina marina DEVINCENZI, 1925-28, pp. 176-177; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 89-90.

Distribución: Nidifica en Tristán da Cunha y otras islas del Atlántico austral. A menudo llega a la costa sudamericana, sobre todo a la Argentina.

Notas: Fue encontrada por APLIN (1894:212) a 113 nudos de la costa uruguaya y por TREMOLERAS en la costa del Río de la Plata.

Orden PELECANIFORMES

Familia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax olivaceus olivaceus (HUMBOLDT)

Zamaragullón — Viguá — Cormorán — Cuervo de mar

Pelecanus olivaceus HUMBOLDT, 1805, in HUMBOLDT & BONPLAND, Rec. Obs. Zool. Anat. Comp., p. 6. (Bancos del Río Magdalena, Colombia).

Phalacrocorax vigua TREMOLERAS, 1920, p. 16; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 5-6.

Phalacrocorax vigua vigua WETMORE, 1926, p. 53.

Phalacrocorax olivaceus olivaceus PETERS, 1931, *1*, p. 86.

Phalacrocorax brasilianus brasilianus HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 141-145.

Distribución: América Central y toda Sudamérica hasta la Tierra del Fuego; tanto en la costa marítima como en ríos, arroyos y lagunas del interior del continente.

Notas: En el Uruguay es muy común en toda la costa marítima; también en ríos y arroyos del interior. Se conocen pocos lugares de nidificación: Bañados de Arazatí, Dpto. de San José; Río Uruguay, Dpto. de Salto y en el Río Negro. Nidifica en colonias, a menudo junto con diferentes especies de garzas y otras aves.

Phalacrocorax albiventer (LESSON)

Viguá de vientre blanco

Carbo albiventer LESSON, 1831, Traité d'Orn., livr. 8, p. 604 (Islas Malvinas).

Phalacrocorax albiventer TREMOLERAS, 1927, p. 17 (Basado en un ejemplar obtenido en Carrasco el 20 de agosto de 1926); DEVINCENZI, 1925-28, p. 6-7. (Descripción, nido, huevos y mención de un ejemplar capturado en la Barra del Río Santa Lucía el 19 de junio de 1917); JOUANIN, 1950, pp. 193-198; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 5-7.

Phalacrocorax albiventer albiventer PETERS, 1931, *1*, p. 92.

Phalacrocorax atriceps albiventer HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 154-156; VAZ-FERREIRA, 1956, p. 22 (Isla de Lobos).

Distribución: Nidifica en la costa Atlántica del sur de la Patagonia (Santa Cruz) y en las Malvinas. En invierno se encuentra en la Tierra del Fuego y al norte, en toda la costa de la Prov. de Buenos Aires, el Delta del Paraná y el Uruguay. No ha sido citado para el Brasil.

Notas: El ejemplar cazado en la Barra del Río Santa Lucía, Dpto. de San José y preparado por el Sr. A. Tremoleras es una ♀

y está en la colección del M.N.H.N. con el N.° 4012 (Naturalizado). Nada sabemos del ejemplar obtenido en Carrasco. En el Dpto. Zool. Vert. F.H.C. hay tres pieles (1 ♂ y 2 ♀ ♀), capturados en la Isla de Lobos, en agosto de 1955. Los Profs. Vaz-Ferreira y Palerm han hecho observaciones todos los inviernos desde 1948 hasta la fecha y han podido constatar que el viguá de vientre blanco aparece en la Isla de Lobos como promedio en junio (en 1950 fue observado el 15 de mayo) y se retira generalmente en setiembre.

Familia ANHINGIDAE

Anhinga anhinga anhinga (LINNÉ)

Anhinga — Viguá víbora

Plotus anhinga LINNÉ, 1766, Syst. Nat., 12ª ed., p. 218. (Brasil nororiental; localidad típica restringida al Río Tapajoz por GRISCOM & GREENWAY, 1941:103).

Anhinga anhinga PETERS, 1931, *1*, p. 95; GERZENSTEIN & MUÑOA, 1958, p. 4.

Anhinga anhinga anhinga HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 158-159; GERZENSTEIN, 1960, p. 74; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 7-10.

Distribución: La subespecie *A. a. leucogaster*(1) desde Tejas y Georgia, en Florida, México, América Central y Cuba hasta Panamá y Colombia; mientras que la raza nominotípica *A. a. anhinga* se extiende desde Colombia y Venezuela por toda Sudamérica tropical y subtropical, al este de los Andes, este de Ecuador y Bolivia, todo el Brasil, Paraguay, norte del Uruguay hasta el Delta del Paraná en la Rep. Argentina.

Notas: El viguá víbora vive solamente en la parte norte del país. En el Dpto. de Artigas es sedentario; en el Río Negro aparece probablemente sólo en verano y no todos los años. Todos los ejemplares en colecciones uruguayas proceden del Dpto. de Artigas (Barra del Ao. Yacaré y Cuaró, 23 de enero de 1952; San Gregorio, 21 y 24 de marzo de 1959). También ha sido registrado en los Dptos. de Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, Soriano y Durazno. Todos los ejemplares colectados, como también las observaciones fueron hechos entre el 23 de enero y 16 de abril. Se encuentra siempre en lugares poco accesibles; lagunas o bañados con mucha vegetación, montes inundados y

(1) *Plotus leucogaster* VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 1, p. 545 (Florida).

desembocaduras de arroyos muy sucios. A menudo se detiene sobre los árboles y vuela a gran altura. En este último caso es fácilmente reconocible por su largo cuello, más claro que el resto del cuerpo.

Familia FREGATIDAE

Fregata magnificens MATHEWS

Fragata — Rabihorcado

Fregata minor magnificens MATHEWS, 1914, Austr. Av. Rec., *2*, p. 120. (Islas Galápagos).

Fregata magnificens rothschildi MURPHY, 1936, *2*, pp. 921-927 (Sinonimia, subespecies, descripción y distribución); PINTO, 1938, p. 28 (Brasil).

Fregata magnificens HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 161-164 (Sinonimia, distribución y abolición de la subespecie *rothschildi*); SEMPRUN, 1949, pp. 88-91 (Ejemplares colectados y observaciones en la Rep. Argentina); VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 10-11.

Fregata magnificens magnificens VAZ-FERREIRA, 1952, pp. 237-238 (Primera mención para el Uruguay).

Distribución: Anida en las Bahamas, las Antillas e islas de la costa de México, América Central, Venezuela y Brasil; por el Pacífico en las Islas de la Costa de Colombia, Ecuador y en las Galápagos. Las aves de estas últimas islas fueron separadas por Murphy en una subespecie *F. m. magnificens,* mientras que las del Atlántico se consideraban como otra forma, *F. m. rothschildi.*(1) La única diferencia era el tamaño (sobre todo la longitud de la cola) lo que según WETMORE y HELLMAYR, no es suficiente para la separación subespecífica. Fuera del tiempo de nidificación llega ocasionalmente a Florida, todo el Golfo de México, California, Perú, toda la costa del Brasil hasta Uruguay y Argentina.

Notas: En verano se ve a menudo en las costas del Dpto. de Rocha y rara vez al oeste hasta Montevideo. En la Rep. Argentina, el primer ejemplar fue obtenido en Miramar (enero de 1944) y está en la sala de aves del Museo Rivadavia. En el Uruguay, el primer ejemplar colectado es el del Dpto. Zool. Vert. F.H.C., procedente de la Isla de Lobos (6 de noviembre de 1951). El ejemplar N.° 1510 de la colección del M.N.H.N. procede del Cabo Polonio, Dpto. de Rocha y fue colectado por el Sr. R. Praderi el 16 de febrero de 1960; hasta ahora son los únicos obtenidos en el país.

---

(1) *Fregata minor rothschildi* MATHEWS, 1915, Birds Australia, *4*, p. 280 (Isla de Aruba, Antillas Holandesas).

Orden CICONIIFORMES

Familia ARDEIDAE[1]

Ardea cocoi LINNÉ — Garza mora

Ardea cocoi LINNÉ, 1766, Syst. Nat., 12ª ed., p. 237 (Cayena).

Ardea cocoi TREMOLERAS, 1920, p. 14; WETMORE, 1926, pp. 58-59; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 356-357; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 172-174.

Distribución: Se extiende desde Panamá hasta la Rep. Argentina, a través de Colombia, Venezuela, las Guayanas, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Notas: Vive en todo el territorio; frecuenta ríos y arroyos bordeados de monte, también lagunas y ocasionalmente la costa marítima. Nidifica sobre los árboles en grandes colonias junto con otras especies de garzas.

Butorides striatus fuscicollis (VIEILLOT) — Garcita azulada

Ardea fuscicollis VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist., nouv. éd., *14*, p. 410 (Basado en AZARA N.º 359, "Garza cuello aplomado"): Paraguay.

Butorides striatus (no de LINNÉ) TREMOLERAS, 1920, p. 14.

Butorides striatus cyanurus WETMORE, 1926, p. 55; TREMOLERAS, 1927, p. 20; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 364-365.

Butorides striatus fuscicollis HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 187-188.

Distribución: La dispersión geográfica de esta especie es muy amplia; vive desde Panamá hasta La Pampa y Buenos Aires en la Rep. Argentina. Nuestra subespecie ocupa la parte sur del área de distribución: sur de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Generalmente distribuida en todo el país. Frecuenta juncales y pajonales de bañados, arroyos y pequeñas lagunas. Probablemente se trata de un ave migratoria; no ha sido encontrada en invierno, todos los registros corresponden a la primavera, verano y otoño.

---

(1) En la revisión genérica de la familia *Ardeidae* (BOCK: 1956), son sinonimizados los siguientes géneros representados en la fauna uruguaya: *Syrigma* = *Nycticorax; Florida* = *Hydronassa; Casmerodius* y *Leucophoyx* = *Egretta.*

Florida caerulea caerulescens (LATHAM)

Garza azul

Ardea caerulescens LATHAM, 1790, Index Ornith., *2*, p. 690 (Cayena).

Ardea caerulea (no de LINNÉ) BURMEISTER, 1860, Journ. Orn., *8*, p. 265. (Mercedes, Río Negro, Uruguay); APLIN, 1894, The Ibis, p. 198 (Orillas del Río Negro, Uruguay).

Florida caerulea (no de LINNÉ) TREMOLERAS, 1920, p. 14 (Cerro Largo); DEVINCENZI, 1925-28, p. 360; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 189-191.

Florida caerulea caerulescens PHELPS & PHELPS, 1958, p. 37.

Distribución: Desde el sur de los Estados Unidos a través de México, América Central, las Antillas hasta el norte del Perú por el lado del Pacífico y hasta Uruguay por el Atlántico.

Notas: No la hemos encontrado en el país; las pruebas de su presencia son las de BURMEISTER (1860:265) Dpto. de Soriano; APLIN (1894:198) Río Negro y TREMOLERAS (1920:14) Cerro Largo. En el Museo de Enseñanza Secundaria hay un ejemplar ♀ naturalizado, probablemente obtenido en el Uruguay.

Casmerodius albus egretta (GMELIN)

Garza blanca grande

Ardea Egretta GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 629 (Basado en "Grande Aigrette" de BUFFON): Cayena, considerada como localidad típica por Berlepsch y Hartert, 1902:124.

Casmerodius albus egretta TREMOLERAS, 1920, p. 14; WETMORE, 1926, p. 57; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 357-358; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 194-197.

Distribución: Vive desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes.

Notas: La garza blanca grande es sedentaria en todo el territorio. Frecuenta ríos, arroyos, lagunas y esteros bordeados de monte; ocasionalmente en la costa marítima.

Leucophoyx thula thula (MOLINA)

Garza blanca chica

Ardea thula MOLINA, 1782, Sagg. Stor. Nat. Chili, pp. 235, 344 (Chile).

Egretta thula TREMOLERAS, 1920, p. 14.

Egretta candidissima candidissima DEVINCENZI, 1925-28, pp. 359-360.

Leucophoyx thula thula HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 198-200.

Distribución: Desde los Estados Unidos meridionales, las Antillas, Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad, Centro y Sudamérica hasta la Rep. Argentina.

Notas: Sedentaria y muy común en todo el país. Vive en arroyos, lagunas, bañados y también en el campo abierto. Es mucho más chica que la garza blanca grande y además los adultos tienen el pico negro y no amarillo como esta última. Ambas especies nidifican juntas en colonias, a veces con otras garzas, espátulas, viguás, etc.

Syrigma sibilatrix sibilatrix (TEMMINCK)

Garza silbadora — Chiflón — Mirasol — Garza amarilla

Ardea sibilatrix TEMMINCK, 1824, Nouv. Réc. Pl. Col. d'Ois., livr. 46, pl. 271. (Brasil y Paraguay).

Syrigma sibilatrix TREMOLERAS, 1920, p. 14; WETMORE, 1926, p. 56; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 363-364; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 205-207.

Distribución: La dispersión geográfica de la garza amarilla comprende el Paraguay, sur del Brasil, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Generalmente distribuida en todo el país; sedentaria y muy común sobre todo en los Dptos. del norte, tanto en bañados como en el campo abierto.

Nycticorax nycticorax hoactli (GMELIN)

Garza cenicienta — Garza bruja — Garza zorro

Ardea hoactli GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1*, p. 630 (Basado en BRISSON, etc.): "in novae Hispaniae lacubus" = México.

Nycticorax nycticorax naevius (no de BODDAERT) TREMOLERAS, 1920, p. 14; WETMORE, 1926, p. 54; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 361-362.

Nycticorax tayazu-guira DEVINCENZI, 1925-28, pp. 362-363; STEULLET & DEAUTIER, 1935-46, p. 269.

Nycticorax nycticorax hoactli HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 207-211.

Distribución: Vive y anida desde el norte de los Estados Unidos a través de México, Centro y Sudamérica hasta el extremo norte de Chile y la Rep. Argentina.

Notas: Esta garza es sedentaria y está distribuida en todo el territorio; frecuenta montes marginales de ríos, arroyos y lagunas.

Tigrisoma lineatum marmoratum (VIEILLOT)

Hocó — Garza colorada — Garza atigrada

Ardea marmorata VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *14*, p. 415. (Basado en AZARA, N.° 353 ("Garza jaspeada"): Paraguay.
Tigrisoma marmoratum DEVINCENZI, 1925-28, pp. 367-368; BARATTINI, 1945, p. 21.
Tigrisoma lineatum marmoratum HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 222-224; GERZENSTEIN & MUÑOA, 1958, pp. 4-5.

Distribución: Esta subespecie se extiende por el Brasil central y oriental, sudeste de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina hasta San Juan, Santa Fe y el Delta del Paraná, donde según PEREYRA (1938:24) es muy escasa.

Notas: La garza colorada ha sido encontrada únicamente en el extremo norte del país (marzo de 1957, enero y octubre de 1958), en las lagunas del Río Cuareim al noroeste de la ciudad de Artigas y en Espinillar, Dpto. de Salto, cerca de la desembocadura del Río Arapey. De esta última localidad procede el único ejemplar de la colección del M.N.H.N. Vive en montes inundados, grandes lagunas, bañados muy sucios y de difícil acceso.

Ixobrychus involucris (VIEILLOT)

Garcita enana — Mirasol chico

Ardea involucris VIEILLOT, 1823, Tabl. Encyc. Méth., *3*, p. 1127 (Paraguay).
Ixobrychus involucris TREMOLERAS, 1920, p. 14; WETMORE, 1926, p. 60; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 366-367; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 229-230.

Distribución: Colombia, Venezuela, Guayana Inglesa, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. También en la Isla de Trinidad.

Notas: Esta garcita, de cuyas costumbres poco se sabe, es muy poco vista pero probablemente es más común de lo que generalmente se cree. Vive entre los grandes juncales de lagunas y arroyos. En los alrededores de Montevideo (Parque Lecoq y Ao. Tropas Viejas) es sedentaria. No se conoce la distribución en el país.

Botaurus pinnatus (WAGLER)

Hocó — Mirasol grande

Ardea pinnata WAGLER, 1829, Isis, Col. 662 (Estado de Bahía, Brasil).
Botaurus pinnatus TREMOLERAS, 1920, p. 14; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 368-369; BARATTINI, 1945, p. 21; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 237-238.

Distribución: Desde Nicaragua, Colombia, Venezuela y las Guayanas hasta el norte de la Rep. Argentina.

Notas: La única prueba de la presencia de esta especie en el Uruguay, la constituye el ejemplar naturalizado N.° 4105 del M.N.H.N. procedente del Bañado de Carrasco, Dpto. de Canelones, colectado el 4 de noviembre de 1919. Es probablemente muy rara o se esconde en los juncales saliendo sólo excepcionalmente.

Familia CICONIIDAE

Mycteria americana LINNÉ

Cigüeña de cabeza pelada

Mycteria americana LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., (1), p. 140 (América calidiore) = Brasil.

Tantalus americanus TREMOLERAS, 1920, p. 15.

Mycteria americana WETMORE, 1926, p. 60; PETERS, 1931, *1*, p. 126; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 242-245.

Distribución: Se extiende desde los Estados Unidos meridionales, por México, Centroamérica y las Antillas hasta Perú, Argentina y Uruguay.

Notas: Generalmente distribuida en bañados y lagunas de todo el país.

Euxenura maguari (GMELIN)

Cigüeña común

Ardea Maguari GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 623 (Basado en "Maguari" de MARCGRAVE): Noreste del Brasil.

Euxenura maguari TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 371-372; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 245-247.

Euxenura galatea WETMORE, 1926, pp. 61-63 (Dpto. de Rocha).

Euxenura galeata (no *Ardea galeata* MOLINA) PETERS, 1931, *1*, p. 129.

Distribución: Gran parte de Sudamérica; desde Colombia, Venezuela y las Guayanas hasta el sur de la Rep. Argentina y Chile, a través del Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Notas: Generalmente distribuida en todo el territorio. Frecuenta lagunas y bañados; también se encuentra en el campo abierto.

Jabiru mycteria (LICHTENSTEIN)

Juan grande

Ciconia mycteria LICHTENSTEIN, 1816-1817 (1819), Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, Phys. Kl., p. 163 (Basado en MARCGRAVE): Brasil.

Mycteria mycteria TREMOLERAS, 1920, p. 15.

Jabiru mycteria PETERS, 1931, *1*, p. 130; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 247-249.

Ephippiorhynchus (Jabiru) mycteria VERHEYEN, 1959, pp. 29-30.

Distribución: Desde México por Centroamérica hasta Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina.

Notas: En el Uruguay esta especie es muy rara; ha sido señalada para los Dptos. de Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha.

Familia THRESKIORNITHIDAE

Harpiprion caerulescens (VIEILLOT)

Bandurria mora

Ibis caerulescens VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *16*, p. 18 (Basado en AZARA, N.° 363 "Curucáu aplomado"): Paraguay.

Molybdophanes caerulescens TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 349-350.

Harpiprion caerulescens PETERS, 1931, *1*, p. 35; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 249-250.

Distribución: Sur del Brasil (hasta Matto Grosso al norte), Paraguay, Uruguay y norte de la Rep. Argentina (hasta Tucumán y Entre Ríos al sur). En el Delta del Paraná sólo ocasionalmente.

Notas: Es rara en el país; el ejemplar de la colección del M.N.H.N. procede del Dpto. de Rocha y fue colectado el 21 de abril de 1905. También fue observada una pareja, entre los arroyos del Estado y Cordobés en el Dpto. de Durazno (el 1.° de abril de 1958), y cuatro individuos en el Paso de la Cadena, Río Arapey, Dpto. de Salto (31 de marzo de 1961).

Theristicus caudatus caudatus (BODDAERT)

Bandurria

Scolopax caudatus BODDAERT, 1783, Tabl. Pl. Enl., p. 57 (Basado en DAUBENTON, Pl. Enl. 820): Cayena.

Theristicus caudatus TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 348-349.

Theristicus caudatus caudatus HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 250-252; DENNER DE LA TOUR, 1957, pp. 50-51, fig. 12.

Distribución: Las distribuciones y migraciones de las tres subespecies de esta bandurria, son tan características e interesantes que vale la pena tocarlas, por lo menos en breve. *T. c. caudatus* vive y nidifica desde Colombia y Venezuela a través del Brasil, este de Bolivia, Paraguay y Uruguay hasta Córdoba y Buenos Aires en la Rep. Argentina; en invierno se retira al norte del Brasil. *T. c. melanopis*(1) nidifica desde el sur del Perú, Chile y el sur de Argentina (desde el Río Negro hasta el Cabo de Hornos); en invierno emigra al norte hasta la Prov. de Buenos Aires (Uruguay?). La tercera subespecie *T. c. branickii*(2) nidifica y es sedentaria en la zona puneña de Ecuador, Perú y parte noroeste de Bolivia.

Notas: En el Uruguay *T. c. caudatus* ha sido encontrada en la Cuchilla de Haedo, donde es bastante común en ciertas épocas del año: Tambores, Pozo Hondo, Dpto. de Tacuarembó (setiembre de 1957 y abril de 1958) ejemplares aislados y parejas; Cerro Travieso, puntas del Ao. Tres Cruces, Dpto. de Tacuarembó (1.° de marzo de 1960) en campo abierto, grupos de 5 a 20 individuos; Ao. Laureles, límite Tacuarembó-Rivera (enero de 1959), de esta localidad procede el ejemplar N.° 1240 del M.N.H.N.; Masoller (17 de abril de 1957) grupos de hasta 50 individuos. En el Ao. Tres Cruces (marzo de 1960) estas aves fueron observadas pasando la noche en los árboles, junto con algunos buitres.

Phimosus infuscatus infuscatus (LICHTENSTEIN)

Cuervillo de cara afeitada

Ibis infuscatus LICHTENSTEIN, 1823, Verz. Doubl. Zool. Mus. Berlin, p. 75 (Basado en AZARA, N.° 365 "Curucáu afeytado"): Paraguay.

Phimosus nudifrons Azarae TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 347-348.

Phimosus infuscatus infuscatus PETERS, 1931, *1*, p. 137; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 260-261.

Distribución: La parte sureste de Bolivia, Paraguay y el norte de la Rep. Argentina hasta Córdoba y Buenos Aires.

Notas: Tremoleras no cita esta especie con seguridad, sin embargo en la colección del M.N.H.N. existen dos ejemplares: Dpto. de Maldonado (enero de 1953) y de los alrededores de Fray Bentos (mayo

(1) *Tantalus melanopis* GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 653 (Isla Año Nuevo cerca de la Isla de los Estados).

(2) *Theristicus branickii* BERLEPSCH & STOLZMANN, 1894, The Ibis, p. 404 (Lago Junín, Perú).

de 1958). Además fue observado un grupo de siete individuos el 23 de agosto de 1958, en el Río Olimar, cerca de la ciudad de Treinta y Tres; también en la Laguna del Diario, Dpto. de Maldonado, y en el Río Arapey, Dpto. de Salto (marzo de 1961).

Plegadis chihi (VIEILLOT)

Cuervillo de cañada

Numenius chihi VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *8*, p. 303 (Basado en AZARA, N.° 364 "Cuello jaspeado"): Paraguay y campos de Buenos Aires.

Plegadis guarauna TREMOLERAS, 1920, p. 15; WETMORE, 1926, p. 65; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 350-351.

Plegadis (falcinellus?) guarauna PETERS, 1931, *1*, p. 138.

Plegadis falcinellus guarauna STEULLET & DEAUTIER, 1935-46, p. 296.

Plegadis (falcinellus?) chihi HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 266-269.

Distribución: La dispersión geográfica de esta especie es muy amplia; se extiende desde Norteamérica por toda Sudamérica hasta el sur de la Patagonia.

Notas: Muy común y generalmente distribuida en todo el territorio. Frecuenta bañados, campos húmedos, lagunas, etc. Es un ave sedentaria y muy gregaria, se encuentran bandadas de cientos de individuos.

Ajaia ajaja (LINNÉ)

Espátula — Garza rosada

Platalea Ajaja LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., *1*, p. 140 ("in America australi") = Jamaica, por la primera citación según PETERS, 1931:140.

Ajaja ajaja TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 352-353.

Ajaia ajaja WETMORE, 1926, p. 65; PETERS, 1931, *1*, p. 140; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 271-273.

Distribución: La garza rosada anida desde los Estados Unidos, por México y las Antillas hasta Chile, Argentina y Uruguay.

Notas: Aunque poco abundante, está generalmente distribuida en todo el país. En invierno es rara; más común en primavera, verano y otoño. Frecuenta lagunas y bañados; ocasionalmente en la costa marítima. Nidifica en colonias junto con otras especies.

Familia PHOENICOPTERIDAE (1)

Phoenicopterus ruber chilensis MOLINA

Flamenco

Phoenicopterus chilensis MOLINA, 1782, Sagg. Stor. Nat. Chili, p. 242 (Chile).

Phoenicopterus chilensis TREMOLERAS, 1920, p. 16; PETERS, 1931, *1*, p. 141; BARATTINI, 1945, p. 24.

Phoenicopterus ruber chilensis HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 275-276.

Distribución: Desde el Perú, Argentina, Chile, Paraguay, extremo sur del Brasil y Uruguay.

Notas: En el Uruguay ha sido registrado en las Salinas marítimas de La Coronilla y Laguna Garzón, Dpto. de Rocha. Excepcionalmente en la Barra del Ao. Pando, Dpto. de Canelones.

Orden ANSERIFORMES

Familia ANHIMIDAE

Chauna torquata (OKEN)

Chajá

Chaja torquata OKEN, 1816, Lehbr. Naturg., *3*, pt. 2, p. 639 (Basado en AZARA, N.º 341): Paraguay.

Chauna torquata TREMOLERAS, 1920, p. 16; WETMORE, 1926, p. 67; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 281-283.

Distribución: La distribución geográfica del chajá comprende el Paraguay, Brasil meridional y central, Uruguay y norte de la Rep. Argentina.

Notas: Vive en lagunas, bañados y esteros de todo el país. En algunos lugares es muy abundante: Laguna Merim, lagunas del Dpto. de Rocha; Laguna del Sauce, Dpto. de Maldonado; Arazatí, Dpto. de San José y en los bañados del Paso Ramírez, Dpto. de Tacuarembó.

---

(1) MAYR & AMADON (1951:7,33) como también otros ornitólogos, consideran a los flamencos (representantes del suborden *Phoenicopteri)* como integrantes del orden *Phoenicopteriformes,* independiente de los *Ciconiiformes.*

Familia ANATIDAE

Cygnus melancoriphus (MOLINA)

Cisne de cuello negro

Anas melancoripha MOLINA, 1782, Sagg. Stor. Nat. Chili, p. 234 (Chile).
Cygnus melancoryphus TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 375-376; BARATTINI, 1945, p. 22; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 286-287.
Cygnus melancoriphus WETMORE, 1926, pp. 69-70.

Distribución: Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile hasta las Malvinas y la Tierra del Fuego.

Notas: El cisne de cuello negro es todavía común en las grandes lagunas de Rocha y Maldonado a pesar de la persecución de que es objeto por parte de los cazadores. En otros lugares es raro, en el norte se le encuentra excepcionalmente, sólo durante la migración.

* *Chloëphaga picta*

Avutarda — Cauquén

VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN (1961:3), mencionan esta especie para el Dpto. de Rocha.

La subespecie nominal *Ch. p. picta*(1) vive en Chile y sur de la Rep. Argentina, desde el Río Negro al sur, hasta la Tierra del Fuego; en invierno llega hasta la Prov. de Buenos Aires. La forma *Ch. p. leucoptera*(2) habita en las Islas Malvinas y ha sido introducida en Georgia del Sur.

Dendrocygna bicolor bicolor (VIEILLOT)

Pato silbón rojizo — Pato chimango

Anas bicolor VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *5*, p. 136 (basado en AZARA N.º 436 "Pato roxo y negro"): Paraguay y Buenos Aires.
Dendrocygna fulva TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 390-391.
Dendrocygna bicolor HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 312-314.

Distribución: India, Madagascar, Sudáfrica, Norte y Sudamérica. Sedentario en la mayor parte del Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina hasta Tucumán, Sgo. del Estero, Santa Fe y Buenos Aires.

---

(1) *Anas picta* GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 504 (Isla de los Estados).
(2) *Anas leucoptera* GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 505 (Islas Malvinas).

Notas: Los ejemplares de la colección del M.N.H.N. fueron colectados cerca de la Coronilla, Dpto. de Rocha por el Sr. Enrique Gómez-Haedo.(1) También ha sido observado en los Dptos. de Canelones (Ao. Tropas Viejas) y en el Rincón de Baygorria, Dpto. de Río Negro.

Dendrocygna viduata (LINNÉ)

Pato viudo — Pato de cara blanca — Suiriri — Pato pampa

Anas viduata LINNÉ, 1766, Syst. Nat., 12ª ed., (1), p. 205 (Cartagena, Colombia).

Dendrocygna viduata TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, p. 389; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 318-319; GERZENSTEIN & MUÑOA, 1958, p. 5 (Espinillar, Dpto. de Salto).

Distribución: Desde Costa Rica hasta Córdoba y Buenos Aires en la Rep. Argentina; también en Africa tropical.

Notas: En nuestro país, el pato viudo abunda en las plantaciones de caña de azúcar (Espinillar, Dpto. de Salto) y en las arroceras (San Gregorio, Dpto. de Artigas; Treinta y Tres y Rocha). Registrado también en Colonia Concordia, Dpto. de Soriano; Ao. Tropas Viejas, Dpto. de Canelones y en Montevideo (Laguna del Parque Lecoq).

Cairina moschata (LINNÉ)

Pato criollo

Anas moschata LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10ª ed., (1), p. 124 (Brasil).

Cairina moschata TREMOLERAS, 1920, p. 15 (Montevideo, Canelones, Rocha y Treinta y Tres); DEVINCENZI, 1925-28, pp. 386-387; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 321-323.

Distribución: México, América Central, Venezuela, las Guayanas, todo el Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de la Argentina hasta Tucumán, Sgo. del Estero, Chaco Santafecino y accidentalmente hasta Buenos Aires.

Notas: En los Dptos. referidos por TREMOLERAS en su *Lista de aves uruguayas,* este pato no vive más y si aparece allí es sólo excepcionalmente. Hace años que no se le encuentra en el sur del país. El único ejemplar colectado, es el de la Soc. Taguató, N.° 632 ♀, obte-

(1) Casi todos los ejemplares de la familia *Anatidae* como así también muchas otras aves de la colección del M.N.H.N., han sido colectados por el Sr. E. Gómez-Haedo.

nido el 6 de marzo de 1960 en la Barra del Ao. Tigre, Dpto. de Artigas. En la Isla del Zapallo, Río Uruguay, el pato criollo es bastante abundante. También ha sido señalado en otros lugares del Dpto. de Artigas; en Espinillar, Dpto. de Salto (noroeste del Dpto. de Salto); en la Barra del Río Tacuarembó y en el Paso Ramírez sobre el Río Negro (sur del Dpto. de Tacuarembó).

Coscoroba coscoroba (MOLINA)

Ganso — Ganso blanco

Anas coscoroba MOLINA, 1782, Sagg. Stor. Nat. Chili, p. 234 (Chile).

Coscoroba coscoroba TREMOLERAS, 1920, p. 15; WETMORE, 1926, p. 73; DEVINCENZI, 1925-28, p. 385; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 323-324.

Distribución: Nidifica en la parte sur de Argentina y Chile desde Córdoba y Buenos Aires hasta la Tierra del Fuego. En invierno emigra al norte hasta Paraguay y Brasil (Río Grande do Sul).

Notas: El ganso es común en las grandes lagunas del Dpto. de Rocha y raro en otros Dptos. de la costa marítima. En el interior del país se le encuentra sólo excepcionalmente. Durante la migración aparece ocasionalmente en la Playa Penino, Dpto. de San José y en el Parque Lecoq, Dpto. de Montevideo.

Amazonetta brasiliensis (GMELIN)

Pato portugués — Pato de ala verde — Ipecutirí

Anas brasiliensis GMELIN, 1789, Syst. Nat., *1* (2), p. 517 (Brasil).

Nettium brasiliensis TREMOLERAS, 1920, p. 15.

Nettion brasiliensis WETMORE, 1926, pp. 79-80; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 396-397; TREMOLERAS, 1927, p. 20; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 347-349; GERZENSTEIN & MUÑOA, 1958, p. 5.

Amazonetta brasiliensis HNO. GINÉS & AVELEDO, 1958, pp. 99-100.

Distribución: Se extiende desde Colombia, Venezuela y las Guayanas a través del Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay hasta Córdoba y Buenos Aires en la Rep. Argentina.

Notas: En el norte del país es el más común de nuestros patos. Ha sido encontrado en todos los Dptos. situados al norte del Río Negro y en Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Frecuenta lagunas cerca de los grandes montes y abunda sobre todo en los valles del Río Uruguay y del Cuareim en los Dptos. de Artigas y Salto.

Anas discors discors LINNÉ

Pato de ala azul

Anas discors LINNÉ, 1766, Syst. Nat., 12ª ed., (1), p. 205 (Virginia o Carolina, Norteamérica).

Querquedula discors SALVADORI, Cat. Bds. Brit. Mus., *27*, p. 299; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 333-335; ESCALANTE & GÓMEZ-HAEDO, 1957, p. 398 (Primera mención para el Uruguay).

Anas discors discors HNO. GINÉS & AVELEDO, 1958, pp. 79-80.

Distribución: Nidifica principalmente en la parte sur del Canadá y norte de los Estados Unidos. Pasa el invierno en las Islas Bahamas, las Antillas y desde California, Tejas y Louisiana a través de México, América Central y norte de Sudamérica hasta Perú y la Guayana Francesa.

Notas: El 31 de marzo de 1957 el Sr. E. Gómez-Haedo cazó un ejemplar de este pato en las Salinas Marítimas de La Coronilla, Dpto. de Rocha. El ejemplar está en la colección particular del Prof. R. Escalante. Es una especie norteamericana (Blue-winged teal) que llega regularmente en invierno hasta Perú y las Guayanas. Accidentalmente ha sido registrada en Ovalle, Coquimbo, Chile; Chilecito, La Rioja, Argentina (NAVAS, 1961:52) y Uruguay.

Anas cyanoptera cyanoptera VIEILLOT

Pato colorado

Anas cyanoptera VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *5*, p. 104 (Basado en AZARA, N.º 434 "Pato alas azules"): Río de La Plata y Buenos Aires.

Querquedula cyanoptera TREMOLERAS, 1920, p. 16; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 392-393.

Querquedula cyanoptera cyanoptera HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 335-337.

Distribución: En Norteamérica nidifica en la parte oeste de los Estados Unidos; pasa el invierno en México y América Central. En Sudamérica vive en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y extremo sur del Brasil. Nidifica en la parte austral y central de esta área y en las Prov. andinas, mientras que en la parte septentrional aparece sólo en invierno.

Notas: En nuestro país este pato es uno de los más raros y aparece probablemente sólo en invierno. Los ejemplares de la colección del M.N.H.N., proceden de la Laguna del Cisne, Dpto. de Canelones y de las Salinas Marítimas de La Coronilla, Dpto. de Rocha.

Anas platalea VIEILLOT

Pato pico cuchara — Cuchareta — Espátula

Anas platalea VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *5*, p. 157 (Basado en AZARA, N.° 431 "Pato espátula"): Buenos Aires y Paraguay.

Spatula platalea TREMOLERAS, 1920, p. 16; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 400-401; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 339-340.

Distribución: Desde el sur del Perú, Bolivia y sur del Brasil hasta la Tierra del Fuego. Al norte del área de distribución aparece sólo en invierno.

Notas: Es una especie rara en nuestro país donde próbablemente se encuentra sólo en invierno. Los ejemplares del M.N.H.N. fueron obtenidos en las Salinas Marítimas de La Coronilla, Dpto. de Rocha, en los meses de marzo, julio y agosto.

Anas sibilatrix POEPPIG

Pato overo

Anas sibilatrix POEPPIG, 1829, Frorip's Notizen, *25*, p. 10, N.° 529 (Chile).

Mareca sibilatrix TREMOLERAS, 1920, p. 15; DEVINCENZI, 1925-28, pp. 393-394; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (2), pp. 343-344.

Distribución: Nidifica en la parte sur de Sudamérica, desde Santiago de Chile, Córdoba y Buenos Aires en la Rep. Argentina hasta las Malvinas y la Tierra del Fuego. En invierno emigra al norte hasta el norte de Chile, Paraguay y Brasil (Río Grande do Sul).

Notas: En el Uruguay el pato overo ha sido encontrado nidificando en los campos de la Empresa Rausa, cerca de Montes, en el Ao. Solís Grande. Es abundante durante el invierno, cuando llegan las aves migratorias de la parte sur del área de distribución.

Anas leucophrys VIEILLOT

Pato de collar

Anas leucophrys VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., *5*, p. 156 (Basado en AZARA, "Pato de ceja blanca"): Paraguay.

Nettium torquatum TREMOLERAS, 1920, p. 15.

Nettion torquatum DEVINCENZI, 1925-28, pp. 397-398.

Nettion leucophrys TREMOLERAS, 1920, p. 21; HELLMAYR & CONOVER, 1948, pp. 349-350.

Distribución: Zona central de Sudamérica, desde Bolivia y Matto Grosso en Brasil hasta Córdoba y Buenos Aires en la Rep. Argentina.