Distribución: Sur del Brasil, Uruguay y norte de la Rep. Argentina.

Notas: Tremoleras citó esta tijereta para los Dptos. de Flores y Paysandú. Es un ave muy rara; fue observada (Gerzenstein) el 4 de abril de 1955 en el Dpto. de Soriano.

Knipolegus cyanirostris (VIEILLOT)

Viudita negra de monte

Muscicapa cyanirostris VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 21, p. 447 (Basado en AZARA, N°. 181 "Suiriri negro pico celeste"): Paraguay.

Knipolegus cyanirostris TREMOLERAS, 1920, p. 20; WETMORE, 1926, p. 311; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 72-73.

Distribución: Se extiende por el centro y sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay y este de Argentina.

Notas: Frecuenta los montes de casi todo el país; sedentaria y bastante común. En la colección del M.N.H.N. hay ejemplares de los Dptos. de Artigas, Salto, Tacuarembó, Río Negro, Durazno, Florida, Colonia, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Knipolegus lophotes HELLMAYR

Viudita negra de copete

Knipolegus lophotes HELLMAYR (ex TEMMINCK, manuscr.) 1927, Field Mus. Nat. Hist. Chicago, Zool. Ser. 13, pt. *5*, pp. 67-68 (nuevo nombre para *K. comatus* auctorum = *Muscicapa comata* LICHTENSTEIN): São Paulo, Brasil.

Knipolegus lophotes VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 42-44.

Distribución: Brasil central y meridional hasta el Uruguay.

Notas: Esta especie no ha sido citada para la Rep. Argentina, pero en el Uruguay ya la hemos encontrado en los Dptos. de Rivera (Sierra de la Aurora), Tacuarembó (Tambores, Puntas del Ao. Laureles, Puntas del Ao. Tres Cruces), Lavalleja (Cerro Arequita, Salto del Penitente, Canteras de Rapallo y Abra de Zabaleta) y Maldonado (Cerro Pan de Azúcar y Mirador Nacional). Los ejemplares del M.N.H.N. fueron obtenidos en los meses de abril, junio, julio y octubre.

Hymenops perspicillata perspicillata (GMELIN)

Viudita negra de bañado — Pico de plata

Motacilla perspicillata GMELIN, 1789, Syst. Nat., 1, p. 969 (Basado en "Le Clignou traquet á lunette" de BUFFON): Montevideo, Uruguay.

Lichenops perspicillata TREMOLERAS, 1920, p. 20.

Lichenops perspicillata perspicillata CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 77-79; WETMORE, 1926, p. 302.

Distribución: Sudeste y extremo sur del Brasil, este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Es sedentaria; frecuenta bañados y pajonales. Es más abundante en el sur del país.

Fluvicola pica albiventer (SPIX)

Burlisto de agua

Muscicapa albiventer SPIX, 1825, Av. Bras., 2, p. 21, pl. 30, fig. 1 ("in campis Brasiliae" = Norte de Bahía, localidad sugerida por PINTO, 1944:121).

Fluvicola albiventer BARATTINI, 1945, p. 41.

Distribución: Bolivia, Paraguay, Brasil central y septentrional, norte y este de la Rep. Argentina y el Uruguay.

Notas: El único ejemplar de procedencia uruguaya es el de la colección del M.N.H.N. N.° 421, obtenido el 11 de diciembre de 1940 en la Playa de la Agraciada, Dpto. de Soriano, por el Dr. Julio M. Sosa.

Pyrocephalus rubinus rubinus (BODDAERT)

Churrinche

Muscicapa rubinus BODDAERT, 1783, Tabl. Pl. Enlum., p. 42 (Basado en DAUBENTON, Pl. Enlum., 675, fig. 2 y en "Le Rubin de la rivière des Amazones" de BUFFON) Río Amazonas; Tefé, localidad típica sugerida por ZIMMER, 1941:16.

Pyrocephalus rubinus TREMOLERAS, 1920, p. 21.

Pyrocephalus rubinus rubinus WETMORE, 1926, p. 334; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 86-88.

Distribución: Este del Ecuador como inmigrante, este de Bolivia, Paraguay, norte de Argentina, Brasil central y este-meridional y Uruguay.

Notas: Estrictamente migratorio. Llega al país en los primeros días de setiembre para nidificar. Los adultos se retiran del Uruguay al norte, generalmente en marzo; los jóvenes (los machos con el pecho y abdomen rosado, las hembras con el pecho blancuzco estriado con pardo) se quedan hasta mediados de abril.

Satrapa icterophrys (VIEILLOT)

Vinchero

Muscicapa icterophrys VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 21, p. 458 (Basado en AZARA, N.º 183): Paraguay.

Sisopygis icterophrys TREMOLERAS, 1920, p. 20.

Satrapa icterophrys CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 96-97; TREMOLERAS, 1927, p. 22.

Distribución: Se extiende desde Venezuela hasta el norte de la Rep. Argentina, a través del Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Notas: Aunque es un ave sedentaria, es más común durante el verano; frecuenta montes, parques y jardines.

Machetornis rixosa rixosa (VIEILLOT)

Margarita

Tyrannus rixosus VIEILLOT, 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 35, p. 85 (Basado en AZARA, N.º 197 "Suiriri"): Paraguay.

Machetornis rixosa TREMOLERAS, 1920, p. 20.

Machetornis rixosa rixosa WETMORE, 1926, 305; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 98-99.

Distribución: Vive en el Brasil central y oriental, este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de la Rep. Argentina.

Notas: Residente permanente; muy común en todo el país, generalmente cerca de las poblaciones y en campos de pastoreo.

Muscivora tyrannus tyrannus (LINNÉ)

Tijereta

Muscicapa tyrannus LINNÉ, 1766, Syst. Nat., 12ª ed., (1), p. 325 (Basado en *Tyrannus cauda bifurca* BRISSON, Orn., 2, p. 395, pl. 39, fig. 3) "Canadá" error y Cayena, localidad típica restringida a la Guayana Holandesa por ZIMMER, 1937:1.

Muscivora tyrannus TREMOLERAS, 1920, p. 21; WETMORE, 1926, pp. 338-339; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 101-102.

Distribución: América meridional templada y caliente; en América septentrional como emigrante, norte de Argentina, este del Perú, Colombia, Venezuela, Guayana Holandesa, Islas de Trinidad y Tobago, Bolivia, Paraguay, Brasil suroeste y Uruguay.

Notas: Visitante de verano; llega en los primeros días de octubre y se retira en los primeros días de marzo, a veces ya en los últimos días de febrero. Frecuenta campos abiertos y bordes de pequeños montes; durante su residencia se encuentra distribuida en todo el país.

Tyrannus melancholicus melancholicus VIEILLOT

Benteveo real

Tyrannus melancholicus VIEILLOT, 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 35, p. 48 (Basado en AZARA, N.° 198): Paraguay.

Tyrannus melancholicus TREMOLERAS, 1920, p. 21.

Tyrannus melancholicus melancholicus WETMORE, 1926, pp. 337-338; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 106-107.

Distribución: Sur de Venezuela, este del Perú, Ecuador, Guayana Inglesa, Brasil oeste-septentrional, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Es visitante de verano; llega muy tarde (octubre). Los últimos individuos se retiran en los primeros días de abril. Durante su residencia nidifica y es muy abundante en los montes que bordean ríos y arroyos de todo el país.

Empidonomus varius varius (VIEILLOT)

Tuquito migratorio

Muscicapa varia VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 21, p. 458 (Basado en AZARA, N.° 187 "Suiriri chorreado debaxo"): Paraguay.

Empidonomus varius varius CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, p. 113; ZIMMER, 1937, pp. 22-25; PALERM, 1961 (primera cita para el Uruguay).

Distribución: La forma nominal de *E. varius* se distribuye por el norte de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Como migratoria llega hasta Perú, Colombia, Venezuela y las Guayanas Holandesa y Francesa.

Notas: Esta especie es conocida en el país por el ejemplar mencionado por PALERM (1961), obtenido el 24 de marzo de 1959, en el Ao. Tapes de Godoy, Dpto. de Lavalleja.

Empidonomus aurantio-atro-cristatus aurantio-atro-cristatus (LAFRESNAYE & D'ORBIGNY)

Tuc — Churí

Tyrannus aurantio-atro-cristatus LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 1837, Syn. Av., in Mag. Zool., 7, cl. 2, p. 45 (Valle Grande, Bolivia).

Empidonomus aurantio-atro-cristatus aurantio-atro-cristatus WETMORE, 1926, p. 337; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 115-116.

Empidonomus aurantio-atro-cristatus TREMOLERAS, 1927, p. 19.

Distribución: Se extiende por el este de Venezuela, Perú, Brasil oeste-septentrional y central, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: El Dr. B. Rebuffo encontró esta especie nidificando en la Barra del Ao. Riachuelo (12 Km. al este de la ciudad de Colonia). Nosotros la hemos observado y colectado en las puntas del Ao. Catalán Chico, Dpto. de Artigas (nidifica); Río Cuareim (40 Km. al noroeste de Artigas, donde también nidifica y el Paso Víctor, gajo sur del Ao. Tacuarembó Chico, Dpto. de Tacuarembó). No se sabe si en el Uruguay es un ave sedentaria o migratoria.

Myiodynastes maculatus solitarius (VIEILLOT)

Benteveo manchado o rayado

Tyrannus solitarius VIEILLOT. 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 35, p. 88 (Basado en AZARA, N.° 196): Paraguay.

Myiodynastes solitarius TREMOLERAS, 1920, p. 21; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 125-127; BARATTINI, 1945, p. 42.

Distribución: Vive desde Colombia, Venezuela y la Guayana Inglesa hasta el norte de la Rep. Argentina, a través del Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También ha sido registrado en Chile.

Notas: Frecuenta el interior de los montes, prefiriendo la cercanía del agua. Está distribuido en lugares apropiados de todo el país. Todos nuestros registros (Dptos. de Artigas, Tacuarembó, Florida y Soriano) fueron hechos entre los meses de diciembre y marzo, lo que indica que es probablemente migratorio en el Uruguay.

Pitangus sulphuratus argentinus TODD

Benteveo

Pitangus sulphuratus argentinus TODD, 1952, Ann. Carnegie Mus. 32 (5), p. 291 (Lavalle, Prov. de Buenos Aires, Argentina; tipo N.° 284.392 U.S. Nat. Mus., Col. A. WETMORE).

Pitangus sulphuratus bolivianus TREMOLERAS, 1920, p. 21; WETMORE, 1926, p. 331; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 153-154.

Distribución: Paraguay, Uruguay, extremo sur del Brasil y Argentina; como migratorio hasta las tierras bajas de Bolivia.

Notas: TODD (1952:291-293) al crear la subespecie *argentinus*, restringió la distribución geográfica de *P. s. bolivianus*(1) a las tierras

(1) *Saurophagus bolivianus* LAFRESNAYE, 1852, Rev. Mag. Zool., 2ª Ser., 4, p. 463 (Chuquisaca, Bolivia).

altas de Bolivia. En el Uruguay es un ave sedentaria, muy común y generalmente distribuida en todo el territorio. Frecuenta jardines, huertos y pequeños montes.

Myiarchus swainsoni swainsoni CABANIS & HEINE

Burlisto pardo

Myiarchus swainsoni CABANIS & HEINE, 1859, Mus. Hein., 2, p. 72 (Brasil; Ipanema, São Paulo, localidad típica sugerida por PINTO, 1944:170).

Myiarchus sordidus TODD, 1922, Proc. Soc. Biol. Wash., 35, pp. 195-197 (descripción, índices de identificación y distribución geográfica); WETMORE, 1926, p. 336 (Castillos, Dpto. de Rocha, 31 de enero de 1921).

Myiarchus swainsoni CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 173-174; TREMOLERAS, 1927, p. 19; BARATTINI, 1945, p. 44.

Distribución: Parte este de Sudamérica; Venezuela, las Guayanas, gran parte del Brasil, Uruguay y extremo noreste de Argentina (Misiones y Corrientes) según OLROG, 1959:233 y hasta el Delta del Paraná según PEREYRA (1937-38:217-218).

Notas: Wetmore obtuvo un ejemplar el 31 de enero de 1921 al borde de la Laguna de Castillos, Dpto. de Rocha. Los ejemplares del M.N.H.N. proceden de Punta Gorda, Dpto. de Colonia; San Gregorio, Dpto. de Artigas y Sierra de las Animas, Dpto. de Maldonado. Es un ave migratoria que pasa el verano en nuestro territorio.

Myiarchus ferox australis HELLMAYR

Burlisto común

Myiarchus ferox (no *Muscicapa ferox* GMELIN) SCLATER, 1888, Cat. Birds Brit. Mus., 14, p. 253, part. Brasil sudeste.

Myiarchus ferox swainsoni (no de CABANIS & HEINE) TODD, 1922, pp. 200-203; WETMORE, 1926, p. 336 (Chaco y Tucumán).

Myiarchus ferox ferocior (no de CABANIS) TREMOLERAS,(1) 1920, p. 21 (Paysandú y Cerro Largo).

Myiarchus Pelzelni ferocior (no de CABANIS) TREMOLERAS, 1927, p. 22; BARATTINI, 1945, p. 44.

Myiarchus ferox australis CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, p. 177: Agua Sucia (cerca de Bagagem, oeste de Minas Geraes), Brasil.

Distribución: La especie vive en casi toda Sudamérica; esta subespecie se extiende por el sur del Brasil, este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina hasta la Prov. de Buenos Aires.

---

(1) No estamos seguros si estas citas de Tremoleras se refieren a esta forma o si corresponden a *M. Pelzelni ferocior* = *M. swainsoni ferocior* (como lo considera HELLMAYR, 1927:172); pero el nombre "ferox" y el hallazgo en Paysandú nos hacen pensar que se trata de esta especie. Sería poco probable que Tremoleras trabajando durante tantos años, no hubiera encontrado en el norte del país a una especie relativamente común.

Notas: Es muy común en algunos lugares del norte del país, en montes húmedos que bordean lagunas, ríos y arroyos (Río Cuareim, Ao. Laureles y otros). En el sur es más rara y ha sido encontrada hasta ahora, sólo en el Ao. San Gregorio, Dpto. de San José y en el Ao. Milán, Dpto. de Florida (nidificando). Siempre fue cazado o registrado entre los meses de diciembre y marzo y por lo tanto, se trata posiblemente, de un ave migratoria en el Uruguay.

Empidonax euleri euleri (CABANIS)

Papa mosca

Empidochanes euleri CABANIS, 1868, Journ. Orn., 16, p. 195 (Cantagalo, Río de Janeiro, Brasil).
Empidonax euleri WETMORE, 1926, p. 335.
Empidonax Euleri TREMOLERAS, 1927, p. 19.
Empidonax euleri euleri CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 216-218.

Distribución: Se extiende por el Paraguay, Bolivia, Brasil centro-meridional, Uruguay y nordeste de la Rep. Argentina.

Notas: Vive en los montes y es poco visto. Los ejemplares del M.N.H.N. proceden de los Dptos. de Artigas, Tacuarembó y Colonia.

Myiophobus fasciatus flammiceps (TEMMINCK)

Mosqueta

Muscicapa flammiceps TEMMINCK, 1822, Nouv. Réc. Pl. Color, pl. 144, fig. 3 ("Brésil" = Río de Janeiro, localidad típica sugerida por HELLMAYR, 1927:250).
Myiophobus fasciatus (no de MÜLLER) TREMOLERAS, 1920, p. 21.
Myiophobus fasciatus auriceps WETMORE, 1926, p. 333.
Myiophobus fasciatus flammiceps CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 249-251.

Distribución: Bolivia, Paraguay, Brasil oriental y central, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Los ejemplares existentes en las colecciones uruguayas provienen de los Dptos. de Artigas, Colonia, San José, Lavalleja, Maldonado y Cerro Largo. Frecuenta montes y arbustos aislados. En enero de 1958 lo observamos en gran abundancia en la Estancia del Sr. Carlos Becker, Dpto. de Artigas, donde nidifica y es una de las aves más comunes junto con el siete vestidos *(Poospiza nigro-rufa)* y el azulejo *(Cyanoloxia glauco-caerulea)* en los pequeños montes de la Estancia (puntas del Ao. Catalán Chico). Se trata probablemente de una especie migratoria.

Hirundinea bellicosa bellicosa (VIEILLOT)

Viudita colorada

Tyrannus bellicosus VIEILLOT, 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 35, p. 74 (Basado en AZARA, N.º 189 "Suiriri roxo oscuro"): Paraguay.
Hirundinea bellicosa bellicosa (CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 256-257; SOSA, 1937, pp. 72-74; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 45-46.

Distribución: La dispersión geográfica de esta especie comprende el Paraguay, Brasil central y oriental, Uruguay y nordeste de Argentina.

Notas: En el Uruguay la viudita colorada ha sido encontrada en los Dptos. de Maldonado (Gruta La Salamanca, cita de Sosa, 10 de noviembre de 1935); Florida (Cerro Copetón); Tacuarembó (Pozo Hondo, Tambores) y Rivera (Sierra de la Aurora). También ha sido señalada en el Ao. Buricayupí (Dpto. de Paysandú) y en las Canteras de Burgeño (Dpto. de Maldonado).

* *Hemitriccus diops diops* (TEMMINCK)

Papasebo verde

Muscicapa diops TEMMINCK, 1822, Nouv. Réc. Pl. Color, 24, pl. 144, fig. 1 (Ipanema, São Paulo, Brasil).
Hemitriccus diops TREMOLERAS, 1920, p. 21.
Hemitriccus diops CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 343-344.

Distribución: Sur del Brasil, Paraguay y Argentina (Misiones).

Notas: Tremoleras (1920:21) cita esta especie bajo "Uruguay" y por lo tanto sin seguridad. Nosotros no conocemos ejemplares de procedencia uruguaya.

Phylloscartes ventralis ventralis (TEMMINCK)

Ligerito

Muscicapa ventralis TEMMINCK, 1824 (ex NATTERER manuscr.), Nouv. Réc. Pl. Color, pl. 275, livr. 46, fig. 2 ("Brésil" = Ipanema, São Paulo, col. NATTERER).
Phylloscartes ventralis ventralis CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 350,351; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 46-47.

Distribución: Sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de Argentina.

Notas: Siendo un ave muy pequeña, poco conspicua y el hecho de vivir en lo más oscuro y denso de los montes, contribuyen a que sea casi desconocida.

Hasta ahora ha sido colectada en las siguientes localidades: Pozo Hondo, Dpto. de Tacuarembó (23 de setiembre de 1957); Picada de Las Piedras, Dpto. de Durazno; Ao. Laureles, Dpto. de Tacuarembó; Ao. Milán, Dpto. de Florida; Ao. Cuaró, Paso Campamento, Dpto. de Artigas; Río Arapey, Dpto. de Salto; Rincón de Castellanos, Dpto. de Durazno y Cerro Arequita, Dpto. de Lavalleja. Todos los ejemplares fueron obtenidos en los meses de setiembre, enero, marzo y abril.

Euscarthmus meloryphus meloryphus WIED

Mosqueta copetona

Euscarthmus meloryphus WIED, 1831, Beitr. Naturges. Bras., 3 (2), p. 947 (Minas-Geraes y Bahía, Brasil). = Vallo Fundo, sudeste de Bahía, localidad típica propuesta por ZIMMER (1955:7).

Euscarthmus meloryphus meloryphus CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 358-359; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 47-48.

Distribución: Se extiende desde Colombia y Venezuela hasta el norte de la Rep. Argentina a través del Brasil oriental, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Notas: Los dos únicos ejemplares de esta especie colectados en el país, están en la colección del M.N.H.N., N.° 1383 procedente de Espinillar, Dpto. de Salto y N.° 1460, obtenido en el Ao. Cuaró, Dpto. de Artigas.

Pseudocolopteryx flaviventris (LAFRESNAYE & D'ORBIGNY)

Piojito amarillo

Alectrurus flaviventris LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 1837, Syn. Av., (1) in Mag. Zool., 7, cl. 2, p. 55 (Corrientes, Argentina).

Hapalocercus flaviventris TREMOLERAS, 1920, p. 21.

Myiosympotes flaviventris WETMORE, 1926, p. 317.

Pseudocolopteryx flaviventris CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 363-364; TREMOLERAS, 1927, p. 22.

Distribución: Chile, Paraguay, sur del Brasil, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Frecuenta juncales y pajonales. Ha sido registrado en varios lugares cerca de Montevideo: Bañados de Carrasco, Parque Lecoq y Las Brujas. El ejemplar de la colección del M.N.H.N. procede de San Gregorio, Dpto. de Artigas (23 de marzo de 1959).

Habrura pectoralis pectoralis (VIEILLOT)

Tachurí

Sylvia pectoralis VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11, p. 210 (Basado en AZARA, N.º 165 "Tachurí pecho amarillo"): Paraguay.

Polystictus pectoralis minima TREMOLERAS, 1920, p. 21.

Habrura pectoralis pectoralis CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 364-365.

Habrura pectoralis TREMOLERAS, 1927, p. 22.

Distribución: Brasil central y meridional, este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Es poco común; los únicos ejemplares en colecciones uruguayas son el del M.N.H.N. obtenido el 18 de abril de 1958, en Pozo Hondo, Tambores, Dpto. de Tacuarembó y el de la Soc. Taguató, procedente de San Gregorio, Dpto. de Artigas.

Tachuris rubrigastra rubrigastra (VIEILLOT)

Siete colores de laguna

Sylvia rubigastra (err. typ.) VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd,. 11, p. 277 (Basado en AZARA, N.º 161 "Tachurí rey"): Paraguay (localidad típica, PINTO, 1944:256) y Buenos Aires.

Tachuris rubrigastra TREMOLERAS, 1920, p. 21.

Tachuris rubrigastra rubrigastra CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 368-369.

Distribución: Se extiende por Chile, Argentina, sur del Brasil y Uruguay.

Notas: Es sedentario y bastante común en los juncales de bañados y lagunas de la costa marítima, en los Dptos. de Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, San José y Colonia.

Serpophaga subcristata subcristata (VIEILLOT) (1)

Tiqui-tiqui

Sylvia subcristata VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11, p. 229 (Basado en AZARA, N.º 160 "Contramaestre copetillo ordinario"): Paraguay.

Serpophaga subcristata TREMOLERAS, 1920, p. 21; WETMORE, 1926, p. 318; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 382-383.

Distribución: Bolivia, Paraguay, Brasil oriental y meridional, norte de la Argentina y Uruguay.

Notas: Frecuenta montes y lugares arbolados de todo el país. Es sedentario y muy común.

---

(1) Por las subespecies *S. s. munda* Berlepsch y *S. s. straminea* (TEMMINCK), ver ZIMMER (1955:14-18).

Serpophaga nigricans (VIEILLOT)

Oscurito — Titirre

Sylvia nigricans VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11, p. 204 (Basado en AZARA, N.º 167): Paraguay; localidad típica según PINTO, 1944:261 y Río de La Plata.

Serpophaga nigricans TREMOLERAS, 1920, p. 21; WETMORE, 1926, p. 321; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 387-389.

Distribución: Brasil oeste-meridional, norte de la Rep. Argentina, Paraguay y Uruguay.

Notas: Es sedentario; vive siempre cerca del agua y es muy común en las orillas de ríos, arroyos y lagunas de todo el país.

Elaenia parvirostris PELZELN

Viudita pico corto

Elainea parvirostris PELZELN, 1868, Orn. Bras., 2, pp. 107, 178 (Curytiba, Paraná, Brasil).

Elaenia parvirostris TREMOLERAS, 1920, p. 21; WETMORE, 1926, p. 328; CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 414-416.

Distribución: Se extiende desde Colombia, Venezuela y la Guayana Inglesa hasta el norte de la Rep. Argentina, a través del Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También vive en Ecuador, Perú e Isla de Aruba.

Notas: Es visitante del verano; durante su estadía nidifica y se encuentra distribuida en todo el país.

Suiriri suiriri suiriri (VIEILLOT)

Suiriri

Muscicapa suiriri VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 21, p. 487 (Basado en AZARA, N.º 179 "Suiriri ordinario"): Paraguay; localidad típica restringida a Puerto Pinasco por ZIMMER (1955:18).

Empidagra suiriri TREMOLERAS, 1920, p. 21.

Suiriri suiriri CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 442-443; TREMOLERAS, 1927, p. 22.

Distribución: Bolivia, Paraguay, Brasil oeste-meridional y central, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Sedentario. Los ejemplares del M.N.H.N. proceden de los Dptos. de Artigas, Salto y Soriano. También ha sido registrado para los Dptos. de Canelones y San José.

Sublegatus modestus brevirostris (D'ORBIGNY & LAFRESNAYE)

Falsa viudita

Muscipecta brevirostris D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837, Syn. Av. (1), in Mag. Zool., 7, cl. 2, p. 49 (Corrientes, Argentina).

Sublegatus modestus modestus (no de WIED) CORY-HELLMAYR, 1927, *5*, pp. 445-447; ZOTTA, 1944, p. 154.

Sublegatus modestus brevirostris OLROG, 1959, p. 247; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 48-49.

Distribución: La dispersión geográfica de esta subespecie comprende el norte de la Argentina, extremo sur del Brasil y Uruguay.

Notas: Los únicos ejemplares obtenidos en el Uruguay, son los del M.N.H.N., procedentes de la Barra del Ao. Riachuelo, Dpto. de Colonia, Espinillar, Dpto. de Salto (VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:48-49), y Playa Penino, Dpto. de San José (8 de octubre de 1961).

Familia PHYTOTOMIDAE

Phytotoma rutila rutila VIEILLOT

Quejón — Cortarrama — Corderito

Phytotoma rutila VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 26, p. 64 (Basado en AZARA, N.° 91): Paraguay.

Phytotoma rutila VIEILLOT, 1927, p. 19.

Phytotoma rutila rutila HELLMAYR, 1929, *6*, p. 249.

Distribución: Sur del Paraguay, norte de Argentina (hasta el Río Negro y extremo oeste) y sur del Uruguay.

Notas: Abunda especialmente en el litoral del Río Uruguay, en los Dptos. de Soriano (Colonia Concordia) y Colonia (Ao. Víboras, Conchillas, Barra del Ao. Riachuelo y La Paz). En invierno ha sido registrado en los Dptos. de San José (Arazatí, Punta Jesús María, Barra del Ao. Carreta Quemada y Rincón de La Torre), Montevideo, Canelones y Maldonado (Sierra de las Animas). Nada se sabe sobre su presencia en los Dptos. del litoral superior del Río Uruguay (al norte del Río Negro).

Familia HIRUNDINIDAE

Progne chalybea domestica (VIEILLOT)

Golondrina azul

Hirundo domestica VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 14, p. 520 (Basado en AZARA, N.° 300 "Golondrina doméstica"): Paraguay.
Progne chalibea domestica TREMOLERAS, 1920, p. 22; WETMORE, 1926, p. 346; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 21; PETERS, 1960, *9*, p. 87.

Distribución: América meridional: Venezuela, Brasil central y meridional, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Notas: Estrictamente migratoria; aparece en el país en los primeros días de setiembre (muy rara vez en agosto) y se retira en los primeros días de marzo. Durante su estadía frecuenta ciudades y pueblos.

Progne modesta elegans BAIRD

Golondrina negra

Progne elegans BAIRD, 1865, Rev. Amer. Bds., (1), p. 275 (Río Bermejo, Rep. Argentina).
Progne furcata TREMOLERAS, 1920, p. 22.
Progne modesta elegans HELLMAYR, 1935, *8*, p. 23; PETERS, 1960, *9*, p. 88.

Distribución: Se extiende por Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay.

Notas: TREMOLERAS (1920:22) cita esta golondrina para los Dptos. de Montevideo, Canelones y San José. Nosotros no conocemos ejemplares cazados en el Uruguay. La hemos observado en el Dpto. de Montevideo (Carrasco y Punta Carreta, noviembre y diciembre de 1959-1960). Se parece mucho a la golondrina azul, de la que se diferencia, lo mismo que de otras especies, por el color negro del vientre.

Progne tapera fusca (VIEILLOT)

Golondrina parda

Hirundo fusca VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 14, p. 510 (Basado en AZARA, N.° 301 "Golondrina parda"): Paraguay.
Phaeoprogne tapera (no de LINNÉ) TREMOLERAS, 1920, p. 22.
Phaeoprogne tapera tapera WETMORE, 1926, p. 345.
Phaeoprogne tapera fusca HELLMAYR, 1935, *8*, p. 29.
Progne tapera fusca PETERS, 1961, *9*, p. 85.

Distribución: Desde Colombia, Venezuela y la Guayana Inglesa hasta el norte de la Rep. Argentina, a través del Brasil septentrional, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Notas: Migratoria; se encuentra en el país desde fines de setiembre hasta mediados de abril. Muy común y generalmente distribuida en todo el territorio.

Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota (VIEILLOT)

Golondrina de rabadilla parda

Hirundo pyrrhonota VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 14, p. 519 (Basado en AZARA, N.° 305 "Golondrina de rabadilla acanelada"): Paraguay.

Petrochelidon pyrrhonota GIBSON, 1885, The Ibis, p. 277 (Paysandú).

Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota HELLMAYR, 1935, *8*, pp. 29-31; PETERS, 1960, *9*, pp. 120-121; CUELLO & ZORRILLA DE SAN MARTÍN, 1961.

Distribución: Anida desde Alaska, Canadá y los Estados Unidos; emigra a Sudamérica hasta el norte de Argentina.

Notas: El único ejemplar obtenido en el Uruguay es el de la Soc. Taguató, N.° 620, procedente de San Gregorio, Dpto. de Artigas (28 de febrero de 1960).

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis (VIEILLOT)

Golondrina de los campos

Hirundo ruficollis VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 14, p. 523 (Brasil, cerca de Río de Janeiro).

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis HELLMAYR, 1935. *8*, pp. 38-40; PETERS, 1960, *9*, p. 94; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 50-51.

Distribución: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay, norte de la Rep. Argentina y Uruguay. También ha sido señalada en el Perú.

Notas: Los ejemplares de la colección del M.N.H.N. proceden de Carrasco, Dpto. de Montevideo (enero de 1920) y Paso Severino, Dpto. de Florida (marzo de 1939).

Alopochelidon fucata (TEMMINCK)

Golondrina chica de cabeza castaña

Hirundo fucata TEMMINCK, 1822, Nouv. Rec. Pl. Color, livr. 27, pl. 161, fig. 1 ("Brésil" = alrededores de São Paulo, localidad típica sugerida por PINTO, 1944:316).

Alopochelidon fucatus TREMOLERAS, 1920, p. 22.

Alopochelidon fucata HELLMAYR, 1935, *8*, p. 49; PETERS, 1960, *9*, p. 92.

Distribución: Venezuela, Perú, Brasil meridional, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Los ejemplares del M.N.H.N. proceden de los Dptos. de Artigas y Salto. Ha sido registrada en otros Dptos. (Paysandú, Soriano, Colonia, Montevideo, Florida, Lavalleja y Treinta y Tres). Se encuentra en el país desde agosto hasta marzo; en invierno no ha sido encontrada. Se parece a la golondrina ribereña, pero tiene la garganta y la parte superior de la cabeza color marrón rojizo y el dorso gris-pardo, en lugar de azulado como aquélla.

Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca (VIEILLOT)

Golondrina ribereña de verano

Hirundo cyanoleuca VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 14, p. 509 (Basado en AZARA, N.° 303 "Golondrina de los timoneles negros"): Paraguay.

Pygochelidon cyanoleuca WETMORE, 1926, p. 343.

Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca HELLMAYR, 1935, *8*, p. 55; ZOTTA, 1944, p. 158.

Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca PETERS, 1960, *9*, p. 89.

Distribución: Desde América Central y Venezuela hasta el extremo norte de la Rep. Argentina, a través de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También en Perú, Ecuador y la Isla de Trinidad.

Notas: En el Uruguay se encuentra solamente en verano, época en la que es muy común en todo el territorio, sobre todo a lo largo de las corrientes de agua.

Notiochelidon cyanoleuca patagonica D'ORBIGNY & LAFRESNAYE

Golondrina ribereña de invierno

Hirundo patagonica D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837, Syn. Av., (1), in Mag. Zool., cl. 2, p. 69 (Patagonia = Río Negro, Argentina, según HELLMAYR, 1935:56).

Pygochelidon cyanoleuca patagonica TREMOLERAS, 1920, p. 22; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 58.

Notiochelidon cyanoleuca patagonica PETERS, 1960, *9*, pp. 89-90.

Distribución: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; en invierno emigra al norte hasta Colombia y Venezuela (PHELPS & PHELPS, 1950:219).

Notas: En invierno es muy común en todo el país. Las dos subespecies son muy parecidas, por lo que resulta difícil establecer si todos los individuos que se encuentran durante el verano en nuestro

territorio, pertenecen a la raza típica o si también quedan algunos de *N. c. patagonica.* Tampoco se sabe cuándo aparece una subespecie ni cuándo se retira la otra.

Hirundo rustica erythrogaster BODDAERT

Golondrina tijereta

Hirundo erythrogaster BODDAERT, 1783, Tabl. Pl. Enl., p. 45 (Basado en "Hirondelle á ventre roux de Cayenne" DAUBENTON, pl. Enl., 724, fig. 1): Cayena.

Hirundo rustica erythrogaster HELLMAYR, 1935, *8*, pp. 65-67; PETERS, 1960, *9*, p. 107; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 49-50.

Distribución: Nidifica en Norteamérica hasta México; en invierno se extiende por Centro y Sudamérica hasta el extremo sur.

Notas: Bandadas de esta golondrina, fueron vistas por el señor E. Gómez-Haedo en febrero de 1959-1960, cerca de La Coronilla, Dpto. de Rocha, de donde proceden los únicos ejemplares colectados en el país, N.os 1249 y 1527 del M.N.H.N.

Tachycineta leucorrhoa (VIEILLOT)

Golondrina de rabadilla y cejas blancas

Hirundo leucorrhoa VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 14, p. 519 (Basado en AZARA, N.º 304 "Golondrina de rabadilla blanca"): Paraguay.

Tachycineta leucorrhoa TREMOLERAS, 1920, p. 22; PETERS, 1960, *9*, p. 83.

Iridoprocne leucorrhoa WETMORE, 1926, p. 341; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 75.

Distribución: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil meridional, Uruguay y la parte norte de la Rep. Argentina.

Notas: En verano esta especie es muy común en todo el país; ocasionalmente aparece en invierno. Otras dos especies de golondrinas de rabadilla blanca, *Tachycineta albiventer,*(1) que habita en la parte tropical y subtropical de Sudamérica hasta Santa Fe y Corrientes en la Rep. Argentina, y *Tachycineta leucopyga,*(2) que nidifica en el sur de Chile y Argentina, emigrando en invierno hasta el Paraguay, no han sido registradas en el Uruguay, pero podrían fácilmente llegar a nuestro territorio, sobre todo durante las migraciones. En el Delta del Paraná aparecen ambas especies, la primera muy rara vez, la segunda regularmente en invierno.

---

(1) *Hirundo albiventer* BODDAERT, 1783, Tabl. Pl. Enl., p. 32 (Cayena).

(2) *Hirundo leucopyga* MEYEN, 1834, Nov. Act. Leop-Carol., 16, Suppl., p. 73, pl. 10, fig. 2 (Santiago de Chile).

Familia CORVIDAE

Cyanocorax chrysops chrysops (VIEILLOT)

Urraca azul

Pica chrysops VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 26, p. 124 (Basado en AZARA, N.º 53 "Acahé"): Paraguay.
Cyanocorax chrysops TREMOLERAS, 1920, p. 24.
Cyanocorax chrysops chrysops HELLMAYR, 1934, 7, p. 18.

Distribución: La urraca azul vive en el este de Bolivia, Paraguay, sur del Brasil, Uruguay y norte de la Rep. Argentina.

Notas: En la parte norte y central del Uruguay, la urraca azul es muy común en los montes que bordean los grandes ríos y arroyos. Se encuentra en los Dptos. de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú, Río Negro; en todo el valle del Río Negro y en muchos de sus afluentes (desembocadura del Ao. Mansavillagra en el Río Yí, Dpto. de Florida). Falta absolutamente en los Dptos. de Colonia, San José, Montevideo, Canelones y Maldonado.

* *Cyanocorax cyanomelas* (VIEILLOT)

Urraca morada

Pica cyanomelas VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 26, p. 127 (Basado en AZARA, N.º 54 "Urraca morada"): Paraguay.
Cyanocorax cyanomelas TREMOLERAS, 1920, p. 24; HELLMAYR, 1934, 7, pp. 25-27; BARATTINI, 1945, p. 53.

Distribución: Se extiende por el este de Bolivia, Paraguay, sudeste del Brasil y norte de la Rep. Argentina.

Notas: Fue mencionada por TREMOLERAS (1920:24) bajo "Uruguay", pero hasta ahora no se conocen ejemplares de procedencia uruguaya.

Familia TROGLODYTIDAE

Troglodytes aëdon bonariae HELLMAYR

Ratonera

Troglodytes musculus bonariae HELLMAYR, 1919, Anz. Orn. Gesells. Bay., 1, p. 2 (La Plata, Rep. Argentina).
Troglodytes musculus bonariae TREMOLERAS, 1920, p. 22; WETMORE, 1926, p. 348; HELLMAYR, 1934, 7, p. 242.
Troglodytes aëdon bonariae PETERS, 1960, 9, pp. 426-427.

Distribución: Vive en el extremo sur del Brasil, este de la Rep. Argentina y en el Uruguay.

Notas: Sedentaria, muy común y generalmente distribuida en todo el país. Frecuenta montes, parques y jardines.

PAYNTER JR. & VAURIE (1960: en PETERS, *9*, p. 393), mencionan como probable la presencia de *Cistothorus platensis polyglottus* (1) en el Uruguay.

Familia MIMIDAE

Mimus saturninus modulator (GOULD)

Calandria

Orpheus modulator GOULD, 1836, Proc. Zool. Soc. London, 4, p. 6 ("in Fretu Magellanico"; error = Boca del Río de La Plata, localidad típica designada por HELLMAYR, 1941:159).

Mimus modulator TREMOLERAS, 1920, p. 22.

Mimus saturninus modulator WETMORE, 1926, p. 352; HELLMAYR, 1934, *7*, p. 331; PETERS, 1960, *9*, p. 446.

Distribución: Sudeste de Bolivia, Paraguay, norte de Argentina, extremo sur del Brasil y el Uruguay.

Notas: Es sedentaria, muy común y generalmente distribuida en todo el territorio.

Mimus triurus (VIEILLOT)

Calandria blanca — Calandria de tres colas

Turdus triurus VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 20, p. 275 (Basado en AZARA, N.° 275 "Calandria de tres colas"): Paraguay.

Mimus triurus TREMOLERAS, 1920, p. 22; HELLMAYR, 1934, *7*, p. 333; PETERS, 1960, *9*, p. 447.

Distribución: Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil oeste-septentrional, norte de Argentina y el Uruguay.

Notas: En el Uruguay es poco abundante; ha sido registrada principalmente en los Dptos. de Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Lavalleja, Soriano y Salto.

---

(1) *Thryothorus polyglottus* VIEILLOT, 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 34, p. 59 (Paraguay).

Familia TURDIDAE

Turdus amaurochalinus CABANIS

Sabiá

Turdus amaurochalinus CABANIS, 1851, Mus. Hein., 1, p. 5 "Brasilien" (Río Grande do Sul, localidad típica sugerida por PINTO, 1944:370).
Planesticus amaurochalinus TREMOLERAS, 1920, p. 21.
Turdus amaurochalinus WETMORE, 1926, p. 357; HELLMAYR, 1934, 7, p. 399.

Distribución: Paraguay, Bolivia, Brasil central y oriental, Uruguay y norte de la Rep. Argentina.

Notas: Muy común y generalmente distribuido en todo el territorio. Frecuenta montes, parques y jardines.

Turdus rufiventris rufiventris VIEILLOT

Zorzal

Turdus rufiventris VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 20, p. 226 "Brésil" (Río de Janeiro, localidad típica sugerida por BRABOURNE & CHUBB, 1912:344).
Planesticus rufiventris TREMOLERAS, 1920, p. 21.
Turdus rufiventris rufiventris WETMORE, 1926, p. 355; HELLMAYR, 1934, 7, p. 405.

Distribución: Este de Bolivia, Paraguay, Brasil central y oestemeridional, norte de Argentina y Uruguay.

Notas: Igual que *T. amaurachalinus* es muy común, encontrándose en los montes de todo el país.

Familia SYLVIIDAE

Polioptila dumicola dumicola (VIEILLOT)

Azulito

Sylvia dumicola VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11, p. 170 (Basado en AZARA, N.º 158 "Contramaestre azuladillo"): Paraguay.
Polioptila dumicola TREMOLERAS, 1920, p. 22; WETMORE, 1926, p. 359.
Polioptila dumicola dumicola HELLMAYR, 1934, 7, p. 490.

Distribución: Bolivia, Paraguay, extremo sur del Brasil, Uruguay y norte de Argentina.

Notas: Es sedentaria y muy común; vive en montes y matorrales espinosos. Generalmente distribuida en todo el territorio.

Familia MOTACILLIDAE

Anthus furcatus furcatus LAFRESNAYE & D'ORBIGNY

Cachila de uña corta

Anthus furcatus LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 1837, Syn. Av., (1), in Mag. Zool. 7, cl. 2, p. 27 "Patagonia" = (Carmen de Patagones, Buenos Aires, Rep. Argentina).

Anthus furcatus furcatus WETMORE, 1926, p. 360; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 88; PETERS, 1960, *9*, p. 163.

Anthus furcatus BARATTINI, 1945, p. 45.

Distribución: Paraguay, extremo sur del Brasil, Argentina y Uruguay.

Notas: Sedentaria y generalmente distribuida en todo el país; frecuenta campos abiertos y es la especie más común de la familia *Motacillidae* en el Uruguay. Tremoleras no la mencionó en su lista, probablemente porque consideraba todas las cachilas obtenidas u observadas por él, como pertenecientes a la especie *correndera* (que en realidad es más rara que *furcatus)*. Sin duda una gran parte de sus observaciones deben referirse a esta especie.

Anthus correndera correndera VIEILLOT

Cachila de uña larga

Anthus correndera VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 26, p. 491 (Basado en AZARA, N.° 145 "La correndera"): Paraguay y Río de La Plata.

Anthus correndera TREMOLERAS, 1920, p. 22.

Anthus correndera correndera HELLMAYR, 1921, p. 185; WETMORE, 1926, p. 361; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 98; PETERS, 1960, *9*, p. 165.

Distribución: Vive en Paraguay, Argentina, sur del Brasil y Uruguay.

Notas: Es más rara que la especie anterior y frecuenta campos más húmedos que aquélla. Los ejemplares del M.N.H.N. proceden de La Coronilla, Dpto. de Rocha; Barra de Santa Lucía, Dpto. de San José y Bañado Piedra del Toro, Dpto. de Canelones.

Anthus chii chii VIEILLOT — Cachila chica

Anthus chii VIEILLOT, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 26, p. 490 (Basado en AZARA, N.º 146 "Alondra Chii"): Paraguay.
Anthus chii D'ORBIGNY, 1838, Voy. Amér. Mérid., Ois., p. 225 (Maldonado, Uruguay).
Anthus lutescens lutescens HELLMAYR, 1921, pp. 183-184; Id., 1935, *8*, pp. 89-91; ZOTTA, 1944, p. 166; PETERS, 1960, *9*, p. 164; VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961, pp. 51-54.
Anthus chii chii ZIMMER, 1953, pp. 17-20.
Anthus lutescens (A. chii of ZIMMER) HALL, 1961, p. 284.

Distribución: Se extiende desde Colombia, Venezuela y las Guayanas hasta el norte de la Rep. Argentina, a través del Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Notas: Frecuenta campos húmedos; hasta el momento ha sido colectada únicamente en el Ao. Tropas Viejas, Dpto. de Canelones (octubre y noviembre de 1958); San Gregorio, Dpto. de Artigas (marzo de 1959) y en el Río Yaguarón, cerca de Río Branco, Dpto. de Cerro Largo (agosto de 1960).

Anthus hellmayri brasilianus HELLMAYR — Cachila pálida

Anthus hellmayri brasilianus HELLMAYR, 1921, El Hornero, *2*, p. 190 (Campos de Itatiaya, Río de Janeiro, Brasil).
Anthus hellmayri brasilianus HELLMAYR, 1935, *8*, p. 101; ZOTTA, 1944, p. 168; PETERS, 1960, *9*, p. 163.

Distribución: La dispersión geográfica de esta subespecie comprende el Brasil, norte de la Rep. Argentina y el Uruguay.

Notas: HELLMAYR (1935:101) refiere un ejemplar procedente de Maldonado, Estancia el Corte, 15 Km. al norte de San Carlos. Nosotros no la hemos encontrado.

Familia CYCLARHIDAE

Cyclarhis gujanensis ochrocephala TSCHUDI — Juan chiviro

Cyclarhis ochrocephala TSCHUDI, 1845, Arch. f. Naturges., 11, p. 362 (Sur del Brasil; localidad típica, según PINTO, 1944:393, y Buenos Aires).
Cyclarhis ocrocephala TREMOLERAS, 1920, p. 22; WETMORE, 1926, p. 366.
Cyclarhis gujanensis ochrocephala HELLMAYR, 1935, *8*, p. 207.

Distribución: Se extiende por el este del Paraguay, sudeste del Brasil, norte de Argentina y Uruguay.

Notas: El juan chiviro es residente permanente, muy común y generalmente distribuido en todo el país. Vive preferentemente en los montes.

Familia VIREONIDAE

Vireo olivaceus diversus ZIMMER

Chivi-chivi

Vireo olivaceus diversus ZIMMER, 1941, Amer. Mus. Novitates, N.º 1127, pp. 7-8, p. 4. (Roca Nova, Paraná, Brasil).

Vireo virescens chivi WETMORE, 1926, p. 367; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 138.

Distribución: Sur del Brasil, este del Paraguay, noreste de la Rep. Argentina y Uruguay.

Notas: Fue encontrada por primera vez en el Uruguay, por Wetmore en 1921 en el Dpto. de Rocha. Vive exclusivamente en los montes. Los ejemplares del M.N.H.N. proceden de los Dptos. de Artigas, Tacuarembó y Lavalleja.

Familia PARULIDAE

Parula pitiayumi pitiayumi (VIEILLOT)

Pitiayumi

Sylvia pitiayumi VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11, p. 276 (Basado en AZARA, N.º 109 "Pico de punzón celeste pecho de oro"): Paraguay.

Compsothlypis pitiayumi TREMOLERAS, 1920, p. 22.

Compsothlypis pitiayumi pitiayumi WETMORE, 1926, p. 371; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 359.

Distribución: Vive en Bolivia, Paraguay, Brasil central y oriental, norte de Argentina y Uruguay.

Notas: Frecuenta los montes de todo el país, pero es más abundante en el norte y en el valle del Río Negro.

Geothlypis aequinoctialis velata (VIEILLOT)

Sylvia velata VIEILLOT, 1807, Hist. Nat. Ois. Amer. Septent.. 2, p. 22, pl. 74 (Río de Janeiro, Brasil; localidad típica sugerida por NAUMBURG, 1930:339).
Geothlypis aequinoctialis cucullata TREMOLERAS, 1920, p. 22.
Geothlypis aequinoctialis velata WETMORE, 1926, p. 370; HELLMAYR, 1935, *8*, p. 438.

Distribución: Este del Perú, Bolivia, Brasil este-meridional, norte de la Rep. Argentina y Uruguay.

Notas: Vive en pequeños montes, prefiriendo la proximidad del agua; es un ave poco abundante, pero está generalmente distribuida en todo el país.

Basileuterus leucoblepharus (VIEILLOT)

Arañero oliváceo

Sylvia leucoblephara VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11, p. 206 (Paraguay).
Basileuterus leucoblepharides leucoblepharides WETMORE, 1926, pp. 369-370.
Basileuterus leucoblepharus HELLMAYR, 1935, *8*, pp. 485-486.

Distribución: Paraguay, parte sur del Brasil, Uruguay y noreste de Argentina.

Notas: Vive solamente en los montes, casi siempre en lugares umbríos; es residente permanente.

Basileuterus culicivorus azarae ZIMMER

Arañero chico

Basileuterus culicivorus azarae ZIMMER, 1949, Amer. Mus. Novitates, N.° 1428, pp. 44-47 (Sapucay, Paraguay).
Basileuterus auricapillus auricapillus WETMORE, 1926, pp. 368-369.
Basileuterus culicivorus auricapillus HELLMAYR, 1935, *8*, p. 500.

Distribución: Sur del Brasil, Paraguay, norte de la Rep. Argentina y el Uruguay.

Notas: Wetmore en 1921, fue el primero que encontró esta especie en el país (Dpto. de Rocha). Los ejemplares de la colección del M.N.H.N. proceden de los Dptos. de Tacuarembó (Tambores, Pozo Hondo); Durazno (Rincón de Castellanos), Maldonado (Sierra de las Animas) y Rocha (Laguna Negra). Vive únicamente en los montes.