

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

† Corollatae.

* *Scutamineae, inferae: fructu, loculari, infero.*

50. RENEALMIA. *Corolla* 3fida: nectario oblongo. *Calix* 1phyllus. *Bacca* carnosa.
2. AMOMUM. *Cor.* 3partita: labio ovato.
6. CURCUMA. *Cor.* 3fida. *Nectarium* 4phyllum ovato-acuminatum. *Stam.* 4 sterilia.
8. THALIA. *Cor.* 5petala. *Drupa* 4locularis.
5. MARANTA. *Cor.* 5fida, *ringens*: labio 2partito magno.
51. MYROSMA. *Cor.* 5partita irregularis. *Cal.* duplex.
7. KAEMPFERIA. *Cor.* 6partita: labio 2partito plano.
1. CANNA. *Cor.* 6partita: labio 2partito revoluto. *Cal.* 3phyllus.
4. ALPINIA. *Cor.* quasi duplicata: utraque 3fida, interior brevior ventricosa: lobis lateralibus 2 emarginatis.
3. COSTUS. *Cor.* ringens: labio 3fido: media lacinia emarginata.
- PHILYDRUM. *Cor.* 4petala. *Cal.* 0. *Antherae* geminae.
- SPHAEROCARPUS. *Cor.* tubulosa: limbo 5partito. *Caps.* globosa polysperma.
- HEDYCHUM. *Cor.* tubo filiformi infra faucem perforatam subinflato, limbo duplici: utroque tripartito.
- TSIANA. *Cor.* subcampanulata: fauce pilis densis clausa.

† *Vale-*

Circumscissa capsula dicitur illa, quae maturo fructu horizontaliter discedit.

Superus flor s. calix, cui germen sub receptaculo, vel cujus calix abie in fructum, secundum Tournefortii.

Inferus flor, cui germen supra receptaculum, vel cujus pistillum abie in fructum emittit Tournefortii.

Ergo fructus inferus et flor superus idem sunt, ut ex opposito fructus superus et flor inferus.

† *Valeriana rubra*, *Caleitrapa*, *Tradescantia monandra*
** floribus monoicis.

1427. PHYLLACHNE. Cor. infundibuliformis. Cal. 3phyllus
perus. Caps. polysperma.

1036. ELATERIUM. Cal. o. Cor. hypocrateriformis. Caps.
pulposa.

† Apetalae.

* floribus divicis.

1096. PANDANUS. ♂. Cal. o. *Anthera* sessilis, ramifica
thyrsi inserta. *Filam.* o.

♀. Cal. o. Cor. o. *Stigmata* 2. *Fructu*
positus.

BROSIMUM. *Amentum* globosum undique testum
orbiculatis peltatis. Cor. o.

♂. *Filamenta* solitaria inter squamas.

♀. *Stilus* bifidus. *Bacca* 1 sperma.

ASCARINA. *Amentum* filiforme. Cor. o.

♂. *Anthera* 4 sulca.

♀. *Stil.* o. *Stigma* subtrilobum. P.

1 sperma.

** floribus monoicis.

NIPA. *Spatha*. Cor. mar. 6 petala. *Drupae* an

1428. CASUARINA. ♂. Cal. amenti, *squamulis* bipartitis o
mentientibus.

♀. Cal. amenti. *Stil.* bifidus. *Strobil.*

1399. MYRISTICA. Cal. 3fidus. *Stil.* brevissimus: stigma
acutum.

1426. ARTOCARPUS. ♂. Cal. bivalvis.

♀. Cal. o. *Stil.* 1. *Drupa* multilocul.

1033. CYNOMORIUM. Cal. amenti. *Stil.* 1. *Sem.* 1. *fabru.*

BALANOPHORA. Cal. o.

♂. pauci, Cor. 4 petala.

♀. innumeri, Cor. o.

1203. CHARA. ♂. Cal. o.

♀. Cal. 4phyllus. *Stigma* 3fidum, *Sem.*

*** floribus hermaphroditis.

9. BOERHAAVIA. Cal. o. Cor. 1 petala, campanulata.

11. HIPPURIS. Cal. o. Cor. o.

10. SALICORNIA. Cal. 1phyllus, 4gonus, truncatus, 35.

colus. Cor. o.

APHANES.

Cal. 1phyllus, tubulatus: ore plano 4-8
fido. Cor. o.

NECKERIA.

Cal. 1phyllus, 5dentatus. Cor. o. *Sem.* 1.
Rec. squamae baccatae fructus inclu-
dentes.

TAMBURISSA.

Cal. commun. 4fidus, persistens. Cor. o.
fructus depresso globosus: nucleis tu-
nica aurantia vestitis.

CUCULLARIA.

Cor. 4petala inaequalis: *petalum* superius
basi desinens in *nectarium* cornicula-
tum longum.

Anth. 2locularis. *Pericarpium* 3locula-
re, polyspermum.

QUALEA.

Cor. 2petala, inaequalis: *Petalum* superius
basi desinens, in *nectarium* cornicula-
tum breve. *Anthera* sulcata.

MONODYNAMIS.

Cal. 4fidus: lacinia unica maxima. Cor.
infundibuliformis 4fida. *Caps.* 2sper-
ma: *Semina* arillata.

Scirpus polytrichoides, *atropurpureus*, *ae-*
stivalis, *anomalus*.

Cyperus nitens, *flavidus*, *leucocephalus*.

DIGYNIA.

* floribus hermaphroditis.

† Plantae.

12. CORISPERMUM.

Cal. o. Cor. 2petala. *Sem.* 1.

13. CALLITRICHE.

Cal. o. Cor. 2petala. *Caps.* bilocularis.

14. BLITUM.

Cal. 3fidus baccatus. Cor. o. *Sem.* 1.

52. MNIARUM.

Cal. 4partitus superus. Cor. o. *Sem.* 1.

LACISTEMA.

Cal. amenti squama. Cor. 4partita. *Filum*
2fidum. *Bacca* pedicellata, 1 sperma.

†† Gramineae.

Leersia monandra. *Cinna*.

** floribus monoicis.

35. CERATOCARPUS. Cal. 2partitus. Cor. o. *Sem.* 1. inferum,

radescantia monandra.

*ormis. Cal. 3phyllus
capf. polysperma.
cateriformis. Capf.*

*va sessilis, ramificatio
nra. Filam. o.*

Stigmata 2. Fructus

*n undique tectum fo
peltatis. Cor. o.*

*aria inter squamas.
Bacca 1sperma.*

Cor. o.

na subtrilobum, Pa

*6petala. Drupae ang
quamulis bipartitis co*

Seis. bñidus. Strabulum

brevissimus: stigma

*Drupa multiloculari
vit. 1. Sem. 1. subrotu*

*etala.
o.*

Stigma 3fidum, Sem

etala, campanulata.

*4gonus, truncatus,
r. o.*

APHANES.

*Cal. 1phyllus, tubulatus: ore plano 4-8
fido. Cor. o.*

NECKERIA.

*Cal. 1phyllus, 5dentatus. Cor. o. Sem. 1.
Rec. squamae baccatae fructus inclu-
dentes.*

TAMBURISSA.

*Cal. commun. 4fidus, persistens. Cor. o.
fructus depresso globosus: nucleis tu-
nica aurantia vestitis.*

CUCULLARIA.

*Cor. 4petala inaequalis: petalum superius
basi deflexens in nectarium cornicula-
tum longum.*

*Antber. 2locularis. Pericarpium 3locula-
re, polyspermum.*

QUALEA.

*Cor. 2petala, inaequalis: Petalum superius
basi deflexens, in nectarium cornicula-
tum breve. Antbera fideata.*

MONODYNAMIS.

*Cal. 4fidus: lacinia unica maxima. Cor.
infundibuliformis 4fida. Capf. 2sper-
ma: Semina arillata.*

*Scirpus polytrichoides, atropurpureus, os-
sivalis, anomalus.*

Cyperus nitens, flavidus, leucocephalus.

DIGYNIA.

* floribus hermaphroditis.

† Plantae.

12. CORISPERMUM.

Cal. o. Cor. 2petala. Sem. 1.

13. CALLITRICHE.

Cal. o. Cor. 2petala. Capf. bilocularis.

14. BLITUM.

Cal. 3fidus baccatus. Cor. o. Sem. 1.

352. MNIARUM.

Cal. 4partitus superus. Cor. o. Sem. 1.

LACISTEMA.

*Cal. Amenti squama. Cor. 4partita. Filum
2fidum. Bacca pedicellata, 1sperma.*

†† Gramineae.

Leersia monandra. Cinna.

** floribus monoicis.

353. CERATOCARPUS. *Cal. 2partitus. Cor. o. Sem. 1. inferum.*

MONANDRIA,
TRIGYNIA.

* floribus divicis.

1096. NAIAS. ♂. Cal. 2fidus. Cor. 4fida. Filam. o.
♀. Cal. o. Cor. o. Capsf. 1ocularis.
Salix monandra.

** floribus monoicis.

1429. AEGOPRICON. ♂. Amentum. Cal. 3fidus. Cor. o.
♀. Flores solitarii. Bacca 3cocca.

TETRAGYNIA.

1034. ZANNICHELLIA. ♂. Cal. o. Cor. o.
♀. Cal. 1phyllus. Cor. o. Sem. 4.

DIGITARIA

MONOGYNIA.

CANNA. Corolla 6partita erecta: labio bipartito
revoluto. *Stilus lanceolatus corol-
lae adnatus. Calix triphyllus. Cap-
sula 3ocularis.*

- ca. 1. C. foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *L. ap. Mil-
ler illustr. of sex. Syst.*
- istifo- 2. C. foliis lanceolatis petiolatis nervosis. *Sp. pl. p. 1675.
Pif. bras. 213.*
- ca. 3. C. foliis lanceolatis petiolatis enervis. *Dill. eph. t. 59. f.
64. Habitat in aquosis.*
- ca. 4. C. foliis linearibus nervosis sessilibus. *Retz. obs. bot. 1. p.
9. n. 1. Habitat in Sina.*

10. RENEALMIA. Cor. 3fida: nectario oblongo.
*Cal. monophyllus. Suppl.
p. 7.*

tata. 1. RENEALMIA. *Suppl. p. 79. Rumpf. amb. 6. t. 62. 63.*

AMOMUM. Cor. 3-6fida: lacinia prima paten-
te. *Capsf. baccata, infera, 3-
locularis.*

- giber. 1. A. scapo nudo, spica ovata. *Jacq. Hort. Vind. t. 75. Co-
rollae limbus trifidus f. bilabiatus, labio superiori integro,
inferiori diviso, intra quem nectarium trilobum.*
- um. 2. A. scapo nudo, spica oblonga obtusa. *Jacq. Hort. Vind.
3. t. 54. Murray Corum. Goett. 1775. p. 26. t. 2. Co-
rolla A. Zingiberis.*
- lamo- 3. A. scapo simplicissimo brevissimo: bracteis alternis laxis.
un. *Rumpf. amb. 5. t. 65. f. 1. Planck pl. med. t. 3.*
- num 4. A. scapo ramoso brevissimo. *Planta etiamnum obscura,
diff. Rbeer b. mal. 11. t. 6.*
- cuma. 5. A. scapo spathis laxis ex centro foliorum. *Jacquin Hort.
Vind. 3. t. 4. Corollae limbus sexfidus.*

MO

A 3

6. A.

MONOGYNIA.

CANNA. Corolla 6partita erecta: labio bipartito
 revoluto. *Stilus lanceolatus corol-*
lae adnatus. Calix triphyllus. Cap-
sula 3locularis.

- ica. 1. C. foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *Lc. ap. Mil-*
ler illustr. of sex. syst.
 gustifo- 2. C. foliis lanceolatis petiolatis nervosis. *Sp. pl. p. 1675.*
 lia. *Pif. bras. 213.*
 uca. 3. C. foliis lanceolatis petiolatis enervis. *Dill. eph. t. 59. f.*
64. Habitat in aquis.
 cea. 4. C. foliis linearibus nervosis sessilibus. *Retz. obs. bot. I. p.*
9. n. 1. Habitat in Sina.

350. RENEALMIA. Cor. 3fida: nectario oblongo.
Cal. monophyllus. Suppl.
p. 7.

altata. 1. RENEALMIA. *Suppl. p. 79. Rumpf. amb. 6. t. 62. 63.*

AMOMUM. Cor. 3-6fida: lacinia prima paten-
 te. *Caps. baccata, infera, 3-*
locularis.

- ngiber. 1. A. scapo nudo, spica ovata. *Jacq. Hort. Vind. t. 75. Co-*
rollae limbus trifidus s. bilabiatus, labio superiori integro,
inferiori diviso, intra quem nectarium trilobum.
 rum- 2. A. scapo nudo, spica oblonga obtusa. *Jacq. Hort. Vind.*
 et. *3. t. 54. Murray Corum. Goett. 1775. p. 26. t. 2. Co-*
rolla A. Zingiberis.
 edamb- 3. A. scapo simplicissimo brevissimo: bracteis alternis laxis.
 num. *Rumpf amb. 5. t. 65. f. 1. Planch pl. med. t. 3.*
 ramun 4. A. scapo ramoso brevissimo. *Planta etiamnum obscura.*
 radii. *Rbes b. mal. II. t. 6.*
 arcuma. 5. A. scapo spathis laxis ex centro foliorum. *Jacquin Hort.*
Vind. 3. t. 4. Corollae limbus sexfidus.

- Mioga. 6. A. scapo brevissimo, capsula ovata, foliis ensiformibus. Thunb. fl. jap. p. 14. Corollae limbus apertus: lacina dissimili.
- repens. 7. A. scapis procumbentibus, floribus racemosis spathatis, foliis lanceolatis utrinque acuminatis. Sonnerat. it. 2. p. 248. t. 136. Corollae limbus 4fidus, lacina majore subspatulata, capsula obrusa trigona.
- angustifolium. 8. A. scapo brevissimo: bracteis alternis sursum majoribus dense spiratis; corolla labiata; labio trifido. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 51.
- Globba. 9. A. caulibus solitariis scapis brevissimis, spathis ovatis alternis petiolatis bifariis oblongis acuminatis. Rumpf amb. 3. p. 60.
- montanum. 10. A. scapis erectis longioribus, spicae bracteis imbricatis petiolatis ovatis acutis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 51.
- littorale. 11. A. scapis brevissimis squamosis, spathis ovatis plurimis, foliis apices nutantibus. Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 52.
- Koenigii. 12. A. scapis brevibus, spathis cordatis, foliis apice denticulatis. Koenig apud Retz. obs. bot. fasc. 3. p. 51.
- uliginosum. 13. A. scapis erecto-curvatis, spathis ovatis, floribus bibracteatis, foliis sessilibus. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 56.
- spurium. 14. A. scapis solitariis squamatis, spicis ovatis: bracteis imbricatis, foliis subpetiolatis oblongis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 59.
- scyphiflorum. 15. A. spicis subsessilibus erectis oblongis: bracteis imbricatis, foliis sessilibus. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 59.
- Leonurus. 16. A. scapis brevibus, spicis erectis oblongis: bracteis imbricatis, foliis petiolatis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 59.
- fylvestre. 17. A. scapo nudo, spica elongata: bracteis oblongis, foliis lato-lanceolatis. Sloane hist. jam. 1. f. 2. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1.
- nigrum. 18. A. bacca ovato-globosa subuniloculari, corollae lobis dibuliformi coronata. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1.

19. A. capsula oblonga triquetra-pyramidata coriacea, trivalvi. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1. Blank. herb. t. 584. f. 14-21.
20. A. capsula subglobosa trifurca coriacea evalvi. Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1. Blanckw. herb. t. 385. f. 1-3. et t. 584. f. 2-7.

COSTUS. Cor. o. interior inflata ringens: labio inferiore trifido.

1. C. foliis subtus sericis. Regn. bot. t. 304.
 2) Collus malaccensis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 71.
 2. C. foliis utrinque glabris. Merian. sur. t. 36.

MYROSMA. Cor. 5partita, irregularis. Cal. duplex: exterior 3phyllus; interior tripartitus. Suppl. p. 8.

1. MYROSMA. Suppl. p. 80. Rheed. H. mal. 11. p. 67. t. 34?

ALPINIA. Cor. 1petala irregularis: limbo duplici: Caps. baccata, infera,ilocularis, evalvis.

1. A. racemo terminali. Rottböll. coll. havn. 2. p. 245. t. 1.
 2) Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 62? Alpinia scissilis.
 3) Alpinia multicaulis. Aubl. pl. guj. 1.
 2. A. racemo radicali composito. Swartz nov. gen. et sp. pl. p. 11.
 3. A. floribus spicatis. Jacq. stirp. amer. pict. p. 7. t. 1. an hujus generis?
 4. A. floribus paniculatis terminalibus. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 64.
 2) Languas chinensis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 65.
 3) Languas aquaticum. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 67.

A 4

5. A.

Amomi, Alpinise, Curcumae, Thaliae character variis adhuc, neque Koenigii industria laudabili satis adhuc illustratus.

ta, foliis ensiformibus. 19. A. capsula oblonga triquetra-pyramidata coriacea, tri-
valvi. Gaertn. de fr. et Sem. cent. 1. t. 12. f. 1. Blank.
herb. t. 584. f. 14-21.

bus racemosis spathaeus. 20. A. capsula subglobosa trifurca coriacea ovalvi. Gaertn. de
fr. et sem. cent. 1. t. 12. f. 1. Blanckw. herb. t. 385. f.
1-3. et t. 584. f. 2-7.

ternis sursum majoribus
labiata; labio trifido.
Gaertn. de fr. et sem.

COSTUS. Cor. o. interior inflata ringens; labio
inferiore trifido.

abicus. 1. C. foliis subtus sericis. Regn. bot. t. 304.
2) Costus malaccensis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 71.

revissimis, spathis ovatis
oblongis acuminatis. abstratus. 2. C. foliis utrinque glabris. Merian. sur. t. 36.

3 p. 60. Rumpf amb.
spicae bracteis imbricatis.
Koenig apud Retz. o.

MYROSMA. Cor. 5partita, irregularis. Cal.
duplex: exterior 3phyllus;
interior tripartitus. Suppl.
p. 8.

ofis, spathis ovatis, c
tantibus. Koenig apud
cordatis, foliis apice el
lium.

innacfo. 1. MYROSMA. Suppl. p. 80. Rheed. H. mal. 11. p. 67. t. 34?

retz. obs. bot. fasc. 3. p. 5.
spathis ovatis, floribus
us. Koenig apud Retz.

ALPINIA. Cor. 1petala irregularis: limbo du-
plici: Caps. baccata, infera, ilo-
cularis, evalvis.

tis, spicis ovatis: bract
atis oblongis. Koenig
oenig apud Retz. obs. bot.

racemosa. 1. A. racemo terminali. Rottböll. coll. havn. 2. p. 245. t. 1.
2) Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 62? Alpinia scissilis.
3) Alpinia multicaulis. Aubl. pl. guj. 1.

occiden- 2. A. racemo radicali composito. Swartz nov. gen. et sp. pl.
p. 11.

picata. 3. A. floribus spicatis. Jacq. stirp. amer. pict. p. 7. t. 1. an
hujus generis?

angaus. 4. A. floribus puniculatis terminalibus. Koenig apud Retz. obs.
bot. 3. p. 64.

is. Sloane hist. jam. 1.
em. cent. 1. t. 12. f. 1.
2) Languas chinensis. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 65.
3) Languas aquaticum. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 67.

biniloculari, corollae h
Gaertn. de fr. et sem. cent.

A 4

5. A.

Amomi, Alpiniae, Curcumae, Thaliae character varius adhuc, neque Koenigii
industria laudabili satis adhuc illustratus.

jamaicena. 5. A. capsula ovata subtrigona chartacea, corollae tubae. 3. K. foliis ovatis petiolatis. *Koenig apud Retz. fasc. obs. bot. 3. p. 57.*

5. MARANTA. *Cor. ringens 5fida: laciniis patentibus.*

arundinea. 1. M. culmo ramoso. *Mart. cent. t. 39.*

Galanga. 2. M. culmo simplici, foliis lanceolatis sessilibus. *Rumf. 5. t. 63. Planck pl. med. t. 6.*

comosa. 3. M. coma foliolis reflexis. *Suppl. p. 80.*

Allovia. 4. M. foliis ovato rotundatis, scapo nudo, capitulo. *Rheed. h. mal. II. p. 67. t. 34.*

spicata. 5. M. foliis ovato-oblongis, subfalcatis, scapo nudo. *Aubl. pl. guj. I. p. 4. n. 6.*

Arcuma. 6. M. caule inferne nudo. *Aubl. pl. guj. I.*

malaccena. 7. M. caule simplici, foliis petiolatis ovatis. *Burm. in*

humilis. 8. M. caule ramoso foliis brevioribus, radicibus tuberosis. *pl. guj. I.*

Tonxat. 9. M. radice nodoso. *Rumpf amb. 4. t. 7.*

lutea. 10. M. folio amplissimo. *Aubl. pl. guj. I.*

6. CURCUMA. *Stamina 4sterilia, quinto fertilia, extra nectarium.*

rotunda. 1. C. foliis lanceolato-ovatis: nervis lateralibus. *Rumpf amb. 5. t. 67.*

longa. 2. C. foliis lanceolatis: nervis lateribus numerosissimis. *bot. t. 346.*

7. KAEMPFERIA. *Cor. 6partita: laciniis 3mibus patulis; unica bipartita. Stigma bilamellatum.*

Galanga. 1. K. foliis ovatis sessilibus. *Petiv. gaz. t. 19. f. 2.*

rotunda. 2. K. foliis lanceolatis petiolatis. *Rheed. h. mal. II. Planck pl. med. t. 5.*

AEROCARPOS. *Cor. irregularis 5partita. Caps. globosa, sulcato-rugosa polyperma-*

1. SPHAEROCARPOS. *Koenig apud Retz. fasc. obs. bot. 3. p. 49.*

HEDYCHUM. *Cor. tubo filiformi infra faucem perforatam subinflato, limbo 6partito.*

1. HEDYCHUM. *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 73. Rumpf amb. 5. t. 69. f. 3.*

ANA. *Cor. tubo campanulato subanguloso, limbo interiore cucullato-campanulata, fauce pilis densis clausa. Caps. oblonga triquerra.*

1. TSIANA. *Rheed. h. Mal. II. t. 8. Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 75. Banksea speciosa. Rumpf amb. 6. t. 64. f. 2. Herba spiralis.*

HALIA. *Cor. 5petala undulata. Drupailocularis.*

1. Th. corollis pentapetalis. *Kottböll. coll. bav. 2. p. 249. t. 2.*

2. Th. corollis hexapetalis: nectario bifido erecto. *Forst. fl. austr. p. 1.*

PHILYDRUM. *Cor. 4petala: petalis 2 exterioribus ovatis; interioribus minoribus lanceolatis. Cal. o. Spatha 1phylla. Antherae geminae. Caps. supera, 3ocularis.*

1. PHILYDRUM. *Gaertn. de fr. et sem. cent. I. t. 16. f. 10.*

Maranta.

MONANDRIA-MONOXYNIA. Sphaerocarpos.

9

tracca, corollae tubera. 3. K. foliis ovatis petiolatis. *Koenig apud Retz. fasc. obs. bot. t. 1. t. 12. f. 2.* 3. p. 57.

fidia: laciniis 2. **SPHAEROCARPOS.** *Cor.* irregularis 5partita. *Capf.* globosa, sulcato-rugosa polysperma-

z. 39.

1. SPHAEROCARPOS. *Koenig apud Retz. fasc. obs. bot. 3. p. 49.*

tis sessilibus. **RUMPHALIDYCHUM.** *Cor.* tubo filiformi infra faucem perforatam subinflato, limbo 6partito.

p. 80.

o nudo, capitulo

icatis, scapo nudo, **HEDYCHUM.** *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 73.* *Rumpf amb. 5. t. 69. f. 3.*

p. 4. n. 6.

l. guj. 1.

ovatis. **BURMANNIA.**

radicibus tuberosis.

Cor. tubo campanulato subanguloso, limbo interiore cucullato-campanulata, fauce pilis densis clausa. *Capf.* oblonga triquetra.

4. t. 7.

guj. 1.

iosa. 1. **TSIANA.** *Rheed. h. Mal. 11. t. 8.* *Koenig apud Retz. obs. bot. 3. p. 75.* *Banksea speciosa. Rumpf amb. 6. t. 64. f. 2.* *Herba spiralis.*

ia, quinto feru- **THALIA.** *Cor.* 5petala undulata. *Drupa*ilocularis.

nervis lateralibus ram-

ibus numerosissimis.

iculata. 1. Th. corollis pentapetalis. *Kottbüll. coll. havn. 2. p. 249. t. 2.*
macfor-2. Th. corollis hexapetalis; nectario bifido erecto. *Forst. fl. austr. p. 1.*

ica: laciniis 3ma-

ulis; unica bipar-

bilamellatum.

PHILYDRUM. *Cor.* 4petala: petalis 2 exterioribus ovatis; interioribus minoribus lanceolatis. *Cal.* o. *Spatha* 1phyl-
la. *Antherae* geminae. *Capf.* supera, 3ocularis.

gaz. t. 19. f. 2.

Rheed. h. mal. 11.

ugino-1. **PHILYDRUM.** *Gaertn. de fr. et sem. cent. 1. t. 16. f. 10.*
um. A 5 **CUCUL-**

CUCULLARIA. Cor. 4petala inaequalis. Petala 2. M. foliis lanceolatis, fructu glabro. *Rumpf amb. 2. t. 5. Thumb. nov. act. Stockb. 1782. t. 1. f. 1.*
 3. M. foliis cordatis oblongis subtus fructibusque tomentosis. *Aubl. pl. guj. p. 904. t. 345.*
 4. M. foliis oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus, calicibus fructibusque villosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 96. Gaertn. d. fr. et sem. cent. 3. t. 41. f. 3. 4.*
 5. M. bacca ovato-oblonga: arillo ingrato. *Gaertn. fr. et sem. cent. 3. t. 41. f. 2. an distincta species?*
 Vochy. I. CUCULLARIA. *Aubl. pl. guj. 1. p. 18. t. 6.*
QUALEA. Cor. 2petala inaequalis: Petalum superius erectum basi deflexum in nectarium corniculatum breve. Filum dens: Anthera fulcata. Periclyptum polyspermum.

rosea. I. Q. petiolis longis, petali superioris ungue nullo. *guj. 1. p. 5. t. 1.*
 caerulea. 2. Q. petiolis brevibus, petalo utroque ungue instructo. *pl. guj. 1. p. 7. t. 2.*

MONODYNAMIS. Cal. 4fidus: lacinia unica. Cor. 4fida, infundibuliformis. Caps. 2valvis. Sem. arillata.

Herti. I. MONODYNAMIS. *Willden Schr. berl. Naturf. 10. p. 1399.*

1399. MYRISTICA. ♂. Cal. 3fidus. Stam. 3. Anthera 3. Stigma 3. Bacca carnosa 1. Membrana flicca 1. Periclyptum 1. Sem. 3. *Stam. 3. Anthera 3. Stigma 3. Bacca carnosa 1. Membrana flicca 1. Periclyptum 1. Sem. 3.*

tomento. I. M. foliis ovatis, fructu tomentoso. *Sonnerat. in. 1. t. 116-118.*

7. PHYLLACHNE. ♂. Cal. 3phyllus, superus. Cor. infundibuliformis.
 ♀. Cal. 3phyllus, superus. Cor. infundibuliformis. Stigma tetragonum. Caps. polysperma.

nosa. I. PHYLLACHNE. *Forst. char. gen. pl. t. 58.*

8. ELATERIUM. ♂. Cal. 0. Cor. hypocrateriformis.
 ♀. Cal. 0. Cor. hypocrateriformis. Caps. infera, 12ocularis, 2valvis.

hage. I. E. foliis cordatis angulatis. *Jacq. stirp. amer. t. 232.*

lia. 2. E. foliis ternatis incisis. *Mont. p. 123.*

inaequalis. *P*
adscendens, b
n
nectarium cor
gum *Filum* api
: *Anthera* loc
Peric. 3locula
um.
t. p. 18. t. 6.

- 2. M. foliis lanceolatis, fructu glabro. *Rumpf amb. 2. t. 5. Thunb. nov. act. Stockb. 1782. t. 1. f. 1.*
- 3. M. foliis cordatis oblongis subtus fructibusque tomentosis. *Aubl. pl. guj. p. 904. t. 345.*
- 4. M. foliis oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus, calicibus fructibusque villosis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 96. Gaertn. d. fr. et sem. cent. 3. t. 41. f. 3. 4.*
- 5. M. bacca ovato-oblonga: arillo ingrato. *Gaertn. fr. et sem. cent. 3. t. 41. f. 2. an distincta species?*

27. PHYLLACHNE.

- ♂. *Cal.* 3phyllus, superus. *Cor.* infundibuliformis.
- ♀. *Cal.* 3phyllus, superus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* tetragonum. *Capsf.* polysperma.

lis: *Petalum* sup
definens in nect
reve. *Filum* a
sulcata. *Peric.*
um.
ieris ungue nullo.
oque ungue instructo.

ginosa. 1. PHYLLACHNE. *Forst. char. gen. pl. t. 58.*

36. ELATERIUM.

- ♂. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis.
- ♀. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis. *Capsf.* infera,ilocularis, 2valvis.

s: lacinia unica
Cor. 4fida, im
rmis. *Capsf.* 2spe
arillata.

rhage- 1. E. foliis cordatis angulatis. *Jacq. stirp. amer. t. 232.*

folia- 2. E. foliis ternatis incisis. *Mant. p. 123.*

berl. Naturf. 10. p.
3fidus. *Stam.*
ius anthera cin
fidus, germen
s. *Stil.* breviss
gma duplex ac
cca carnosâ 1spe
mbrana ficca rec
iter baccam et fe
olo. *Sonnerat. it. n.*

1096. PANDANUS. ♂. Cal. o. Anthera sessilis, mificationibus thymifera.

♀. Cal. o. Stigmata 2. Stilus compositus.

odoratis. I. PANDANUS. Rumpf amb. 4. t. 74. 81. Keura Thunb. plant. gener. p. 26. Odoris praestantissimi ergo-

BROSIMUM. Flores divici. Amentum globosum, dique tectum squamis orbiculatis peltatis. Cor. o.

♂. Filamenta solitaria, inter squamas erumpentia.

♀. Stilus bifidus. Bacca 1 spermata.

Alicastrum. I. Br. foliis ovato-lanceolatis perennibus, amentis fructu corticoso. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 12.

spurium. 2. Br. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, amentis minimis, fracta molli. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 12.

ASCARINA. Flores divici. Amentum filiforme, 6-fidum.

♂. Anthera recurva, 4-fidula.

♀. Stil. o. Stigma subtrilobum, ricarp. 1 spermum.

polystachya. I. ASCARINA. Forst. char. gen. pl. p. 59. t. 59.

NIPA. ♂. Spatha. Cor. 6-petala.

♀. Spatha. Cor. o. Drupae angulatae.

fruticans. I. NIPA. Thunb. nov. act. Stockb. 1782. 3. n. 6.

CASUARINA. ♂. Cal. amenti. Squamulae bipartitae corollam referentes.

♀. Cal. amenti. Cor. o. Stilus bifidus. Strobilus.

1. C. monoica, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis laevibus villosis, paginis masculis septempartitis, ciliatis approximatis. Rumpf amb. 3. t. 57.

2. C. divica, ramulellis erectis, strobilorum squamis laevibus, glabris, vaginis masculis multifidis glabris. Act. hort. Kew. 3. p. 320.

3. C. divica, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis villosis tuberculatis, vaginis masculis quadrifidis. Act. hort. Kew. 3. p. 320.

4. C. verticillis staminum remotis. Thunb. nov. pl. gen. p. 54.

BALANOPHORA. Flores monoici capitati. Cal. o.

♂. magni pauci ad basin capitati. Cor. 4-petala.

♀. innumeri parvi. Cor. o.

I. BALANOPHORA. Forst. char. gen. pl. p. 50. t. 50.

CYNOMORIUM. ♂. Cal. Amentum imbricatum.

♀. Cal. in eodem amento Sem. 1. subrotundum.

1. C. stipite squamoso, amento cylindrico. Amoen. acad. 4. t. 2. Planta tota unicum amentum.

2. C. stipite squamoso, amento elongato. Swartz nov. pl. gen. p. 12.

3. C. stipite nudo, amento subgloboso. Swartz nov. pl. gen. p. 12.

Anthera sessilis.
ationibus thyr

CASUARINA.

♂. *Cal. amenti. Squamulae bipartitae corollam referentes.*

Stigmata 2.
ompositus.

♀. *Cal. amenti. Cor. o. Stilus bifidus. Strobilus.*

4-81. *Keura Thunbergii*

1. *C. monoica*, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis laevibus villosis, paginis masculis septempartitis, ciliatis approximatis. *Rumpf amb. 3. t. 57.*

amentum globosum.
squamis orbic

2. *C. divica*, ramulellis erectis, strobilorum squamis laevibus, glabriusculis, vaginis masculis multifidis glabris. *Act. hort. kew, 3. p. 320.*

o.
aria, inter squ

3. *C. divica*, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis villosis tuberculatis, vaginis masculis quadrifidis. *Act. hort. kew. 3. p. 320.*

Bacca spermatophora.

4. *C. verticillis staminum remotis.* *Thunb. nov. pl. gen. p. 54.*

rennibus, amentis

BALANOPHORA. *Flores monoici capitati. Cal. o.*

o. pl. gen. et sp. p. 12

♂. *magni pauci ad basin capitati. Cor. 4petala.*

minatis, amentis

♀. *innumeri parvi. Cor. o.*

nov. pl. gen. et sp. p.

amentum filiforme.

1. *BALANOPHORA.* *Just. char. gen. pl. p. 50. t. 50.*

rva, 4sulca.

33. CYNOMORIUM. ♂. *Cal. Amentum imbricatum.*

ia subtrilobum,

♀. *Cal. in eodem amento.*

num.

Sem. 1. subrotundum.

l. p. 59. t. 59.

ala.

1. *C. stipite squamoso, amento cylindrico.* *Amoen. acad. 4. t. 2. Planta tota unicum amentum.*

upae angulatae.

2. *C. stipite squamoso, amento elongato.* *Swartz nov. pl. gen. p. 12.*

b. 1782. 3. n. 6.

3. *C. stipite nudo, amento subgloboso.* *Swartz nov. pl. gen. p. 12.*

1426. ARTOCARPUS. *Amentum* cylindricum

sim incrassatum
 bus tectum.

♂. *Cal.* 2valvis.

♀. *Cal.* o. *Bacca* cor-
 ta: universalis
 polyedro - mur-
 partiales nume-
 mae iloculares,
 mae.

incisa. 1. A. foliis incisis.

α) fructu apyreno. *Forst. v. Brodbaum. t. 1. 2.*

β) fructu icminifero. *Sonnerat. it. nov. Guin. p. 99.*

integrifolia. 2. A. foliis integris. *Rumpf amb. 1. t. 30. 31.*
fr. et Sem. cent. 5. t. 71. 72.

1203. CHARA. ♂. *Cal.* o. *Anthera* germinata

jecta.
 ♀. *Cal.* 4phyllus. *Stigma*
Sem. 1.

tomentosa. 1. Ch. aculeis caulinis ovatis. *Morif. hist. pl. 3. t. 4.*

vulgaris. 2. Ch. caulibus laevibus, frondibus interne dentatis.
act. parif. 1719. t. 3. f. 1. Baccae oblongae poly-
Weis.

hispida. 3. Ch. aculeis caulinis capillaribus confertis. *Fl. danica.*

flexilis. 4. Ch. caulium articulis inermibus diaphanis superne
Dill. eph. N. C. cent. 6. app. t. 13. f. 2.

9. BOERHAAVIA. *Cal.* o. *Cor.* 1petala,
 nulata, plicata. (*Stam.*
 terdum 2.) *Sem.* 1.
 calici indurato includi

erecta. 1. B. caule erecto glabro, floribus diandris. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 5. 6.*

2. B. caule laevi diffuso, foliis ovatis. *Rheed. b. mal. 7. t. 56.*

3. B. caule diffuso pubescente, foliis ovatis repandis. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 7.*

4. B. caule erecto, floribus diandris, foliis cordatis acutis. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 4.*

5. B. caule repente, floribus monandris.

6. B. foliis linearibus acutis.

7. B. caule repente, floribus tetrandris. *Forst. fl. austr. p. 2.*

APHANES. *Cal.* tubulatus: ore plano 4 vel
 5fido. *Cor.* o. *Sem.* 1. ova-
 tum, acuminatum.

1. Aph. foliis trilobis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 73. f. 2.*

2. Aph. foliis tripartito-trifidis hirsutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 38.*

SALICORNIA. *Cal.* ventriculosus, integer.
 (*Stam.* in nonn. 2.) *Sem.* 1.

1. S. herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-
 bifidis. *Flor. dan. t. 303.*

2. S. caule erecto fruticoso, articulis subaequalibus obtusis: in-
 ternodiis approximatis.

3. S. herbacea erecta, ramis simplicissimis. *Stamina inter-*
dum 2.

4. S. foliis alternis vaginalibus obtusis hinc dehiscens. *Pall.*
it. 1. t. A. f. 13. Suppl. p. 81.

5. S. fruticosa, articulis cylindricis, spicis filiformibus. *Pall.*
it. 1. t. A. f. 2.

6. S. foliis linearibus alternis amplexicauli-decurrentibus,
Suppl. p. 81. Pall. it. 1. t. C. f. 1. 2.

7. S. caulibus prostratis, flagellis longissimis, furculis erectis ra-
 mosis. *Pall. it. 1. p. 481. t. B. f. 1. 2.*

8. S. fruticosa, pedunculorum articulis cruciatis, caulis glo-
 bosus. *Habitat in Arabia. Forskål fl. ar. p. 2.*

A. Artocarpus.

um cylindricum
im incrassatum,
us rectum. Cens.
al. 2valvis.

il. o. Bacca com-
ra: universalis m-
polyedro - mur-
partiales nume-
nae ioculares,
nae.

2. B. caule laevi diffuso, foliis ovatis. *Rheed. b. mal. 7. t. 56.*
3. B. caule diffuso pubescente, foliis ovatis repandis. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 7.*
4. B. caule erecto, floribus diandris, foliis cordatis acutis. *Jacq. Hort. Vind. 1. t. 4.*
5. B. caule repente, floribus monandris.
6. B. foliis linearibus acutis.
7. B. caule repente, floribus tetrandris. *Forst. fl. austr. p. 2.*

5. APHANES. Cal. tubulatus: ore plano 4 vel
8fid. Cor. o. Sem. 1, ova-
tum, acuminatum.

odbaum. t. 1. 2.

it. nov. Guin. p. 99. t. 1. 1. 1.

mb. 1. t. 30. 31. Gaertn.

2.

1. Aph. foliis trilobis. *Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 73. f. 2.*
2. Aph. foliis tripartito-trifidis hirsutis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 38.*

Anthera germin-

SALICORNIA. Cal. ventriculosus, integer.
(Stam. in nonn. 2.) Sem. 1.

yllus. Stigma 3f-

Morif. hist. pl. 3. t. 4.

libus interne dentatis.

Baccae oblongae poly-

ous confertis. Fl. dan.

us diaphanis superne lat-

t. 13. f. 2.

Cor. 1 petala, can-

ra, plicata. (Stam-

m 2.) Sem. 1. nu-

i indurato inclusum

oribus diandris. Jacq.

1. S. herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis. *Nor. dan. t. 303.*
2. S. caule erecto fruticoso, articulis subaequalibus obtusis: internodiis approximatis.
3. herbacea erecta, ramis simplicissimis. *Stamina interdum 2.*
4. S. foliis alternis vaginalibus obtusis hinc dehiscentibus. *Pallas it. 1. t. A. f. 13. Suppl. p. 81.*
5. S. fruticosa, articulis cylindricis, spicis filiformibus. *Pallas it. 1. t. A. f. 2.*
6. S. foliis linearibus alternis amplexicauli-decurrentibus. *Suppl. p. 81. Pallas it. 1. t. C. f. 1. 2.*
7. S. caulibus prostratis, flagellis longissimis, furculis erectis ramosis. *Pallas it. 1. p. 481. t. B. f. 1. 2.*
8. S. fruticosa, pedunculorum articulis cruciatis, caulis globosis. *Habitat in Arabia. Forskäl fl. aeg. ar. p. 2.*

perfolia- 9. S. fruticosa, foliis carnosiss urceolato-orbicularibus
ta, perfoliatis. *Habitas in Arabiae littore. Forsk.*
ar. p. 3.

TAMBURISSA. *Cor. o. Cal. communis, 4partita, semina includentes.*
Fructus depresso-globosus, nucleis arillatis.

quadrifida. I. **TAMBURISSA.** *Sommer. it. 2. p. 237. t. 134.*

NECKERIA. *Cal. 1-phyllus, 5dentatus. Sem. 1. Rec. squamae baccatae, sem. includentes.*

campestris. I. **NECKERIA.** *Aiton hort. Kew. 1. p. 5.*

II. HIPPURIS. *Cal. o. Stigma simplex. Sem. 1.*

vulgaris. I. H. foliis octonis subulatis. *Suppl. p. 81. Fl. dan.*

tetraphyl- 2. H. foliis quaternis oblongis obtusis. *Suppl. p. 81. la.*

lanceolata. 3. H. foliis lanceolatis: inferioribus quaternis superioribus ternis. *Retz. obs. bot. fasc. 3. t. 1.*

DIGYNIA.

LACISTEMA. *Cal. amenti squama. Cor. 4partita. Filamentum 2fidum. Baccatae dicellatae, 1 sperma.*

myricoides. I. **LACISTEMA.** *Berg. atl. Helv. 7. t. X.*

12. CORISPERMUM. *Cal. 2phyllus. Cor. o. ovale, nudum, et plano-convexum, 2fidum.*

hyssopifolium. I. **C.** floribus lateralibus. *Buxb. cent. 3. t. 55. Gaertn. et sem. cent. 5. t. 75. f. 7.*

2. **C.** spicis squarrosis. *Buxbaum cent. 3. t. 56.*

CALLITRICHE. *Cal. o. Petala 2. Sem. 4nuda, hinc membranaceo marginata.*

1. **C.** foliis superioribus ovalibus, apice integris. *Col. ecphr. 1. ic. p. 316. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 68. f. 4.*

β) **C.** foliis omnibus lanceolato-oratis obtusis.

2. **C.** foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Loef. fl. pruss. t. 38. Alsine aquatica minor. f. fluitans. C. Baub. pin. 257.*

3. **C.** foliis superioribus ovalibus; caulinis linearibus apice bifidis. *Hoffm. obs. bot. n. 1.*

4. **C.** foliis linearibus oppositis connatis, internodiis distantibus. *Petagn. infl. bot. 2. p. 10.*

BLITUM. *Cal. 3fidus baccans. Petala o. Sem. 1. feminudum.*

1. **Bl.** capitellis spicatis terminalibus. *Knorr del. hort. 1. t. E. 3.*

2. **Bl.** capitellis sparsis lateralibus. *IC. in Mill. illustr. of sex. syst.*

3. **Bl.** capitellis verticillatis exsuccis. *Mant. p. 170.*

9. MNIARUM. *Cal. 4partitus, superus. Cor. o. Sem. 1.*

1. **MNIARUM.** *Suppl. p. 81. Forster char. gen. pl. t. 1.*

5. CERATOCARPUS. ♂ *Cal. 4partitus. Cor. o. Filamentum longum.*
♀ *Cal. 2phyllus, germini adnatus. Cor. o. Stili 2. Sem. 2corne, compressum.*

1. **CERATOCARPUS.** *Buxb. atl. Petrop. 1. t. 9.*

reolato - orbicularibero
e littoro. Forskäl.
2. C. spicis squarrosis. *Buxbaum cent. 3. t. 56.*

CALLITRICHE. Cal. o. Petala 2. Sem. 4nu-
da, hinc membranaceo
marginata.

ommunis, 4pa
us femina incl
depresso - glob
rillatis.

1. C. foliis superioribus ovalibus, apice integris. *Col. ecphr.*
1. ic. p. 316. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 68. f. 4.

β) C. foliis omnibus lanceolato-ovatis obtusis.

237. t. 134.

um. 2. C. foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus herma-
phroditis. *Loef. fl. pruss. t. 38. Alsine aquatica minor f.*
fluitans. C. Baub. pin. 257.

dentatus. C
squamae bacc
tes.

3. C. foliis superioribus ovalibus; caulinis linearibus apice bifi-
dis. *Hoffm. obs. bot. n. 1.*

1. p. 5.

4. C. foliis linearibus oppositis connatis, internodiis distanti-
bus. *Petagn. infl. bot. 2. p. 10.*

simplex. Sem

BLITUM. Cal. 3fidus baccans. Petala o. Sem. 1.
feminudum.

opl. p. 81. Fl. dan. t.

usis. Suppl. p. 81.

1. Bl. capitellis spicatis terminalibus. *Knorr del. hort. 1.*
t. E. 3.

us quaternis superiori

2. Bl. capitellis sparsis lateralibus. *1c. in Mill. illustr. of sex. Syst.*

t. 1.

3. Bl. capitellis verticillatis exsuccis. *Mant. p. 170.*

A.

59. MNJARUM. Cal. 4partitus, superus. Cor. o.
Sem. 1.

rama. Cor. 4pa

um 2fidum. Bacc

1 sperma.

7. t. X.

orum. 1. MNJARUM. *Suppl. p. 81. Forster char. gen. pl. t. 1.*

hyllus. Cor. o. S

ale, nudum, erec

ino-convexum, ala

cent. 3. t. 55. Gaertn.

35. CERATOCARPUS. ♂. Cal. 4partitus. Cor. o.
Filamentum longum.
♀. Cal. 2phyllus, germini
adnatus. Cor. o. Stili
2. Sem. 2corne, com-
pressum.

CECILIUS. 1. CERATOCARPUS. *Buxb. act. Petrop. 1. t. 9.*

TRIGYNIA.

1096. NAJAS. ♂. Cal. cylindricus, 2fidus.
4fida. Filamentum o.
♀. Cal. o. Cor. o. Capsula ovalis
cularis.

marina. I. NAJAS. Vaill. act. par. 1719. t. 1. f. 2.

1429. AEGOPRICON. ♂. Amentum. Cal.
Cor. o.
♀. Flores solitarii. Cal.
Cor. o. Bacca 3

betulinum. I. AEGOPRICON. Suppl. p. 413.

TETRAGYNIA.

1034. ZANNICHELLIA. Flores monoici,
♂. Cal. o.
♀. Cal. 1 phyllus,
panulatus. TUBIFLORA.
circ. 4.

palustris. I. ZANNICHELLIA. Flor. dan. t. 167. Gaertn. de fr.
cent. 1, t. 19. f. 6.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

† floribus hermaphroditis.

* staminibus a pistillo paulisper remotis.

→ floribus inferis.

† monopetalis.

↓ regularibus.

OLEA.

Cor. 4fida infundibuliformis. Drupa.

CERANTHUS.

Cor. 4partita: laciniis ovatis corniculo longis-
simo terminatis. Bacca 1locularis,
1sperma.

CHIONANTHUS.

Cor. 4fida: laciniis longissimis. Drupa.

PHILLYREA.

Cor. 4fida: laciniis ovatis. Bacca 1sperma.

LIGUSTRUM.

Cor. 4fida. Bacca 4sperma.

SYRINGA.

Cor. 4fida: laciniis linearibus. Capsula 2lo-
cularis.

HEBE.

Cor. 4loba: tubo brevi. Cal. 4fidus. Caps.
2valvis, 2locularis.

TUBIFLORA.

Cor. tubulosa: limbo 4partito. Cal. 6phyl-
lus. Caps. 2locularis, polysperma.

COOKIA.

Cor. 4partita: laciniis ovalibus. Cal. o. Caps.
1locularis, 1sperma.

ERANTHEMUM.

Cor. 5fida: laciniis obovatis, planis. Capsula.

JASMINUM.

Cor. 5fida. Bacca 2cocca.

NYCTANTHES.

Cor. 8fida. Bacca 2cocca.

MAYTENUS.

Cor. campanulata. Caps. rotunda, 1sperma.

11 irregularibus.

† seminibus capsulae inclusis.

GLOBIFERA.

Cor. 4fida. Cal. 4partitus persistens. Anth.
globosae. Caps. globosa, 1locularis
4valvis.

PAEDEROTA.

Cor. 4fida. Cal. 5partitus.

VERONICA.

Cor. limbo 4partito: lacinia inferiore angu-
stiore. Caps. obcordata.

GRATIOLA.

Cor. 4fida. Stamina 4, quorum 2 sterilia.

B 2

1233.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

† floribus hermaphroditis.

* staminibus a pistillo paulisper remotis.

→ floribus inferis.

† monopetalis.

‡ regularibus.

NIA, Najas.

IA.

ndricus, 2fidus.

Filamentum o.

o. Capsula ovata

p. t. 1. f. 2.

Amentum. Cal. 3

Cor. o.

Flores solitarii. Cal. 3

Cor. o. Bacca 3

13.

YNIA.

Flores monoici, a

♂. Cal. o.

♀. Cal. 1 phyllus,

panulatus.

circ. 4.

n. t. 167. Gaertn. de fr.

OLEA.
CERANTHUS.Cor. 4fida infundibuliformis. *Drupa.*
Cor. 4partita: laciniis ovatis corniculo longissimo terminatis. *Bacca* 1locularis, 1sperma.CHIONANTHUS.
PHILLYKEA.
LIGUSTRUM.
SYRINGA.Cor. 4fida: laciniis longissimis. *Drupa.*
Cor. 4fida: laciniis ovatis. *Bacca* 1sperma.
Cor. 4fida. *Bacca* 4sperma.
Cor. 4fida: laciniis linearibus. *Capsula* 2locularis.

HEBE.

Cor. 4loba: tubo brevi. *Cal.* 4fidus. *Caps.* 2valvis, 2locularis.

TUBIFLORA.

Cor. tubulosa: limbo 4partito. *Cal.* 6phyllus. *Caps.* 2locularis, polysperma.

COOKIA.

Cor. 4partita: laciniis ovalibus. *Cal.* o. *Caps.* 1locularis, 1sperma.

ERANTHEMUM.

Cor. 5fida: laciniis obovatis, planis. *Capsula.*

JASMINUM.

Cor. 5fida. *Bacca* 2cocca.

NYCTANTHES.

Cor. 8fida. *Bacca* 2cocca.

MAYTENUS.

Cor. campanulata. *Caps.* rotunda, 1sperma.

11 irregularibus.

† seminibus capsulae inclusis.

GLOBIFERA.

Cor. 4fida. *Cal.* 4partitus persistens. *Anth.* globosae. *Caps.* globosa, 1locularis 4valvis.

6. PAEDEROTA.

Cor. 4fida. *Cal.* 5partitus.

5. VERONICA.

Cor. limbo 4partito: lacinia inferiore angustiore. *Caps.* obcordata.

9. GRATIOLA.

Cor. 4fida. *Stamina* 4, quorum 2 sterilia.

CL

1233. SCHWENKIA. *Cor.* subaequalis: ore plicato, stelluloso. *Stamina* 3 sterilia.
27. JUSTICIA. *Cor.* ringens. *Capsula* ungue elastica, *thera* unica in lingulis filamentis.
28. DIANTHERA. *Cor.* ringens. *Antherae* 2 in singulis filamentis.
1228. CALCEOLARIA. *Cor.* ringens inflata. *Cal.* 4fidus.
30. PINGUICULA. *Cor.* ringens calcarata. *Cal.* 5fidus.
31. UTRICULARIA. *Cor.* ringens calcarata, femihians, eem barbata.
- FAGELIA. *Cor.* tubulosa, in ventrem globosum. *Filamenta* brachiis incurvis. *Bignonia Catalpa. Bartsia Gy. Martynia annua.*
- KYRTANDRA. *Nectarium* urceolatum. *Filamenta* 2 sterilia.
- GHINIA. *Cor.* 2labiata 2 fertilia spiralia. *Filamenta* 2 breviora antherae loculo altero.

†† *feminibus nudis.*

32. VERBENA. *Cor.* subinaequalis. *Cal.* lacinia superiora.
33. LYCOPUS. *Cor.* subaequalis. *Stam.* distantia.
34. AMETHYSTEA. *Cor.* subaequalis: lacinia infima ceteris breviora.
36. ZIZIPHORA. *Cor.* ringens: galea reflexa. *Cal.* 5fidus.
37. MONARDA. *Cor.* ringens: galea lineari obvolvenda.
38. ROSMARINUS. *Cor.* ringens: galea falcata. *Stamina* 4.
39. SALVIA. *Cor.* ringens. *Filamenta* transversa lata.
35. CUNILA. *Cor.* ringens: galea plana. *Stamina* rudimenta.
40. COLLINSONIA. *Cor.* subringens: labio capillari multo breviora.

††† *floribus tripetalis.*

- LITHOPHILA. *Cal.* 3phyllus. *Nectarium* 2phyllum.

†††† *floribus tetrapetalis.*

1353. THOUINIA. *Cal.* retrapetalis dentatus.

††††† *pentapetalis.*

- PENTAGLOSSUM. *Cor.* 4-5petala, calicis labio infero 4-5dentatus.

- *Holosteum diandrum. Viola diandra.*
- DIALIUM. *Cal.* o.
- → *floribus superis.*
- Cal. fructus* dentato-aristatus, floris bifidis.
- Cal.* 2phyllus. *Cor.* 2petala obcordata.
- Cal.* 3fidus. *Cor.* 3fida. *Caps.* 3locularis.
- Cal.* 4aristatus: *aristis* terminatis glochidibus cruciatis. *Cor.* 4fida. *Stigma* penicillatum.
- Cal.* 5partitus deciduus. *Cor.* o. *Bacca* ovata, altero latere fuleata, 1locularis, 1-2-sperma.
- Cal.* 5dentatus. *Cor.* 2labiata. *Caps.* 5coarctatae, 2valvas, 1loculares, 1spermae.
- * *Valeriana Cornucopiae.*
- Boerhaavia hirsuta, scandens, erecta.*
- Salicornia virginica.*
- Salix hermaphrodita.*
- Commelina vaginata, nudiflora.*
- Schoenus cladium, effusus, setaceus.*
- ** *flaminibus ad pistillum insertis* Orchideae.
- ORCHIS. *Nectarium* corniculatum.
- SATYRIUM. *Nectarium* serotiforme.
- OPHKYS. *Nectarium* subcarinatum.
- MALAXIS. *Nectarium* 1phyllum, concavum, cordatum, posterius acuminatum, anterius 2fidum, genitalia in medio fovens.
2. SERAPIAS. *Nectarium* ovatum, subtus gibbum.
3. LIMODORUM. *Nectarium* pedicellatum.
5. CYPRIPIDIUM. *Nectarium* inflato-ventricosum.
6. EPIDENDRUM. *Nectarium* turbinatum.
4. ARETHUSA. *Nectarium* connatum eum corolla ringente.
3. DISA. *Spatha* 1 valvis. *Petala* 3, tertium minus, bipartitum basi gibbum.
24. FORSTERA. *Cal.* duplex: exterior 3phyllus; interior superus 6fidus. *Cor.* tubulosa.
- †† *floribus declinis.*
- * *monoicis.*
37. ANGURIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5petala.