

qualis: ore plicato, stellata.

Stamina 3 sterilia.

Capsula ungue elasticum

enica in singulis filamentis.

Antherae 2 in singulis fili-

is inflata. Cal. 4fidus.

is calcarata. Cal. 5fidus.

is calcarata. Cal. 2phyllus.

is, ecalcarata, semibifida,

barbata.

ia, in ventrem globosum.

enta brachiis incurvis.

ma Catalpa. Bartsia Gy-

ynia annua.

urceolatum. Filamenta

dia.

ita 2 fertilia spiralia.

Fila-

viora antherae loculo alter-

lis.

acqualis. Cal. lacinia sup-

erialis. Stam. distantia.

qualis: lacinia infima con-

is: galea reflexa. Cal. fil-

is: galea linearis obvolve-

ns: galea falcata. Stamini-

ns. Filamenta transversis

ans: galea plana. Stamini-

nata.

agens: labio capillari mul-

talis.

lus. Nectarium 2phyllum

apetalis.

petalis dentatus.

ts.

petala, calicis labio inser-

mentatus.

DIALIUM.

→ *Holosteum diandrum. Viola diandra.*

Cal. o.

→ → *floribus superis.*

Cal. fructus dentato-aristatus, floris bifidus.

Cal. 2phyllus. Cor. 2petala obcordata.

Cal. 3fidus. Cor. 3fida. Caps. 3locularis.

Cal. 4aristatus: aristis terminatis glochidibus cruciatis. Cor. 4fida. Stigma penicillatum.

Cal. 5partitus deciduus. Cor. o. Baccia ovata, altero latere sulcata, 1locularis, 1-2-sperma.

Cal. 5dentatus. Cor. 2labiata. Caps. 5co-

litae, 2valvas, 1loculares, 1spermae.

ARUNA.

SCIURIS.

* *Valeriana Cornucopiae.*

Boerhaavia hirsuta, scandens, erecta.

Salicornia virginica.

Salix hermaphrodita.

Commelina vaginata, nudiflora.

Schoenus cladum, effusus, setaceus.

** *staminibus ad pistillum insertis Orchideae.*

99. ORCHIS.

10. SATYRIUM.

11. OPHRYS.

MALAXIS.

Nectarium corniculatum.

Nectarium scrotiforme.

Nectarium subcarinatum.

Nectarium 1phyllum, concavum, cordatum, posterius acuminatum, anterius 2fidum, genitalia in medio foveas.

Nectarium ovatum, subtus gibbum.

Nectarium pedicellatum.

Nectarium inflato-ventricosum.

Nectarium turbinatum.

Nectarium connatum cum corolla ringente.

Spatha 1 valvis. Petala 3, tertium minus, bipartitum basi gibbum.

Cal. duplex: exterior 3phyllus; interior su-

perus 6fidus. Cor. tubulosa.

†† *floribus declinis.*

monoicis.

037. ANGURIA.

Cal. 5fidus. Cor. 5petala.

B 3 ♀. Po

DIANDRIA.

1038. LEMNA.

♀. *Pomum* 2loculare, polyspermum.
Cal. 1phyllus. *Cor.* o.

OMPHALEA.

♀. *Caps.* 1locularis.*Flores* monoici. *Cor.* o.

♂. *Antiberae* apice columnae insidie
4phyllus.

♀. *Cal.* 5phyllus. *Stigm.* 3fidum.
nosa, 3locularis.

COSARIA.

Cal. communis flores confertos in
plano includens. *Carex diam-*

** dioicis.

1099. CECROPIA.

Spath. recept. comm. *Cor.* o.♀. *Bacca* 1sperma.

1098. SALIX.

Squama amenti. *Cor.* o.♀. *Stigm.* 2. *Caps.* 2valvis. *Sem.*

*** floribus polygamis.

1160. FRAXINUS.

Cal. o. f. 4partitus. *Cor.* o. f. 4petiata.
1. lanceolatum.

DIGYNIA.

* *Ophioxylum.*42. ANTHOXANTHUM. *Cal.* Gluma 1flora oblonga. *Co-*
aristata.

1272. GUNNERA.

Aimenti *Cal.* o. *Cor.* o. *Stamina* 4-
interra. *Sem.* 1.

MISANDRA.

Flores dioici, in racemis terminali-
o. *Cor.* o.

♂. *Anther.* 4gonae.

♀. *Germen* apice marginatum,
baccata, 2valvis, 1sperma.

TRIGYNIA.

* *Cinna Bifolia.**Saccharum Thunbergii*, Koenigii.*Agrostis diandra.**Holus odoratus.*

43. PIPER.

Cal. o. *Cor.* o. *Bacca* 1sperma.
thus polygamus.

1097. VALLISNERIA.

♂. *Spatha* multiflora. *Cor.* 3partit.

♀. *Spatha* 1flora. *Cal.* 3part. 0
Caps. 1locul.

DIANDRIA MONOGYNIA. Nyctanthes.

MONOGYNIA.

NYCTANTHES. *Cor.* 8fida. *Cal.* 8fidus. *Pe-*
ricarpium dicoccum.

1. N. caule tetragonum, foliis ovatis acuminatis, capsulis men-
branaceis compressis. *Rheede b. malab.* I. t. 21. *Gaerti-*
de fr. et sem. cent. 3. t. 51. f. 1.

2. N. foliis inferioribus cordatis obtusis: superioribus ovat-
acutis. *Rumpf amb.* 5. t. 30.

3. N. foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus
Rheede b. malab. 6. t. 55.

4. N. petiolis pedunculisque villosis. *Rheede b. malab.* 4. t. 48.

5. N. foliis obtusis lanceolatis ovatisque. *Rheede b. malab.* 6.
t. 53.

6. N. foliis cordatis lanceolatis acutis elongatis minoribusque
ramis teretibus. *Berg. ucf. angl.* 1772. I. II.

7. N. glauca, caule tereti, foliis lanceolatis acutis trinervi-
pedunculis trifidis. *Suppl. p. 82. an hujus generis?*

8. N. ramis teretibus elongatis, foliis ovatis acuminatis, pe-
dunculis axillaris unifloris: terminalibus trifloris. *Ko-*
nig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.

9. N. ramis teretibus hirsutis, foliis cordatis utrinque pub-
cens. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. p. 9.

10. N. glabra, ramis teretibus elongatis scandentibus, foli-
oblongo-cordatis, paniculis brachiatis axillaris. *Ko-*
nig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.

11. N. foliis lanceolato-acuminatis, pedunculis bigemini
Burm. thes. zegl. t. 59.

12. N. foliis ovatis alternis: ramulorum oppositis, peduncul-
terminalibus ternis unifloris. *Burm. ind.* t. 2.

13. N. foliis ovatis, pedunculis terminalibus multifloris. *Burm.*
ind. t. 3. f. 1.

MONOGYNIA.

NYCTANTHES. Cor. 8fida. Cal. 8fidus. Pericarpium dicoccum.

- siloculare, polyspermum
Cor. o.
ularis.
i. Cor. o.
apice columnae insiden-
tibus. Stigm. 3fidum. G.
ocularis.
r flores confertos in re-
studens. Carex diand-
comm. Cor. o.
serma.
ti. Cor. o.
Cap. 2valvis. Sem. plifo. 5. N. foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus.
iis. Rheed b. malab. 6. t. 55.
eritus. Cor. o. f. 4petaligata. 6. N. foliis cordatis lanceolatis acutis elongatis minoribusque,
platum.
a 1flora oblonga. Cor.
a.
o. Cor. o. Stamina 2.
Sem. 1.
in racemis terminalibus.
o.
gonae.
apice marginatum. C.
2valvis, 1sperma.
NIA.
Koenigii.
o. Bacca 1sperma.
lygamus.
ultiflora. Cor. 3partita.
flora. Cal. 3part. Cor.
ocul.
MO.
1. N. caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, capsulis mem-
branaceis compressis. Rheede b. malab. 1. t. 21. Gaertn.
de fr. et sem. cent. 3. t. 51. f. I.
bac. 2. N. foliis inferioribus cordatis obtusis: superioribus ovatis
acutis. Rumph amb. 5. t. 30.
ulata. 3. N. foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus.
Rheed b. malab. 6. t. 55.
ata. 4. N. petiolis pedunculisque villosis. Rheede b. malab. 4. t. 48.
5. N. foliis obtusis lanceolatis ovatisque. Rheede b. malab. 6.
t. 53.
ica. 7. N. glauca, caule tereti, foliis lanceolatis acutis trinerviis,
pedunculis trifidis. Suppl. p. 82. an hujus generis?
ine. 8. N. ramis teretibus elongatis, foliis ovatis acuminatis, pe-
dunculis axillaribus unifloris: terminalibus trifloris. Koe-
nig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.
9. N. ramis teretibus hirsutis, foliis cordatis utrinque pubes-
centibus. Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.
idens. 10. N. glabra, ramis teretibus elongatis scandentibus, foliis
oblongo-cordatis, paniculis brachiatis axillaribus. Koe-
nig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.
mina. 11. N. foliis lanceolato-acuminatis, pedunculis bigeminis.
ta. Burm. thes. zegl. t. 59.
lora. 12. N. foliis ovatis alternis: ramulorum oppositis, pedunculis
terminalibus ternis unifloris. Burm. ind. t. 2.
ltiflo. 13. N. foliis ovatis, pedunculis terminalibus multifloris. Burm.
ta. ind. t. 3. f. 1.

17. JASMINUM. Cor. 5fida. Antherae intra
Antrum duplicatum
lare baccas includen-

- officinale. 1. J. foliis oppositis: foliolis distinctis. *Bent. H.* p. 2. *Plenck pl. med.* t. 9.
- grandifl. 2. J. foliis oppositis pinnatis: foliolis extimus con-
rum. *Merian. surin.* t. 46.
- azoricum. 3. J. foliis oppositis ternatis. *Commelin. b. Amstel.*
- fruticans. 4. J. foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis
Mill. hort. angl. t. 6. *Gaertn. de fr. et sem.* 42. f. 1.
- humile. 5. J. foliis alternis acutiusculis ternatis pinnatisque,
gulatis. *Knorr del. hort.* t. t. I.
- odoratissi. 6. J. foliis alternis obtusis ternatis pinnatisque,
ramis. *Barr. ic.* 62.
- simplici- 7. J. foliis oppositis ovato-lanceolatis simplicibus,
folium. *austhr. p. 3.*
- didym. 8. J. foliis oppositis ternatis: foliolis ovato-lanceolati-
bus integerrimis. *Forst. fl. austhr.* p. 3.
- oblon- 9. J. foliis oppositis simplicibus, pedunculis alternisq.
gum. unifloris. *Burm. ind.* t. 3. f. 2.

COOKIA. Cor. 4partita: laciiniis ovalibus aequi-
Cal. o. Nux, locularis, co-
supera.

- Gaudia. 1. C. foliis subpetiolatis lanceolatis rigidis. *Forst.*
pl. t. 4. nov. act. Upf. 3. p. 173. *Banksia Gaudia-*
Seelandia.
- pilosa. 2. C. foliis subpetiolatis oblongis flaccidis pilosis. *Forst.*
act. Upf. 3. p. 174. *Banksia pilosa, in nova S.*
- prostrata. 3. C. foliis ferptibus ovato-oblongis carnosis. *Forst.*
Upf. 3. p. 175. *Banksia prostrata. Gaertn. de-*
cent. 3. t. 39. f. 1.

An Nyctanthes, Jasmine, Phillyria et Chionanthus cum Olea conjugi-

LIGUSTRUM. Cor. 4fida. *Antrum* duplicatum
2loculare 4spermum.

- 1. L. foliis ovatis obtusis panicula simpliciter trichotoma.
Blackw. herb. t. 142.
- 2) foliis deciduis.
- 3) foliis sempervirentibus, italicum.
- 2. L. foliis ovatis acuminatis, panicula decomposita trichotoma.
Thunb. fl. jap. p. 17. *nov. act. Upf. 3. p. 207.*

PHILLYREA. Cor. 4fida. *Bacca* 1sperma.

- 1. Ph. foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis.
- 2. Ph. foliis linear-lanceolatis integerrimis; *au varietas me-*
die?
- 3. Ph. foliis ovato-cordatis ferratis.
- 3) Ph. latifolia lacvis. *C. Baub. pin.* 476.

YTENUS. Cor. campanulata, integra. *Cal.*
hemisphaericus persistens. *Capf.*
1sperma.

- 1. **MATERNUS.** *Molin. nat. Chil.* p. 152.

OLEA. Cor. 4fida: laciiniis subovatis. *Drupa*
1sperma.

- 1. O. foliis lanceolatis. *Lehr. ol. europ.* ie. *Regnault hort.* t. 1.
- 2. O. foliis ovatis. *Dillen. b. Elth.* t. 170. f. 194.
- 3. O. foliis lanceolato-ellipticis. *Mant. p. 24.* *Catesb. car.* t. 61.
- 4. O. foliis lanceolatis ferratis, pedunculis lateribus aggrega-
tis unifloris. *Thunberg fl. jap.* p. 18.
- 5. O. foliis ovato-lanceolatis, floribus racemosis. *Petagni-*
tana. infi. brit. 2. p. 19.
- 6. O. foliis ellipticis integerrimis, racemis angustatis: bracte-
atis perfoliatis. *Ait. hort. Kew.* 1. p. 14.

*Antherae intra LIGUSTRUM. Cor. 4fida. Antrum duplicatum
2loculare 4spermum.*

*duplicatum
accas includens re. 1. L. foliis ovatis obtusis panicula simpliciter trichotoma.
Blackw. herb. t. 142.*

*incis. Best. H. E. a) foliis deciduis.
foliolis extimis confundi. b) foliis tempervirentibus, italicum.
Thunb. fl. jap. p. 17. nov. aet. Uff. 3. p. 207.*

*mumelin. b. Amstel. 1. PHILLYREA. Cor. 4fida. Bacca 1sperma.
sicibusque, ramis a
m. de fr. et sem. a*

*lia. 1. Ph. foliis ovato-lanceolatis subintegerimis.
enatis pinnatisque, ellipti. 2. Ph. foliis linear-lanceolatis integerimis; an varietas mo-
t. i. lia. diae?
itis pinnatisque, ramifolia. 3. Ph. foliis ovato-cordatis ferratis.
b) Ph. latifolia laevis. C. Baub. pin. 476.*

*colatis simplicibus. AYTENUS. Cor. campanulata, integra. Cal.
liglis ovato-lanceolatis hemisphaericus persistens. Caps.
f. 3. pedunculis alternis axillaris. 1. MAXTENUS. Molin. nat. Chil. p. 152.
f. 2.*

*OLEA. Cor. 4fida: laciniis subovatis. Drupa
iiis ovalibus aqua- 1sperma.*

*ropaea. 1. O. foliis lanceolatis. Lehr. ol. europ. ic. Regnault bot. t. 1.
genf. 2. O. foliis ovatis. Dillen. b. Elth. t. 170. f. 194.
atis rigidis. Forster d. merica- 3. O. foliis lanceolato-ellipticis. Mant. p. 24. Catesb. car. t.
173. Banksia-Gnidia, na. t. 61.
s flaccidis pilosis. For- ageans. 4. O. foliis lanceolatis ferratis, pedunculis lateralibus aggrega-
tis unifloris. Thunberg fl. jap. p. 18.
nia pilosa, in nova Sili- petana. 5. O. foliis ovato-lanceolatis, floribus racemosis. Petagn.
ongis carnosis. Forst. rostrata. Gaertn. de se- celsa. 6. O. foliis ellipticis integerimis, racemis angustatis: bracteis
perfoliatis. Ad. hort. Kew. 1. pl. 14.*

ntbus cum Olea conjugenda

da: laciniis lobis. Cor. 4loba: tubo brevi. Cal. 4fidus. Caps.

Drupa ba
era: putaminis.
loculari.

HEBE. Jussieu gen. plant. p. 105.

atesb. Car. 1. t. 6. **BIFLORA.** Cor. tubulosa: limbo 4partito. Cal.
6phyllus, inaequalis. Caps.
oris. Pluckn. alm.
ent. 3. t. 39. f. 6.
floribus subcapitatis.
sis, foliis lanceolatis.
p. 13. **DIALIUM.** Cor. 5petala. Cal. o. Stamina
tigiativis: ultimis
ctis incrassatis, fo
sp. p. 13. an hujusq.
amine sphæeric.
ERANTHEMUM. Cor. 5fida: tubo filiformi.
acuminatis. Jacq.

TURIFLORA. Walt. flor. carol. p. 61. Anonymus.

40. **DIALIUM.** Cor. 5petala. Cal. o. Stamina
ad latus superius.

ERANTHEMUM. Cor. 5fida: tubo filiformi.
Antherae extra tubum.
Stigma simplex.

laciniis ovatis crenatis. 1. E. foliis lanceolato-ovatis petiolatis.
mo terminatis, guisatio- 2. E. foliis linearibus remotis patulis. Burm. dec. afr. t. 47.
apice compressum. f. 3. Sp. plant. p. 877. Selago dubia.
folioli. 3. E. foliis ovato-linearibus imbricatis. Maut. p. 171. Com-
perima.
am. 1. p. 14. folio- 4. E. foliis carnis teretiusculis linearibus glaberrimis, race-
des. mis axillaribus calycibusque pubescentibus, tubo recurvo.
Suppl. p. 82.

4. **CIRCAEA.** Cor. dipetala. Cal. diphyllus, su-
perus. Caps. infera 2locul-
aris, hispida. Sem. solitaria.

*Knorr del. hort. 2.
fl. dict. t. 164. f. 1.
ue. Thunb. fl. jap.
istrum suspensum.
ioribus pinnatis, sup.
G. Gmelin it. 3. t. 3.
Fl. dan. t. 210.*

25. VERONICA. Cor. limbo 4partito: Iaci-

ma angustiore. Cap.

laris, apice emarginato-

* spicatae.

fibrifera. 1. V. spicis terminalibus, foliis septenis verticillatulo-

subhirsuto. Ann. stirp. I. Ruth. t. 4.

virginica. 2. V. spicis terminalibus, foliis quaternis quinque-

ic. pl. I. t. 13.

spuria. 3. V. spicis terminalibus, foliis ternis aequaliter folia-

G. Gmelin it. I. t. 39. Jungb. plant. ic. 2.

maritima. 4. V. spicis terminalibus, foliis ternis inaequalitea-

Fl. dan. t. 374.

longifo. 5. V. spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis,

acuminatis in petiolum definitibus. Sabbat.

ha. t. 48.

incana. 6. V. spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis ob-

le erecto tomentoso. Kniphof bot. orig. cent. I.

incisa. 7. V. spicis terminalibus, foliis glabris lanceolatis

natifidis. A&G. hort. Kew. I. p. 19.

spicata. 7. V. spica terminali, foliis oppositis crenatis obti-

llata. adscendente simplicissimo. Flor. dan. t. 52.

hybrida. 8. V. spicis terminalibus, foliis oppositis obtuse fa-

bris, caule erecto. Raj. angl. 3. t. II. f. I.

pinnata. 9. V. spica terminali, foliis linearibus dentato pinn-

ibus prostratis. Mant. p. 24. Laxmann A&G. pe-

t. 29. f. I.

officina. 10. V. spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppo-

lis. procumbente. Fl. dan. t. 248. Gaertn. de-

cent. 4. t. 54. f. 7. β) Allion. spec. I. t. 4. f. 3. 5. 3.

ca repens.

Iaciniata. 48. V. racemo subspicato terminali, foliis pinnati-

tis. A&G. hort. Kew. I. p. 19.

** Corymbosa - racemosae.

aphylla. 11. V. corymbo terminali paucifloro, foliis radicali-

scapoque nudo hirsutis. Seg. pl. veron. t. 3. f.

12. V. hirta, racemo trifloro elongato lateralí aphylo, foliis

ovatis f. oblongis ferratis hirtis: pilis articulatis. Suppl.

p. 83.

13. V. hirsuta, racemo terminali subcorymboso, caule ad-

scendente simplicissimo, foliis obtusis oppositis crenatis.

Mant. p. 316. Hall. bift. stirp. Helv. t. 15. f. I.

14. V. corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis cre-

natis, caulis fruticosus. Mant. p. 316. Fl. dan. p. 342.

15. V. corymbo terminali, foliis oppositis, calicibus hispidis.

Fl. dan. t. 16.

16. V. racemo terminali subcorymboso, foliis oppositis subo-

vatis crenulatis glabriusculis, pedunculus folia floralia fu-

perantibus, caulis calicibusque tomentosis. Suppl. p.

83. Flor. dan. t. 342.

β) Scop. ann. bift. nat. 2. p. 42? Veronica frutescens.

51. V. caule repente, foliis laevibus crenulatis, racemis bre-

vibus confertis erectis. Allion. flor. pedem. t. 22. f. 1.

17. V. racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris cre-

natis. Fl. dan. t. 492.

42. V. racemis terminalibus flexuosis, caule suffruticoso, fe-

liis lanceolatis ferratis. Forst. fl. aust. p. 3.

43. V. racemis lateralibus, caule fruticoso, foliis ellipticis it-

tegerrimis. Forst. fl. aust. p. 3.

44. V. racemis lateralibus nutantibus, caule fruticoso, foli-

longo-lanceolatis integerrimis. Forst. fl. aust. p. 3.

18. V. racemis lateralibus foliis ovatis planis, caule repen-

Fl. dan. t. 511.

19. V. racemis lateralibus, foliis lanceolatis ferratis, ca-

recto. Rivin. t. 100.

20. V. racemis lateralibus laxis divaricatis alternis: pedice-

pendulis, foliis linearibus integerrimis. Fl. dan. t. 20.

21. V. racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis d-

tatis obtusiusculis, caulis procumbentibus. Rivin. t.

Plenck pl. med. t. 13.

Veronica.

- partito: lacia. 12. V. hirta, racemo trifloro elongato lateralí aphylo, foliis ovatis s. oblongis ferratis hirtis: pilis articulatis. *Suppl. p. 83.*
- tiore. Caps. 13. V. hirsuta, racemo terminali subcorymboso, caule adscendente simplicissimo, foliis obtusis oppositis crenatis. *Mant. p. 316. Hall. hist. stirp. Helv. t. 15. f. 1.*
- ice emarginatilioi- 14. V. corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis cre-
s. t. 4. natis, caulis fruticulosis. *Mant. p. 316. Fl. dan. p. 342.*
- ternis quinisque. ca. 15. V. corymbo terminali, caulis procumbentibus, foliis lanceolatis, calicibus hispitos. *Hall. hist. stirp. Helv. I.*
- ernis aequaliter fermis. 16. V. racemo terminali subcorymboso, foliis oppositis lanceolatibus, sub-
oppositis crenatis obtusiusculis, pedunculis folia floralia su-
perantibus, caulis calicibusque tomentosis. *Suppl. p. 83. Flor. dan. t. 342.*
- of bot. orig. cent. 7. 17. V. racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris cre-
glabris lanceolatis innotella. 18. V. caule repente, foliis laevibus crenulatis, racemis bre-
vibus confertis creditis. *Allion. flor. pedem. t. 22. f. 1.*
- p. 19. 19. V. racemis terminalibus flexuosis, caule suffruticoso, fo-
liis lanceolatis ferratis. *Forst. fl. aust. p. 3.*
- ositis crenatis obtusiusculis. 20. V. racemis lateralibus, caule fruticoso, foliis ellipticis in-
terrimis. *Forst. fl. aust. p. 3.*
- flor. dan. t. 52. 21. V. racemis lateralibus nutantibus, caule fruticoso, foliis longo-lanceolatis interrimis. *Forst. fl. aust. p. 3.*
- oppositis obtuse sem- 22. V. racemis lateralibus foliis ovatis planis, caule repente.
tate. *Fl. dan. t. 511.*
- caribus dentato pinnaluptica. 23. V. racemis lateralibus, foliis lanceolatis ferratis, caule
Laxmann Aet. petri- 24. V. racemis lateralibus foliis pinnatifidis, caule erecto. *Rivin. t. 100.*
- lucifolia. 25. V. racemis lateralibus foliis linearibus integerrimis. *Fl. dan. t. 209.*
- ulatis, foliis oppositi- 26. V. racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis den-
tatis obtusiusculis, caulis procumbentibus. *Rivin. t. 95.*
248. Gaertn. de fl. acca- 27. V. racemis lateralibus foliis radicalibus, caule erecto. *Plenck pl. med. t. 13.*
- i spec. I. t. 4. f. 3. lunga. 28. V. racemis lateralibus foliis pinnatifidis, caule erecto. *Rivin. t. 100.*
9. 29. V. racemis lateralibus foliis linearibus integerrimis. *Fl. dan. t. 209.*
- sae. 30. V. racemis lateralibus laxis divaricatis alternis: pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Fl. dan. t. 209.*
- ifloro, foliis radicalibus 31. V. racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis den-
tatis obtusiusculis, caulis procumbentibus. *Rivin. t. 95.*
- g. pl. veron. t. 3. f. 2. 32. V. racemis lateralibus foliis linearibus integerrimis. *Fl. dan. t. 209.*

- pilosa. 22. *V. racemis subspicatis*, foliis ovatis obtusis plicatis prostrato piloso. *Spec. pl. 1663.* 38. *V. floribus solitariis*, foliis digitato-partitis, pedunculis calice brevioribus. *Fl. dan. t. 252.*
- prostrata. 23. *V. racemis lateralibus*, foliis oblongo-ovatis ferratis prostratis. *Moench fl. Hass. I. t. 1.* 52. *V. caule erecto*, foliis succulentis: caulinis pinnato-dentatis; floralibus integerimis. *Allion flor. ped. t. 22. f. 4.*
- peccinata. 24. *V. racemis lateralibus foliatis*, foliis oblongis pectinatis, caulinis prostratis. *Mant. p. 24. Buxb. t. 39.* 39. *V. floribus solitariis subfessilibus*, foliis oblongis subtruncatis, caule erecto. *Mant. p. 317.*
- montana. 25. *V. racemis lateralibus paucifloris*, calicibus hirsutis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *p. 83. Jacquin fl. aust. 2. t. 109.* 46. *V. floribus solitariis subfessilibus foliis oblongis subincisis*: caulinis obtusis oppositis, caule suberecto. *Walt. flor. carol. p. 61.*
- Chamaea. 26. *V. racemis lateribus*, foliis ovatis sessilibus rugosum drys. 40. *V. floribus solitariis pedunculatis*, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpiloso. *Bocon. mus. 2. t. 102.*
- austriaca. 27. *V. racemis lateribus*, foliis linear-lanceolatis pinnatis. *Morif. bift. pl. 2. t. 23. f. 17.* 41. *V. floribus solitariis sessilibus*, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerimis, caule erecto. *Fl. dan. t. 407.*
- multifida. 28. *V. racemis lateribus* foliis multipartitis laciniatibus erectis. *Jacq. fl. aust. 4. t. 329.* 42. *V. floribus solitariis sessilibus*, foliis linearibus, caulinis diffusis. *Murr. comm. Goett. 1782. t. 3.*
- urticaefolia. 29. *V. racemis lateribus*, foliis ovato-lanceolatis hirsutis serratis, caule erecto. *Suppl. p. 83. Jacq. fl. aust.* 53. *V. floribus solitariis subfessilibus*, foliis suborbiculatis integerimis, caule prostrato-fruticoso. *Gonan. illustr. t. 1. f. 2.*
- latifolia. 30. *V. racemis lateralibus*, foliis cordatis rugosis dentatis stricto. *Jacq. fl. aust. 1. t. 60. Veronica Pseudochamaea.* 54. *V. hirsuta*, caule erecto simplici, foliis linearibus fructu subfessili: brevioribus. *Allion. flor. pedem. t. 85. f. 1.*
- panicula. 31. *V. racemis lateralibus longissimis*, foliis lanceolatis serratis, caule adscendente. *Calic. 4fidi.*
- *** Pedunculis unifloris.
- biloba. 32. *V. racemis lateralibus*, foliis oblongis dentatis, capitulo partitis. *Buxb. cent. I. t. 36.* 1. *P. foliis pinnatis.* *Phuckn. phyt. 320. f. 5.*
- decussata. 33. *V. floribus racemosis axillaribus*, foliis ovalibus integerrimis. *Moench Weissenstein p. 137.* 2. *P. foliis serratis: inferioribus alternis.* *Mant. p. 171. Jacq. H. Vindob. 2. t. 121.*
- agrestis. 34. *V. floribus solitariis*, foliis cordatis petiolatis petiolaris brevioribus. *It. dan. t. 449.* 3. *P. foliis serratis oppositis.* *Jacq. fl. aust. 5. app. t. 39.*
- arvensis. 35. *V. floribus solitariis*, foliis cordatis sessilibus planis longioribus. *Fl. dan. t. 515.* 4. *P. corollarum labio superiore indiviso.* *Suppl. p. 84.*
- hederae. 36. *V. floribus solitariis*, foliis cordatis planis quinq. folia. *Fl. dan. t. 423.* 5. *P. corollarum labio superiore bifido.*
- Lappago. 45. *V. floribus solitariis*, foliis subcuneiformibus angulis obtusis. *Schrantz Baiersch. Flor. I. p. 21.* 6. *P. foliis oblongis integris oppositis*, floribus axillaribus oppositis, calicem dentibus intus hirsutis. *Koenig apud Retz obs. bot. 5. p. 10.*
- triphylla. 37. *V. floribus solitariis*, foliis digitato-partitis, petiolaris longioribus. *Fl. dan. t. 627.*

GLO-

- apicis obtusis plicatis. 38. V. floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis longo-ovatis serratis. 39. V. caule erecto, foliis succulentis: caulinis pinnato-dentatis; floralibus integerimis. Allion flor. ped. t. 22. f. 4. f. I. t. I.
foliis oblongis pena. 40. V. floribus solitariis subfessilibus, foliis oblongis subtus dentatis, caule erecto. Mant p. 317.
dant. p. 24. Buxb. ini. 41. V. floribus solitariis subfessilibus foliis oblongis subincisis: caulinis obtusis oppositis, caule suberecto. Walt. flor. carol. p. 61.
is, calicibus hirsutis. 42. V. floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis glabris cre-
tatis, caule erecto subpiloso. Bocon. mus. 2, t. 102.
foliis fessilibus rugosis. 43. V. floribus solitariis fessilibus, foliis lanceolato-linearibus
glabris obtusis integerimis, caule erecto. Fl. dan. t. 407-
i-lanceolatis pinnata. 44. V. floribus solitariis fessilibus, foliis linearibus, caulinis
f. 17. diffusis. Murr. comm. Goett. 1782. t. 3.
tipartitis laciniatis, a. 45. V. floribus solitariis subfessilibus, foliis suborbiculatis in-
4. t. 329. aula. 53. V. floribus solitariis subfessilibus, foliis suborbiculatis in-
tegerimis, caule prostrato-fruticoso. Gouan. illustr.
p. 83. Jacq. fl. aust.
foliis rugosis dentatis, ardi. 54. V. hirsuta, caule erecto simplici, foliis linearibus fructu-
eronica Pseudochama-
is, foliis lanceolatis. 55. V. foliis pinnatis. Pluckn. phyt. 320. f. 5.
foliis dentatis, capsulae 1. P. foliis pinnatis. Pluckn. phyt. 320. f. 5.
s, foliis ovalibus dentatis. 2. P. foliis serratis: inferioribus alternis. Mant. p. 171. Jacq.
stein p. 137. H. Vindob. 2. t. 121.
ordatis petiolatis pedunculata. 3. P. foliis serratis oppositis. Jacq. fl. aust. 5. app. t. 39.
ordatis planis quinque- 4. P. corollarum labio superiore indiviso. Suppl. p. 84.
foliis fessilibus pedunculata. 5. P. corollarum labio superiore bifido.
ordatis planis quinque- 6. P. foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus op-
foliis fessilibus pedunculata. 7. P. foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus op-
positis, calicum dentibus intus hirsutis. Koenig apud
Retz olf. bot. 5. p. 10.
cuneiformibus 3 - 5ang.
erscb. Flor. 1. p. 218.
igitato-partitis, pedunculata. 8. P. foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus op-
positis, calicum dentibus intus hirsutis. Koenig apud
Retz olf. bot. 5. p. 10.
t. 627.

GLOBIFERA. *Cor. tubulosa*, *4fida*, *ina*^a. *Cal. 4partitus*, *inaequalis*, *sistens*. *Amb. globosa*^a. *Caps. globofa*, *ilocularis*, *polysperma*.

Umbros. 1. **GLOBIFERA.** *Walt. flor. carol.* p. 63.

27. JUSTICIA. *Cor. ringens*. *Caps. 2loculari* *ofo*^a. *num retinaculisi* *2valvis*, *longitudinalibus uncic*^a. *Stamina* *anthera* *solitaria*.

* *fruticosae.*

Adhaes- 1. *J. arborea*, *foliis lanceolato-ovatis*, *bracteis ovatis*^a, *tibus*, *corollarum galeo concava*. *Pluckn. alm.* f. 3.

Ebolium. 2. *J. fruticosa* *foliis lanceolato-ovatis*, *spicis tetragoneis*, *ovatis ciliatis*, *corollarum galea reflexa*. *Zeyl. t. 4. f. 1.*

pulcherri- 3. *J. fruticosa*, *foliis ovatis utrinque acuminatis peti-*^a *ma*, *terminalibus tetragonis erectis*: *bracteis ovatis*^a, *p. 84.* *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 259. f. 1. coll.*

Betonica. 4. *J. fruticosa*, *foliis lanceolato-ovatis*, *bracteis ovatis venoso-reticulatis coloratis*. *Rheed. hort. ma-*^a

scorpioi- 5. *J. fruticosa*, *foliis lanceolato-ovatis hirsutis fessil-*^a *des*. *laris*, *recurvatis*.

piæta. 6. *J. fruticosa*, *foliis lanceolato-ovatis piætis*, *corolla-*^a *flatis*. *Rumpf amb. 4. t. 30.* *Caul. Stirp. Pol. ad. 39.* *lucida*.

infundi- 7. *J. fruticosa* *foliis lanceolato-ovatis quaternis*, *bifolia*^a, *buliformis*. *Rheed. b. mal. 9. t. 62.*

spinosa. 8. *J. fruticosa*, *spinis axillaribus*, *pedunculis laterali-*^a *pl. p. 1663.* *Jacq. Stirp. amer. piæt. t. 2.*

β) *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.* *Justicia bispinosa.*

γ) *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.* *Justicia appressa.*

trispino- 9. *J. foliis lanceolato-ovatis*, *spicis terminalibus*^a, *galea brevi*. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.*

10. *J. foliis incrinitibus*; *spinis stipularibus bracteisque margine spinosis*. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.*

11. *J. fruticosa*, *foliis ellipticis*, *thyrsis terminalibus*. *Ment. p. 172.* *Pluckn. phyt. 193. f. 3.*

12. *J. fruticosa*, *foliis ovatis fessilibus*, *floribus axillaribus solitariis pedunculatis*. *Suppl. p. 85.*

13. *J. fruticosa glabra*, *foliis lanceolatis elongatis*, *spicis verticillatis*. *Suppl. p. 85.*

14. *J. fruticosa*, *foliis lanceolatis integerrimis*; *pedunculis trifloris ancipitibus*; *bracteis calice brevioribus*. *Mill. diff. ic. 13.*

15. *J. fruticosa glabra*, *ramis junioribus tetragonis tuberculatis*, *foliis lanceolatis subintegerrimis*, *racemo terminali erecto*. *Jacq. collect. 3. p. 253.*

16. *J. suffruticosa*, *caule tereti*, *foliis orbiculatis*, *spicis terminalibus*, *floribus solitariis*, *bracteis obcordatis*. *Suppl. p. 85.*

17. *J. villosa*, *foliis ovatis integris*, *floribus axillaribus verticillatis integris*. *Suppl. p. 85.*

18. *J. foliis ovato oblongis ciliatis*, *floribus ternis verticillatis fessilibus*. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 5.*

19. *J. foliis ellipticis acuminatis*, *racemis spicaeformibus verticillatis*; *bracteis minutis*, *pedicellis calcicibusque glabris*. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 13.*

20. *J. aculeata*, *foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis*. *Swarts n. pl. gen. et sp. p. 13.*

21. *J. diffusa spinosa*: *spinis setaceis*, *floribus pedunculatis axillaribus solitariis*. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 13.*

22. *J. foliis ovatis repandis*, *pedunculis axillaribus trifidis*. *Forsk. fl. aust. p. 3.*

23. *J. suffruticosa*, *foliis linearibus sinuatis*, *pedunculis axillaribus trifidis*. *Forsk. fl. aust. p. 4.*

24. *J. foliis ovatis integerrimis*, *spicis terminalibus verticillatis*; *verticillus quadrifloris*. *Aublet pl. guj. 1. p. 12. t. 4.*

45. *J.*

distincta species *Justicia Forskæhlii foetida*, *odorem quippe alliacenum spirans?*

- , 4fida, inae^{cta}. 10. J. foliis incernibus; spinis stipularibus bracteisque margine spinosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 6.*
- tus, inaequalis. 11. J. fruticosa, foliis ellipticis, thyrsis terminalibus. *Mant. p. 172. Pluckn. phyt. t93. f. 3.*
- Inth. globosae.* 12. J. fruticosa, foliis ovatis sessilibus, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Suppl. p. 85.*
- Ilocularis*, 4lo-
a. 13. J. fruticosa glabra, foliis lanceolatis elongatis, spicis verticillatis. *Suppl. p. 85.*
- Caps. 2locularis*, opiso-
naculis 14. J. fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis; pedunculis trifloris ancipitibus; bracteis calice brevioribus. *Mill. diff. ic. 13.*
- 2valvis:
inalibus uncicul-
hēra solitaria. 15. J. suffruticosa glabra, ramis junioribus tetragonis tuberculatis, foliis lanceolatis subintegerrimis, racemo terminali erecto. *Jacq. collect. 3. p. 253.*
- ratis, bracteis ovatis,
ava. *Pluckn. atm. 9.* 16. J. villosa, caule tereti, foliis orbiculatis, spicis terminalibus, floribus solitariis, bracteis obcordatis. *Suppl. p. 85.*
- spicis terragoni-
um galea reflexa. 17. J. foliis ovato-oblongis ciliatis, floribus ternis verticillatis sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p. 5.*
- ue acuminatis petiolis
etis: bracteis ovatis.
da. 18. J. foliis ellipticis acuminatis, racemis spicaeformibus verticillatis: bracteis minutis, pedicellis calcibusque glabris. *Swarts nov. pl. gen. p. 13.*
- ovatis, bracteis ovatis.
Rheed. hort. malabar. 19. J. aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis. *Swarts n. pl. gen. et sp. p. 13.*
- ovatis hirsutis sessilibus.
lecularis. 20. J. diffusa spinosa: spinis setaceis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 13.*
- ratis pectinis, corollis.
Caul. striat. Fol. ms. Panda. 21. J. foliis ovatis repandis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forst. fl. aust. p. 3.*
- ratis quaternis, bra-
ngifolia. 22. J. suffruticosa, foliis linearibus sinuatis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forst. fl. aust. p. 4.*
- pedunculis lateralis.
riegata. 23. J. foliis ovatis integerrimis, spicis terminalibus verticillatis: verticillis quadratoris. *Aublet pl. guj. I. p. 12. f. 4.*
- ficia bispinosa.
cia appressa. 24. J. foliis ovatis integerrimis, spicis terminalibus verticillatis: verticillis quadratoris. *Aublet pl. guj. I. p. 12. f. 4.*
- cis terminalibus im-
vab. p. 6. 25. J. foliis ovatis integerrimis, spicis terminalibus verticillatis: verticillis quadratoris. *Aublet pl. guj. I. p. 12. f. 4.*
- An aliudinda species *Justicia* *Forskæhlii* foetida, odorem quippe alliacum spirans?

DIANDRIA MONOGYNIA. Justicia.

- maduren. 45. J. foliis ovalibus obtusis dentatis, floribus axillaris.
tariis. Burm. ind. t. 4. f. 3.
- ** herbaceae.
- acaulis. 18. J. acaulis. Suppl. p. 84.
- ciliaris. 19. J. herbacea foliis lanceolatis, floribus oppositis
braetis calicibusque sericeis hispidis flore lo-
Facq. b. Vindob. 2. t. 104.
- procumbens. 20. J. foliis lanceolatis integerrimis, spicis termina-
ralibusque alternis, braetis tetaceis, caule pro-
Pluckn. alm. t. 56. f. 3. et t. 393. f. 4.
- pestinata. 21. J. diffusa, spicis axillaribus sessilibus tomento-
doro imbricatis: braetis femilanceolatis.
- repens. 22. J. foliis ovatis suberenatis, spicis terminalibus
lanceolatis, caule repente. Burm. tb. zeyl. t. 3
interdum lanceol. sessil.
- viridis. 23. J. foliis oblongis integris, spicis terminalibus
braetis ovato-lanceolatis, galea linearis reflexa
Forsk. fl. aeg. arab. p. 5.
- triflora. 24. J. pedunculis axillaribus folio longioribus apice
Forsk. fl. aeg. arab. p. 4.
- sinensis. 25. J. foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis
brevibus, braetis ovalibus. Burm. ind. 8. t. 4.
- panicula- 26. J. paniculis axillaribus petiolo longioribus, folio
ta. lanceolatis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 4.
- echooides. 27. J. foliis lanceolato-linearibus obtusis sessilibus
adscidente-secundis: braetis setaceis. Hen-
t. 669.
- sexangu- 28. J. foliis ovatis integerrimis, braetis cuneiformi-
laris. sexangularibus. Pluckn. alm. t. 279. f. 6. ann.
echoiode?
- carthagi- 29. J. foliis lanceolato-ovalibus, floribus spicatis,
nenensis. longo-cuneatis. Sp. pl. p. 1663. Jacq. stirp.
t. 7.
- assurgens. 30. J. foliis ovatis integerrimis, braetis subulatis, rida.
gonis. Brown. jam. t. 2. f. 1.
- nasuta. 31. J. foliis lanceolato-ovatis integerrimis, peduncu-
tomis. Rheed. h. malab. 9. t. 69. Corolla co-

DIANDRIA MONOGYNIA. Justicia.

32. J. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis sexfloris: pedicel-
lis lateralibus bifloris, braetis ovatis parallelis. Rheed.
b. mal. 9. t. 43.
- area. 33. J. foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris,
caule geniculato, spicis secundis. Rumpf amb. 6. t. 22.
f. 1. Gaertn. de fr. et sem. ceut. 4. t. 54. f. 4. Caulis
radicans.
- etica. 34. J. foliis ovatis, racemis simplicibus longis, floribus alter-
nis secundis, braetis obsoletis. Rheed. b. mal. 9. t. 56.
- ica. 35. J. foliis ovatis serratis, spicis terminalibus: braetis sera-
ccis, caule patulo. Thunb. fl. Jap. p. 20.
- hora. 42. J. diffusa, foliis ovatis integris, spicis secundis: braetis
lanceolatis, anterioribus alatis. Koenig apud Retz. ob-
bot. 5. p. 9.
- etrosa. 43. J. caule tetragono erectissimo, foliis ovato-lanceolati-
spicis ovatis. Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 14.
- inea. 44. J. foliis ovatis glabris integerrimis, spicis terminalibus ve-
ticillatis: floribus sessilibus. Aubl. pl. guj. I. p. 10. t.
- nz. 46. J. foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalib-
cernuis, braetis setaceis. Burm. ind. t. 5. f. 1.
- eta. 47. J. foliis lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus si-
tariis. Rumpf amb. 6. t. 23.
- DIANTHERA.** Cor. ringens. Stamen utri-
que antheris binis alterri-
Caps. 2locularis, 2valv-
unge elastico diffili-
- + fruticosae.
1. D. fruticosa, floribus axillaribus sessilibus. Synt. veget.
14. p. 62. Justicia sessilis. Jacq. stirp. amer. pict.
21. D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus subspicatis:
etis setaceis, caule laevi. Jacq. stirp. am. p. 4.
22. D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus subspicatis:
etis setaceis, caule hirsuto. Jacq. stirp. am. p. 4.

- tatis, floribus axillaris. 32. *J. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis sexfloris: pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ovatis parallelis.* Rheed. b. mal. 9. t. 43.
- urea. 33. *J. foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis.* Rumpf amb. 6. t. 22. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 54. f. 4. Caulis radicant.
- getica. 34. *J. foliis ovatis, racemis simplicibus longis, floribus alternatis, spicis terminalibus letaceis, caule procumbente.* Rheed. b. mal. 9. t. 56. t. 393. f. 4.
- onica. 35. *J. foliis ovatis serratis, spicis terminalibus: bracteis setaceis, caule patulo.* Thunb. fl. Jap. p. 20.
- visoria. 42. *J. diffusa, foliis ovatis integris, spicis secundis: bracteis lanceolatis; anterioribus alatis.* Koenig apud Retz. obs. bot. 5. p. 9.
- norosa. 43. *J. caule tetragono erectissimo, foliis ovato-lanceolatis, spicis terminalibus integratis, galea linearis reflexa.* Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 14.
- ceinea. 44. *J. foliis ovatis glabris integerrimis, spicis terminalibus verticillatis: floribus sessilibus.* Aubl. pl. guj. I. p. 10. t. 3.
- olio longioribus apice lateralibus, pedunculis Burm. ind. 8. t. 4. retia. 47. *J. foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalibus cernuis, bracteis setaceis.* Burm. ind. t. 5. f. 1.
- ribus obtusis sessilibus, foliis longioribus, foliis arabi. p. 4. Herm. s, bracteis cuneiformibus, alm. t. 279. f. 6. aneu us, floribus spicatis, br. p. 1663. Jacq. Stirp. am. 2. f. 1. is, bracteis subulatis, ramulida. 2. f. 1. is integrerrimis, pedunculis hirsuta. 2. f. 69. Corollae car.
- † fruticosae.
1. *D. fruticola, floribus axillaribus sessilibus.* Syst. veget. ed. 14. p. 62. Justicia sessilis. Jacq. Stirp. amer. pict. t. 3.
21. *D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus subspicatis, bracteis setaceis, caule laevi.* Jacq. Stirp. am. p. 4.
22. *D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus subspicatis: bracteis setaceis, caule hirsuto.* Jacq. Stirp. am. p. 4.