


1er ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FAUNA ACUATICA



14 de octubre de 1994

RESUMENES

ORGANIZAN:

Sociedad Zoológica del Uruguay
Instituto Nacional de Pesca

EL PINGUINO REY Aptenodytes patagonicus (Sphenisciformes,
Spheniscidae) EN URUGUAY.

Enrique M. González* & Federico Achaval**

* Museo Nacional de Historia Natural, Casilla de Correos 399, Montevideo y Departamento de Zoología, Centro de Estudios de Ciencias Naturales Prof. Francisco Oliveras, Avda. de las Instrucciones 948.

** Sección Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias, Tristán Narvaja 1674, Casilla de Correos 10.773, 11.200 Montevideo, Uruguay.

Hasta el presente ha sido reportado para Uruguay el arribo, circanual u ocasional, de dos géneros y tres especies de pingüinos. Con los ejemplares motivo de esta nota se suman un género y una especie.

En el año 1945, el Dr. Henry Ogando, encontró en La Paloma (Departamento de Rocha), un pingüino rey, (com. pers.); no quedó registro de este arribo.

En diciembre de 1988 fue encontrado otro individuo en el balneario "Los Moros" (Rocha), a la altura del KM 245 de la ruta 9. Fue preparado, eviscerado e inyectado con formol, el ejemplar fue ingresado a la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay, con el N^o MNHN 04785.

El 16 de setiembre de 1990 se localizó en la costa de La Paloma (Rocha) un nuevo ejemplar, que había salido a la playa el día 2 de ese mes. Este pingüino pudo ser observado vivo por uno de los autores (F. A.), quien lo trasladó a Montevideo y entregó al Zoológico Municipal de Villa Dolores. Murió casi seis meses más tarde, el día 23-II-1991, y se perdió el cuerpo.

MEDIDAS.- El ejemplar MNHN 04785, único del que se disponen medidas, se trata de un individuo de sexo indeterminable, cuyas medidas, tomadas sobre el ejemplar preparado y expresadas en cm son las siguientes:

LT 100 Cola 12 Ala (desde axila) 33 Tarso -- Uña 2,6
Culmen expuesto 9,5 Altura 75

CONCLUSIONES.- Por lo expuesto, los ejemplares recolectados en Uruguay representan, junto con el reportado para Sudáfrica, los registros más septentrionales de la especie. Las localidades de colecta se encuentran a más de 500 Km (34^o 25' lat. Sur) del "Sur de la Provincia de Buenos Aires" (39^o lat. Sur), considerado hasta ahora límite Norte de su distribución normal, y a unos 200 Km al Norte de Playa Aguas Verdes.

La mayoría de los autores considera esta especie monotípica, mientras que otros refieren como válida la forma A. p. halli Mathews. Según estos últimos autores, la subespecie típica se distribuye en la región atlántica, mientras que A. p. halli, con localidad típica en la Isla Macquarie, se encuentra tanto en el Océano Índico como en el Atlántico y el Pacífico. Los ejemplares llegados a Uruguay corresponderían, según la diagnosis de Mathews, a la subespecie típica A. p. patagonicus.