

Suborden **Cariamae** Fürbringer, 1888
 Familia **Cariamidae** Bonaparte, 1853
 Género **Cariama** Brisson, 1760

Cariama cristata Chuña de patas rojas
 Especie monotípica; *C. cristata* (Linné), 1766: (Nordeste del Brasil).

Orden **CHARADRIIFORMES** (Huxley), 1867
 Suborden **CHARADRII** (Huxley), 1867
 Superfamilia **Jacanoidea** Wetmore & Miller, 1926
 Familia **Jacanidae** Stejneger, 1885
 Género **Jacana** Brisson, 1760

Jacana jacana Jacana - Gallito de agua
J.j. jacana (Linné), 1766: ("In America australi" = Surinam; por designación de Berlepsch, 1908:304).

Familia **Rostratulidae** (Ridgway), 1919
 Género **Nycticryphes** Wetmore & Peters, 1923
Nycticryphes semicollaris Becasina pintada
 Especie monotípica; *N. semicollaris* (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Superfamilia **Charadrioidea** (Amer. Ornithologists' Union, 1931)
 Familia **Haematopodidae** (Gray), 1840
 Género **Haematopus** Linné, 1758

Haematopus palliatus Ostrero común
H.p. palliatus (Temminck), 1820: (Brasil).
Haematopus ater Ostrero negro
 Especie monotípica; *H. ater* Vieillot & Oudart, 1825: (Estrecho de Magallanes).

Familia **Recurvirostridae** Bonaparte, 1854

Género **Himantopus** Brisson, 1760

Himantopus mexicanus (Müller), 1776 Tero real
H.m. melanurus Vieillot, 1817: (Paraguay).

Familia **Charadriidae** (Vigors), 1825

Subfamilia **Vanellinae** Blyth, 1849

Género **Vanellus** Brisson, 1760

Vanellus chilensis (1) Molina, 1782 Tero común
V.ch. lampronotus (Wagler), 1827: (Sur del Brasil).

Subfamilia **Charadriinae** (Vigors), 1825

Género **Charadrius** Linné, 1758

Charadrius collaris Chorlito de collar
Especie monotípica; *Ch. collaris* Vieillot, 1818: (Paraguay).

Charadrius falklandicus Chorlo de doble collar
Ch.f. falklandicus Latham, 1790: (Puerto Egmont, Islas Malvinas).

Charadrius modestus Chorlo de pecho tostado
Especie monotípica; *Ch. modestus* Lichtenstein, 1823: (Montevideo, Uruguay).

Género **Pluvialis** Brisson, 1760

Pluvialis dominica Chorlo pampa
P.d. dominica (P.L.S. Müller), 1776: ("Hispaniola" = Santo Domingo, Rep. Dominicana).

Pluvialis squatarola Chorlo blanco
Especie monotípica; *P. squatarola* (Linné), 1758: (Suecia; según Phelps & Phelps, 1958:97).

Género **Eudromias** Brehm, 1830

- Eudromias ruficollis** Chorlo canela
 Especie monotípica; *E. ruficollis* (Wagler), 1829: (Canelones, Uruguay).

Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Tringinae** Gray, 1840

Tribu **Numeniini**

Género **Limosa** Brisson, 1760

- Limosa haemastica** Becasina de mar
 Especie monotípica; *L. haemastica* (Linné), 1758: (Bahía de Hudson, Estados Unidos).

Género **Numenius** Brisson, 1760

- Numenius borealis** (1) Chorlo polar
 Especie monotípica; *N. borealis* (I.R. Forster), 1772: (Fort Albany, Bahía de Hudson, Estados Unidos).

Género **Bartramia** Lesson, 1760

- Bartramia longicauda** Batitú
 Especie monotípica; *B. longicauda* (Bechstein), 1812: (Norteamérica).

Tribu **Tringini**

Género **Tringa** Linné, 1758

- Tringa solitaria** Chorlito solitario
T.s. solitaria Wilson, 1813: (Pennsylvania, Kentucky y N. York, Estados Unidos).

T.s. cinnamomea (Brewster), 1890: (San José del Cabo, Baja California).

Tringa flavipes Chorlo menor de patas amarillas
Especie monotípica; *T. flavipes* (Gmelin), 1789: (N. York, Estados Unidos).

Tringa melanoleuca Chorlo mayor de patas amarillas
Especie monotípica; *T. melanoleuca* (Gmelin), 1789: (Labrador, Canadá).

Género **Actitis** Illiger, 1811

Actitis macularia Chorlito manchado
Especie monotípica; *A. macularia* (Linné), 1766: (Pennsylvania, Estados Unidos).

Subfamilia **Arenariinae** Stejneger, 1885
Género **Arenaria** Brisson, 1760

Arenaria interpres (Linné), 1758 Revuelvepiedras
A.i. morinella (Linné), 1766: (Costas de Georgia, Estados Unidos).

Subfamilia **Phalaropodinae** Bonaparte, 1831
Género **Phalaropus** Brisson, 1760

Phalaropus tricolor Chorlo blanco nadador
Especie monotípica; *Ph. tricolor* Vieillot, 1819: (Paraguay).

Subfamilia **Gallinagoninae** Jehl, 1968
Género **Gallinago** Koch, 1816

Gallinago gallinago (Linné), 1758 Becasina común
G.g. paraguaiae (Vieillot), 1816: (Paraguay).
G.g. magellanica (King), 1828: (Estrecho de Magallanes).

Subfamilia **Calidridinae** (Reichenbach), 1849
Género **Calidris** Merrem, 1804

Calidris canutus (Linné), 1758 Chorlo rojizo
C.c. rufus (Wilson), 1813: (Nueva Jersey; según Hellmayr & Conover, 1948:166).

Calidris bairdii Chorlito unicolor
 Especie monotípica; *C. bairdii* (Coues), 1861: (Lago Esclavos, Canadá).

Calidris fuscicollis Chorlito de rabadilla blanca
 Especie monotípica; *C. fuscicollis* (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Calidris melanotos Chorlo de pecho gris
 Especie monotípica; *C. melanotos* (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Calidris alba Chorlito blanco
 Especie monotípica; *C. alba* (Pallas), 1764: (Costas del Mar del Norte).

Género **Micropalama** Baird, 1858

Micropalama himantopus Chorlo semipalmado de pico largo
 Especie monotípica; *M. himantopus* (Bonaparte), 1826: (N. Jersey, Estados Unidos).

Género **Tryngites** Cabanis, 1856

Tryngites subruficollis Chorlito acanelado
 Especie monotípica; *T. subruficollis* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Superfamilia **Chionidoidea** Peters, 1934

Familia **Thinocoridae** (Gray), 1845

Género **Thinocorus** Eschscholtz, 1829

Thinocorus rumicivorus Chorlo agachón
T.r. rumicivorus Eschscholtz, 1829: (Bahía de Concepción, Chile).

Familia **Chionididae** Bonaparte, 1832

Género **Chionis** Forster, 1788

Chionis alba Paloma de mar
 Especie monotípica; *Ch. alba* (Gmelin), 1789: (Nueva Zelanda).

Suborden **LARI** Sharpe, 1891

Familia **Laridae** Vigors, 1825

Subfamilia **Stercorariinae** Gray, 1871

Género **Stercorarius** Brisson, 1760

Stercorarius skua (Brünnich), 1764 Gaviota parda

S.s. antarctica(1) (Lesson), 1831: (Islas Malvinas).

S.s. chilensis Bonaparte, 1857: (Chile).

Stercorarius pomarinus Gaviota de rapiña pomarina

Especie monotípica; *S. pomarinus* (Temminck), 1815: (Regiones árticas de Europa).

Stercorarius parasiticus Gaviota salteadora chica

Especie monotípica; *S. parasiticus* (Linné), 1758: (Costas de Suecia).

Stercorarius longicaudus Gaviota salteadora de cola larga

Especie monotípica; *S. longicaudus* Vieillot, 1819: (Norte de Europa).

Subfamilia **Larinae** (Vigors), 1825

Género **Larus** Linné, 1758

Larus belcheri Vigors, 1829 Gaviota de cola negra

L.b. atlanticus Olrog, 1958: (Puerto de Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina).

Larus dominicanus Gaviota cocinera

L.d. dominicanus Lichtenstein, 1823: (Costas del Brasil).

Larus maculipennis Gaviota de capucho café

Especie monotípica; *L. maculipennis* Lichtenstein, 1823: (Montevideo, Uruguay).

Subfamilia **Sterninae** Bonaparte, 1838

Género **Chlidonias**(2) Rafinesque, 1822

Chlidonias niger (Linné), 1758 Gaviotín negro

Ch.n. surinamensis (Gmelin), 1789: (Surinam).

Género **Phaetusa** Wagler, 1832

- Phaetusa simplex** Atí - Gaviotín de pico grueso
 Especie monotípica; *P. simplex* (Gmelin), 1789: (Cayena).

Género **Gelochelidon** Brehm, 1830

- Gelochelidon nilotica** Gmelin, 1789 Gaviotín de pico negro
G.n. grönvoldi Mathews, 1912: (Sudamérica).

Género **Sterna** Linné, 1758

- Sterna hirundinacea** Gaviotín común
 Especie monotípica; *S. hirundinacea* Lesson, 1831: (Santa Catharina, costas del Brasil).

- Sterna hirundo** Golondrina de mar
S.h. hirundo Linné, 1758: (Europa; localidad típica restringida a Suecia).

- Sterna paradisaea** Gaviotín ártico
 Especie monotípica; *S. paradisaea* Pontoppidan, 1763: (Sin localidad típica indicada = Christiansoe, Dinamarca, según Olrog, 1978: 106).

- Sterna vittata** Gmelin, 1789 Gaviotín antártico
S.v. georgiae Reichenow, 1904: (Georgia del Sur).
S.v. gaini (3) Murphy, 1938: (Isla Decepción, Shetland del Sur).

- Sterna trudeaui** Gaviotín de antifaz negro
 Especie monotípica; *S. trudeaui* Audubon, 1838: (Nueva Jersey, Estados Unidos).

- Sterna superciliaris** Gaviotín de cejas blancas
 Especie monotípica; *S. superciliaris* Vieillot, 1819: (Paraguay).

- Sterna maxima** Gaviotín real
S.m. maxima Boddaert, 1783: (Cayena).

Sterna eurygnatha (5) Gaviotín del Brasil
Especie monotípica; *S. eurygnatha* Saunders, 1876: (Santa Catharina, Brasil).

Subfamilia **Rynchopinae** (Bonaparte), 1852
Género **Rynchops** Linné, 1758

Rynchops niger Linné, 1758 Rayador – Cortamar
R.n. intercedens Saunders, 1895: (São Paulo, Brasil).

Orden **COLUMBIFORMES** (Latham), 1790

Suborden **COLUMBAE** Latham, 1790

Familia **Columbidae** (Illiger), 1811

Subfamilia **Columbinæ** (Illiger), 1811

Género **Columba** Linné, 1758

Columba livia Paloma doméstica*

C.l. livia Gmelin, 1789: (Sin localidad típica indicada = Sur de Europa).

Columba picazuro Paloma grande de monte
P.p. picazuro Temminck, 1813: (Paraguay).

Columba maculosa Paloma de alas manchadas

C.m. maculosa Temminck, 1813: (Paraguay).

Columba cayennensis Bonnaterre, 1792 Paloma colorada

C.c. sylvestris Vieillot, 1818: (Paraguay).

Género **Zenaida** Bonaparte, 1838

Zenaida auriculata (Des Murs), 1847 Torcaza común

Z.a. chrysauchenia (Reichenbach), 1847: (Brasil meridional, según Hellmayr & Conover, 1942(1):485).

* Especies introducidas en el Uruguay.

Género **Columbina** Spix, 1825

- Columbina picui** Torcacita común
C.p. picui Temminck, 1813: (Paraguay).
- Columbina talpacoti** Torcacita rojiza
C.t. talpacoti Temminck, 1811: (Bahía; localidad típica sugerida por Pinto, 1938:163).

Género **Leptotila** Swainson, 1837

- Leptotila verreauxi** Bonaparte, 1855 Paloma de axilas rojas
L.v. chloruchenia Giglioli & Salvadori, 1870: (Estancia Trinidad, cerca de Montevideo, Uruguay).
- Leptotila rufaxilla** (Richard & Bernard), 1792 Paloma de axilas rojas y frente gris
L.r. reichenbachii Pelzeln, 1870: (Ipanema, São Paulo, Brasil).

Orden **PSITTACIFORMES** (Wagler), 1830Familia **Psittacidae** (Illiger), 1811Subfamilia **Arinae** (Gray), 1840Género **Aratinga** Spix, 1824

- Aratinga leucophthalmus** Maracaná
A.l. leucophthalmus (P.L.S. Müller), 1776: (Guayanas).

Género **Cyanoliseus** Bonaparte, 1854

- Cyanoliseus patagonus**(1) Loro barranquero
C.p. patagonus (Vieillot), 1817: (Buenos Aires, Argentina).

Género **Pyrrhura** Bonaparte, 1856

- Pyrrhura frontalis** Vieillot, 1817 Chiripepe
P.f. chiripepe (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Myiopsitta** Bonaparte, 1854

Myiopsitta monachus Cotorra común
M.m. monachus (Boddaert), 1783: (Montevideo, Uruguay).

Orden **CUCULIFORMES** (Wagler), 1830Suborden **CUCULI** Wagler, 1830Familia **Cuculidae** Vigors, 1825Subfamilia **Coccyzinae** Swainson, 1837Género **Coccyzus** Vieillot, 1816

Coccyzus cinereus Cuclillo de ojo colorado
 Especie monotípica; *C. cinereus* Vieillot, 1817: (Paraguay).

Coccyzus americanus Cuclillo de pico amarillo
C.a. americanus (Linné), 1758: (Carolina del Sur, Estados Unidos).

Coccyzus melacoryphus Cuclillo de pico negro
 Especie monotípica; *C. melacoryphus* Vieillot, 1817: (Paraguay).

Género **Piaya** Lesson 1830

Piaya cayana (Linné), 1766 Urraca canela
P.c. macroura Gambel, 1849: (Surinam; error = Paraguay).

Subfamilia **Crotophaginae** Swainson, 1837Género **Crotophaga** Linné, 1758

Crotophaga major Pirincho negro grande
 Especie monotípica; *C. major* Gmelin, 1788: (Cayena).

Crotophaga ani Pirincho negro chico
 Especie monotípica; *C. ani* Linné, 1758: (América, África = Jamaica; según Peters, 1940:57).

Género **Guira** Lesson, 1788

Guira guira Pirincho común
 Especie monotípica; *G. guira* (Gmelin), 1788: (Noreste del Brasil).

Subfamilia **Geococcyginae** Reichenow, 1882
 Género **Tapera** Thunberg, 1819

Tapera naevia (Linné), 1766 Crespín
T.n. chochi (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Orden **STRIGIFORMES** (Wagler), 1830
 Familia **Tytonidae** Ridgway, 1914
 Género **Tyto** Billberg, 1828

Tyto alba (Scopoli), 1769 Lechuzón de campanario
T.a. tuidara (J. F. Gray), 1829: (São Paulo, Brasil; según Berlepsch, 1908:288).

Familia **Strigidae** Vigors, 1825
 Subfamilia **Buboninae** (Vigors), 1825
 Género **Otus** Pennant, 1769

Otus choliba Tamborcito común
O.ch. choliba(1) (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Otus atricapillus (Temminck), 1822 Tamborcito grande
O.a. sanctaecatarinae(2) (Salvin), 1897: (Santa Catarina, sureste del Brasil, según Warren, 1966:260).

Género **Bubo** Duméril, 1806

Bubo virginianus (Gmelin), 1788 Ñacurutú
B.v. nacurutu (Vieillot), 1817: (Orillas del Río de la Plata = alrededores de Buenos Aires: localidad típica sugerida por Steullet & Deautier, 1935-46:809).

Género **Glaucidium** Boie, 1826

Glaucidium brasiliense Caburé
G.b. brasiliense (Gmelin), 1788: (Brasil = Ceará; localidad típica sugerida por Hellmayr, 1929:407).

Género **Athene** Boie, 1822

- Athene cunicularia**(3) (Molina), 1782 Lechuza común
A.c. partridge Olrog, 1976: (Ituzaingó, Prov. de Corrientes, Arg.).
A.c. grallaria (Temminck), 1822: (Brasil = Faxina, sur de São Paulo; según Hellmayr, 1929:405).

Subfamilia **Striginae** (Vigors), 1825Género **Asio** Brisson, 1760

- Asio clamator**(4) (Vieillot), 1807 Lechuzón
A.c. midas (Schlegel), 1862: (Montevideo, Uruguay).
Asio flammeus (Pontoppidan), 1763 Lechuzón de pajonal
A.f. suinda (Vieillot), 1817: (Paraguay a los 27° lat. sur).

Género **Aegolius** Kaup, 1829

- Aegolius harrisii** (Cassin), 1849 Lechucita canela
A.h. iheringi Sharpe, 1899: (São Paulo, Brasil).

Orden **CAPRIMULGIFORMES** (Ridgway), 1881

- Familia **Nyctibiidae** (Bonaparte), 1853
Género **Nyctibius** Vieillot, 1816

- Nyctibius griseus** (Gmelin), 1789 Urutáu
N.g. cornutus (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Familia **Caprimulgidae** Vigors, 1825

- Subfamilia **Chordeilinae** (Bonaparte), 1853
Género **Chordeiles** Swainson, 1831 (1832)

- Chordeiles minor** (Forster), 1771 Añapero
Ch.m. chapmani Coues, 1888: (Gainesville, Florida, Est. Unidos).