

Género **Podager** Wagler, 1832

**Podager nacunda** ..... Dormilón de vientre blanco  
*P.n. nacunda* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Subfamilia **Caprimulginae** (Vigors), 1825Género **Caprimulgus** Linné, 1758

**Caprimulgus longirostris** Bonaparte, 1825 ..... Dormilón  
*C.l. patagonicus* Olrog, 1962: (Estancia El Tranquito, 300 Km. al  
 oeste de Puerto San Julián, Santa Cruz, Argentina).

**Caprimulgus parvulus** ..... Dormilón chico  
*C.p. parvulus* Gould, 1837: (Sin localidad típica indicada = cerca  
 de Santa Fé, Argentina; según Hellmayr, 1929: 403).

Género **Hydropsalis** Wagler, 1832

**Hydropsalis brasiliana** (Gmelin), 1789 .... Dormilón de cola larga  
*H.b. furcifera* (Vieillot), 1817: (Paraguay) = alrededores de Asun-  
 ción; localidad típica propuesta por Steullet & Deautier, 1935-46:  
 862).

Orden **APODIFORMES** Peters, 1940Familia **Apodidae** (Hartert), 1897Subfamilia **Cypseloidinae**(1) (Bonaparte), 1838Género **Streptoprocne** Oberholser, 1906

**Streptoprocne zonaris** ..... Vencejo de collar  
*S.z. zonaris* (Shaw), 1876: (Sin localidad típica indicada = Chapa-  
 da, Matto Grosso, Brasil; según Chapman, 1914:234). Cf. Pinto,  
 1938:245.

Orden **TROCHILIFORMES** (Wagler), 1830

Familia **Trochilidae** Vigors, 1825

Género **Melanotrochilus** Deslongchamps, 1880

**Melanotrochilus fuscus** ..... Picaflor negro  
Especie monotípica; *M. fuscus* (Vieillot), 1817: (Brasil = Bahía, localidad típica sugerida por Pinto, 1938:256).

Género **Chlorostilbon** Gould, 1853

**Chlorostilbon lucidus** ..... Picaflor común  
*Ch.l. lucidus* (Shaw), 1811: (Paraguay).

Género **Hylocharis** Boie, 1831

**Hylocharis chrysur** ..... Picaflor bronceado  
*H.ch. chrysur* (Shaw), 1812: (Paraguay).

Género **Leucochloris** Reichenbach, 1854

**Leucochloris albicollis** ..... Picaflor de garganta blanca  
Especie monotípica; *L. albicollis* (Vieillot), 1818: (Brasil - Río de Janeiro; según Pinto, 1978: 205 - 206).

Género **Heliomaster** Bonaparte, 1850

**Heliomaster furcifer** ..... Picaflor de garganta rojiza  
Especie monotípica; *H. furcifer* (Shaw), 1812: (Paraguay).

Orden **CORACIIFORMES** Forbes, 1884

Suborden **HALCIONES** (1) Forbes, 1884

Familia **Alcyonidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Cerylinae** Wetmore & Miller, 1926

Género **Ceryle** Boie, 1828

**Ceryle torquata** ..... Martín pescador grande  
*C.t. torquata* (Linné), 1766: (México).

Género **Chloroceryle** Kaup, 1848

**Chloroceryle amazona** ..... Martín pescador mediano  
*Ch.a. amazona* (Latham), 1790: (Cayena).

**Chloroceryle americana** ..... Martín pescador chico  
*Ch.a. mathewsii* Laubmann, 1927: (Paraguay).

Orden **PICIFORMES** (Meyer & Wolf), 1810

Suborden **PICI** Meyer & Wolf, 1810

Familia **Picidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Picumninae** Gray, 1840

Tribu **Picumnini**

Género **Picumnus** Temminck, 1825

**Picumnus nebulosus** ..... Carpintero enano  
 Especie monotípica; *P. nebulosus* Sundevall, 1866: ("América Merid." = Sur del Brasil, localidad típica restringida por Gyldenstolpe, 1926:77).

Subfamilia **Picinae** (Vigors), 1825

Tribu **Melanerpini**

Género **Melanerpes** Swainson, 1831 (1832)

**Melanerpes candidus** ..... Carpintero blanco  
 Especie monotípica; *M. candidus* (Otto), 1796: (Cayena; no se sabe que viva allí en la actualidad, Peters, 1940:167).

Tribu **Campetherini**

Género **Picoides** Lacépède, 1799

**Picoides mixtus** ..... Carpintero chorreado  
*P.m. mixtus* (Boddaert), 1783: ("Encenada" = Buenos Aires, Argentina, según Hellmayr, 1915:212) Cf. Peters, 1948:214.

Tribu **Colaptini**Género **Veniliornis** Bonaparte, 1854

**Veniliornis spilogaster** ..... Carpintero manchado  
Especie monotípica; *V. spilogaster* (Wagler), 1827: (Brasil y Paraguay; Pinto, 1938:356, sugiere a São Paulo como localidad típica).

Género **Colaptes** Vigors, 1826

**Colaptes campestris**(Vieillot), 1818 ..... Carpintero de campo  
*C.c. campestroides* (Malherbe), 1849: (Sur del Brasil; localidad típica propuesta por Pinto, 1938:336).

**Colaptes melanochloros**(Gmelin), 1789 ... Carpintero de nuca roja  
*C.m. leucofrenatus* Leybold, 1873: (Estancia Aguirre, cerca de San Carlos, Mendoza, Argentina).

Tribu **Campephilini**Género **Campephilus** Gray, 1840

**Campephilus leucopogon** ..... Carpintero negro de cabeza roja  
Especie monotípica;(1) *C. leucopogon* (Valenciennes), 1826: (Brasil)

Orden **PASSERIFORMES** (Linné), 1758Suborden **EURYLAIMI** (1) (Seebohm), 1890Superfamilia **Furnarioidea** Wetmore, 1934Familia **Furnariidae** (Gray), 1840Subfamilia **Furnariinae** Gray, 1840Género **Geositta** Swainson, 1837

**Geositta cunicularia** ..... Corre-caminos  
*G.c. cunicularia* (Vieillot), 1816: (Cercanías del Río de la Plata y Pampas de Buenos Aires).

Género **Cinclodes** Gray, 1840

**Cinclodes fuscus** ..... Meneacola  
*C.f. fuscus* (Vieillot), 1818: (Campos de Montevideo y Bs. Aires).

Género **Furnarius** Vieillot, 1816

**Furnarius rufus** ..... Hornero  
*F.r. rufus* (Gmelin), 1788: (Buenos Aires, Argentina).

Subfamilia **Synallaxinae** Gray, 1846Género **Leptasthenura** Reichenbach, 1853

**Leptasthenura platensis** ..... Coludito copetón  
 Especie monotípica; *L. platensis* Reichenbach, 1853: (Río de la Plata).

Género **Synallaxis** Vieillot, 1818

**Synallaxis (Schoeniophylax) phriganophyla** ..... Chotoy  
*S.(S)p. phriganophyla* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

**Synallaxis frontalis** ..... Coludito de frente parda  
*S.f. frontalis* Pelzeln, 1859: (Brasil = Río San Francisco, Bahía) Cf. Olrog, 1978:176.

**Synallaxis spixi** ..... Coludito de boina roja  
 Especie monotípica; *S. spixi* Sclater, 1856 (Brasil = São Paulo, según Peters, 1951:84).

**Synallaxis cinerascens** ..... Coludito plumizo  
 Especie monotípica; *S. cinerascens* Temminck, 1823 ("Brésil" = Ipanema, São Paulo).

Género **Certhya** Lesson, 1844

**Certhya pyrrhophia** ..... Trepadorcito  
*C.p. pyrrhophia* (Vieillot), 1818: (Paraguay).

**Certhya sulphurifera** ..... Coludito de garganta amarilla  
 Especie monotípica; *C. sulphurifera* (Burmeister), 1868: (Cerca de Buenos Aires, Argentina).

**Certhya cinnamomea** (Gmelin), 1788 . . . . . Coludito rojizo  
*C. c. russeola* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Thripophaga** Cabanis, 1847

**Thripophaga pyrrholeuca** . . . . . Canastero chico  
*T. p. pyrrholeuca* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

**Thripophaga baeri** . . . . . Canastero de garganta castaña  
*T. b. baeri* (Berlepsch), 1906: (Cosquín, Córdoba, Argentina).

**Thripophaga hudsoni** . . . . . Canastero listado  
 Especie monotípica; *T. hudsoni* (Sclater), 1874: (Conchitas, Prov. de Buenos Aires, Argentina).

Género **Phacellodomus** Reichenbach, 1853

**Phacellodomus sibilatrix** . . . . . Espinero chico  
 Especie monotípica; *Ph. sibilatrix* Sclater, 1879: (Córdoba, Argentina).

**Phacellodomus striaticollis** . . . . . Tío-tío  
*Ph. s. striaticollis* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838: (Buenos Aires, Argentina).

Género **Spartonoica** Peters, 1950

**Spartonoica maluroides** . . . . . Canastero enano  
 Especie monotípica; *S. maluroides* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837: (Buenos Aires, Argentina).

Género **Phleocryptes** Cabanis & Heine, 1859

**Phleocryptes melanops** . . . . . Junquero  
*Ph. m. melanops* Vieillot, 1817: (Paraguay).

Género **Limnornis** Gould, 1839

**Limnornis curvirostris** ..... Pajera de pico curvo  
Especie monotípica; *L. curvirostris* Gould, 1839: (Maldonado, Uruguay).

**Limnornis rectirostris** ..... Pajera de pico recto  
Especie monotípica; *L. rectirostris* Gould, 1839: (Maldonado, Uruguay).

Género **Anumbius** Lafresnaye & d'Orbigny, 1838

**Anumbius annumbi** ..... Espinero común  
*A.a. annumbi* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Coryphistera** Burmeister, 1860

**Coryphistera alaudina** ..... Copetón  
*C.a. alaudina* Burmeister, 1860: (Argentina).

Subfamilia **Philydorinae** Sclater, 1890Género **Lochmias** Swainson, 1827

**Lochmias nematura** ..... Macuquiño  
*L.n. nematura* (Lichtenstein), 1823: (São Paulo, Brasil).

Género **Pseudoseisura** Reichenbach, 1853

**Pseudoseisura lophotes** (Reichenbach), 1853 ..... Caserote  
*P.l. argentina* Parkes, 1960: (La Cocha, Tucumán, Argentina).

Género **Philydor** Spix, 1824

**Philydor rufosuperciliatus** (Lafresnaye), 1832 ... Trepador chorreado  
*Ph.r. acritus* (Oberholser), 1901: (Sapucay, Paraguay).

Familia **Dendrocolaptidae** (Gray), 1840Género **Drymornis** Eyton, 1852

**Drymornis bridgesii** ..... Arañero grande  
 Especie monotípica; *D. bridgesii* (Eyton), 1849: (Interior de Bolivia; error = Mendoza, Argentina, según Hellmayr, 1925:349).

Género **Lepidocolaptes** Reichenbach, 1853

**Lepidocolaptes angustirostris** (Vieillot), 1818 ..... Arañero chico  
*L.a. praedatus* (Cherrie), 1916: (Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina).

Familia **Formicariidae** (1) (Gray), 1840Subfamilia **Thamnophilinae** (Vigors), 1825Género **Thamnophilus** Vieillot, 1816

**Thamnophilus caeruleus** Vieillot, 1816 ..... Curruca azulada  
*T.c. gilviger* Pelzelin, 1868 (1869): Curitiba, Paraná, Brasil).

**Thamnophilus ruficapillus** ..... Curruca bataráz  
*T.r. ruficapillus* Vieillot, 1816: (Sin localidad típica indicada; Corrientes, Argentina, según Hellmayr, 1924:108).

Superfamilia **Tyrannoidea** Stejneger, 1885Familia **Tyrannidae** (Vigors), 1825Subfamilia **Elaeniinae** (Cabanis & Heine), 1859Género **Camptostoma** Sclater, 1857

**Camptostoma obsoletum** ..... Piojito  
*C.o. obsoletum* (Temminck), 1824: (Curitiba, Brasil; según Hellmayr, 1908:43).

Género **Sublegatus** Sclater & Salvin, 1868

**Sublegatus modestus** (Wied), 1831 ..... Viudita gris  
*S.m. brevirostris* (d'Orbigny & Lafresnaye), 1837: (Corrientes, Argentina).



Género **Suiriri** d'Orbigny, 1839

- Suiriri suiriri** ..... Suiriri  
**S.s. suiriri** (Vieillot), 1818: (Paraguay; localidad típica restringida a Puerto Pinasco por Zimmer, 1955:18).

Género **Elaenia** Sundevall, 1835

- Elaenia albiceps** (Lafresnaye & d'Orbigny), 1837 . . . . Viudita chilena  
**E.a. chilensis** Hellmayr, 1927: (Curacautín, Malleco, Chile).
- Elaenia parvirostris** ..... Viudita de pico corto  
 Especie monotípica; **E. parvirostris** Pelzeln, 1868: (Curitiba, Paraná, Brasil).

Género **Serpophaga** Gould, 1839

- Serpophaga subcristata** ..... Tiqui-tiqui  
**S.s. straminea** (Temminck), 1822: (Ipanema, São Paulo, Brasil).
- Serpophaga munda** ..... Tiqui-tiqui de vientre blanco  
 Especie monotípica; **S. munda** (Berlepsch), 1893: (Samaipata, Valle Grande, Bolivia).
- Serpophaga nigricans** ..... Tiqui-tiqui oscuro  
 Especie monotípica; **S. nigricans** (Vieillot), 1817: (Paraguay; localidad típica, según Pinto, 1944:261 y Río de La Plata).

Género **Tachuris** Lafrenaye, 1836

- Tachuris rubrigastra** ..... Siete colores de laguna  
**T.r. rubrigastra** (Vieillot), 1817: (Paraguay; localidad típica según Pinto, 1944:256 y Buenos Aires).

Género **Polystictus** Reichenbach, 1850

- Polystictus pectoralis** ..... Tachuri  
**P.p. pectoralis** (Vieillot), 1817: (Paraguay).