

Género **Ammodramus** Swainson, 1827

Ammodramus humeralis (Bosc), 1792 Chingolo de tierra
A.h. xanthornus Darwin, 1839: (Maldonado, Uruguay).

Género **Donacospiza** Cabanis, 1851

Donacospiza albifrons Pajerita de cabeza gris
 Especie monotípica; *D. albifrons* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Poospiza** Cabanis, 1847

Poospiza nigrorufa Siete vestidos
P.n. nigrorufa (Lafresnaye & d'Orbigny), 1837: (Paraguay; localidad
 típica Río de La Plata y Santa Fé, Argentina).

Poospiza lateralis (Nordmann), 1835 Monterita de rabadilla roja
P.l. cabanisi Bonaparte, 1850: (Paraguay; Bonpland, Misiones, Ar-
 gentina; según Hellmayr, 1938:629).

Poospiza cinerea Bonaparte, 1851 Monterita de cabeza negra
P.c. melanoleuca (d'Orbigny & Lafresnaye), 1837: (Chiquitos, Boli-
 via).

Género **Sicalis** Boie, 1828

Sicalis flaveola (Linné), 1766 Dorado
S.f. pelzelni Sclater, 1872: (Buenos Aires, Argentina, según Hell-
 mayr, 1938:325).

Sicalis luteola (Sparrman), 1789 Misto
S.l. luteiventris (Meyen), 1834: (Prox. de Api, Altos de Toledo, su-
 deste del Perú).

Género **Embernagra** Lesson, 1831

Embernagra platensis Pajonalero
E.p. platensis (Gmelin), 1789: (Buenos Aires, Argentina).

Género **Volatinia** Reichenbach, 1850

Volatinia jacarina Sierra-sierra
V.j. jacarina (Linné), 1766: (Nordeste del Brasil).

Género **Sporophila** Cabanis, 1844

Sporophila collaris (Boddaert), 1783 Gargantillo de collar
S.c. melanocephala (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Sporophila caerulescens Gargantillo común
S.c. caerulescens (Vieillot), 1823: ("Brésil" = alrededores de Río de Janeiro, según Pinto, 1944:619).

Sporophila ruficollis Corbatita castaña
 Especie monotípica; *S. ruficollis* Cabanis, 1851: ("Montevideo" = Uruguay, localidad típica dudosa, según Hellmayr, 1938:219).

Sporophila palustris Corbatita de bañados
 Especie monotípica; *S. palustris* (Barrows), 1883: (Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina).

Género **Saltatricula** Burmeister, 1861

Saltatricula multicolor Manchadito
 Especie monotípica; *S. multicolor* (Burmeister), 1860: (Paraná, Entre Ríos, Argentina).

Género **Gubernatrix** Lesson, 1837

Gubernatrix cristata Cardenal amarillo
 Especie monotípica; *G. cristata* (Vieillot), 1817: (Rep. Argentina a los 29° de lat. merid., = Corrientes, localidad típica aceptada por Hellmayr, 1938:56).

Género **Coryphospingus** Cabanis, 1851

Coryphospingus cucullatus (Müller), 1776 Brasita de fuego
C.c. rubescens (Swainson), 1825: ("sent from Río de Janeiro").

Género **Paroaria** Bonaparte, 1831

Paroaria coronata Cardinal de copete rojo
Especie monotípica; *P. coronata* (Miller), 1776: (Sin localidad típica indicada; Río Grande do Sul, extremo sur del Brasil, según Pinto, 1944:602).

Subfamilia **Cardinalinae** Sushkin, 1924

Género **Saltator** Vieillot, 1816

Saltator similis Rey del bosque verdoso
S.s. similis Lafresnaye & d'Orbigny, 1837: (Corrientes, Argentina).

Saltator coerulescens Rey del bosque plumizo
S.c. coerulescens Vieillot, 1817: (Paraguay).

Saltator aurantiirostris Rey del bosque común
S.a. aurantiirostris Vieillot, 1817: (Paraguay; Corrientes, Argentina, localidad típica probable, según Pinto, 1944:595).

Género **Passerina** Vieillot, 1816

Passerina glaucocerulea Azulejo
Especie monotípica; *P. glaucocerulea* (Lafresnaye & d'Orbigny), 1837: (Maldonado, Uruguay).

Passerina brissoni (Lichtenstein), 1823 Reina mora
P.b. sterea (Oberholser), 1901: (Sapucay, Paraguay).

Subfamilia **Thraupinae** Cabanis, 1847

Género **Piranga** Vieillot, 1808

Piranga flava Frutero rojo
P.f. flava (Vieillot), 1822: (Paraguay).

Género **Thraupis** Boie, 1826

Thraupis sayaca Frutero celeste
T.s. sayaca (Linné), 1766: ("in Brasilia" = Pernambuco; localidad típica sugerida por Naumburg, 1924:111). Cf. Pinto, 1944:490.

Thraupis bonariensis Naranjero
T.b. bonariensis (Gmelin), 1789: (Buenos Aires, Argentina).

Género **Stephanophorus** Strikland, 1841

Stephanophorus diadematus Cardenal azul
 Especie monotípica; *S. diadematus* (Temminck), 1823: ("Brésil = Curitiba, Estado de Paraná, localidad típica, según Pinto 1944:485).

Género **Pipraeidea** Swainson, 1827

Pipraeidea melanonota Viuva
P.m. melanonota (1) (Vieillot), 1819: ("Brésil" = Río de Janeiro, según Hellmayr, 1936:77).

Género **Tangara** Brisson, 1760

Tangara preciosa Tangará preciosa
 Especie monotípica; *T. preciosa* (Cabanis), 1850: (Río Grande do Sul, Brasil).

Familia **Coerebidae** (1) Gray, 1840

Género **Parula** Bonaparte, 1838

Parula americana (Linné), 1758 Pitiayumi
P.a. pitiayumi (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Dendroica** Gray, 1842

Dendroica striata Mosquitero norteamericano
 Especie monotípica; *D. striata* (Forster), 1772: (Río Severn = Fortín Severn, Costa Occidental de la Bahía de Hudson, Canadá).

Género **Geothlypis** Cabanis, 1847

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin), 1789 . . . Mosquitero amarillo
G.a. velata (Vieillot), 1807: (Río de Janeiro, Brasil).

Género **Basileuterus** Cabanis, 1849

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) Mosquitero chico
B.c. azarae Zimmer, 1949: (Sapucay, Paraguay).

Basileuterus leucoblepharus Mosquitero oliváceo
B.l. leucoblepharus Vieillot, 1817: (Paraguay).
B.l. lemurum (2) Olson, 1975: (Cerro de las Animas, Maldonado, Uruguay).

Familia **Vireonidae** (Swainson), 1837Subfamilia **Cyclarhinae** Blake, 1968Género **Cyclarhis** Swainson, 1826

Cyclarhis gujanensis (Gmelin), 1789 Juan Chiviro
C.g. ochrocephala Tschudi, 1845: (Sur del Brasil y Buenos Aires).

Subfamilia **Vireoninae** Cabanis, 1847Género **Vireo** Vieillot, 1808

Vireo olivaceus (Linné), 1766 Chivi-chivi
V.o. diversus Zimmer, 1941: (Roca Nova, Paraná, Brasil).

Familia **Icteridae** (1) (Vigors), 1825Subfamilia **Icterinae** Swainson, 1832Género **Cacicus** Lacépède, 1799

Cacicus chrysopterus Boyero de alas amarillas
Especie monotípica; *C. chrysopterus* (Vigors), 1825: (Brasil).

Cacicus solitarius Boyero
Especie monotípica; *C. solitarius* (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Género **Icterus** Brisson, 1760

Icterus cayennensis (Linné), 1766 Tordo de cobijas canela
I.c. pyrrhopterus (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Género **Agelaius** Vieillot, 1816

Agelaius flavus Tordo de cabeza amarilla
Especie monotípica; *A. flavus* (Gmelin), 1788: (Río de La Plata, localidad típica propuesta por Hellmayr, 1937:184).

Agelaius thilius (Molina), 1782 Alferez
A. t. petersii Laubmann, 1934: (Saladillo, frontera entre Santa Fé y Santiago del Estero, Argentina).

Agelaius ruficapillus Tordo de cabeza canela
A. r. ruficapillus Vieillot, 1819: (Paraguay).

Género **Sturnella** Vieillot, 1816

Sturnella superciliaris Pecho colorado chico
Especie monotípica: *S. superciliaris* (Bonaparte), 1850: ("México", error, Matto Grosso, Brasil, localidad típica propuesta por Berlepsch, 1908: 123).

Sturnella defilippi Pecho colorado grande
Especie monotípica; *S. defilippi* (Bonaparte), 1850: (Montevideo, Uruguay, según Hellmayr, 1937:207).

Género **Pseudoleistes** Sclater, 1862

Pseudoleistes guirahuro Pecho amarillo de la sierra
Especie monotípica; *P. guirahuro* (Vieillot), 1819: (Paraguay y Río de La Plata).

Pseudoleistes virescens Pecho amarillo común
Especie monotípica; *P. virescens* (Vieillot), 1819: ("En los límites con Brasil y cerca de Buenos Aires"; probablemente Uruguay, según Olrog, 1978:293).

Género **Amblyramphus** Leach, 1814

Amblyramphus holosericeus Federal
Especie monotípica; *A. holosericeus* (Scopoli), 1786: ("Antigue, Isl. of Panay, Philippines", error; Delta del Paraná, Argentina, localidad típica propuesta por Dabbene, 1912:372).

Género **Gnorimopsar** Richmond, 1908

Gnorimopsar chopi Mirlo-Charrúa
G.ch. chopi (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Género **Molothrus** Swainson, 1832

Molothrus badius Tordo músico
M.b. badius (Vieillot), 1819: (Paraguay y Río de La Plata).

Molothrus rufoaxillaris Tordo de pico corto
 Especie monotípica; *M. rufoaxillaris* Cassin, 1866: (Buenos Aires, Argentina).

Molothrus bonariensis Tordo común
M.b. bonariensis (Gmelin), 1789: (Buenos Aires, Argentina).

Familia **Fringillidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Carduelinae** (Vigors), 1825

Género **Carduelis** Brisson, 1760

Carduelis chloris (Linné), 1758 Verderón *

Carduelis magellanica Cabecita negra
C.m. magellanica (Vieillot), 1805: (Buenos Aires, Argentina, localidad típica designada por Todd, 1926:61).

Carduelis carduelis (Linné), 1758 Cardelino *

Familia **Passeridae** (Illiger), 1811

Género **Passer** Brisson, 1760

Passer domesticus (1) Gorrión *
P.d. domesticus (Linné), 1758: (Suecia).

Familia **Corvidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Garrulinae** (Boie), 1825

Género **Cyanocorax** Boie, 1826

Cyanocorax chrysops Urraca azul

C.ch. chrysops (Vieillot), 1818: (Paraguay).

Cyanocorax cyanomelas Urraca morada

Especie monotípica; *C. cyanomelas* (Vieillot), 1818: (Paraguay).

**ESPECIES CITADAS PARA EL URUGUAY,
CUYA PRESENCIA NECESITA SER CONFIRMADA
CON EL APORTE DE EJEMPLARES OBTENIDOS
EN EL PAIS**

Familia **Podicipedidae**

Tribu **Podilymbini**

Género **Tachybaptus** Reichenbach, 1852

Tachybaptus dominicus (Linné), 1766 Macacito gris
Subespecie posible: (2); *brachyrhynchus* (Chapman), 1899: (Chapada, Matto Grosso, Brasil).

Familia **Diomedidae**

Diomedea exulans (1) Albatros viajero
Subespecie posible: *exulans* Linné, 1758: (Cabo de Buena Esperanza).

Familia **Procellariidae**

Pterodroma lessoni Petrel gris y blanco
Subespecie posible: *lessoni* (Garnot), 1826: (En los pasajes del Cabo de Hornos y del Pacífico, en los 52° lat. y los 85° long.).

Pterodroma incerta Petrel pardo y blanco
Especie monotípica; *P. incerta* (Schlegel), 1863: (Mares Australes; costas de N. Zelandia y Mares de Australia).

Pterodroma mollis Petrel de corona gris
Subespecie posible: *mollis* (Gould), 1844: (Atlántico Sur; desde los 20° hasta los 40° lat. sur).

Familia **Phalacrocoracidae**

Phalacrocorax magellanicus (1) Cormorán de Magallanes
Especie monotípica; *Ph. magellanicus* (Gmelin), 1789: (Tierra del Fuego e Isla de los Estados).

Phalacrocorax atriceps (2) Cormorán imperial
Subespecie posible: *atriceps* King, 1828: (Estrecho de Magallanes).

Familia **Anatidae**Subfamilia **Anatinae**Tribu **Tadornini**Género **Chloëphaga** Eyton, 1838

Chloëphaga picta (Gmelin), 1789 Avutarda
Subespecie posible; *pita* (Gmelin), 1789; (Isla de los Estados).

Género **Sarkidiornis** Eyton, 1838

Sarkidiornis melanotos (Pennant), 1769 Pato crestado
Subespecie posible: *sylicola* Ihering & Ihering, 1907: (Se acepta el noreste del Brasil, como localidad típica).

Familia **Vulturidae**Subfamilia **Vulturinae**Género **Sarcoramphus** Duméril, 1806

Sarcoramphus papa Rey de los Buitres
Especie monotípica (1) *S. papa* (Linné), 1758: ("India occidentalis"
= Surinam, según Berlepsch, 1908:289).

Familia **Accipitridae**Género **Elanoides** Vieillot, 1818

Elanoides forficatus (Linné), 1758 Halcón tijereta
Subespecie posible: *yetapa* (Vieillot), 1818: (Paraguay).

Género **Harpyhaliaetus** Lafrešnaye, 1842

Harpyhaliaetus coronatus Aguila coronada
Especie monotípica; *H. coronatus* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Busarellus** Lafresnaye, 1842

Busarellus nigricollis (Latham), 1790 Aguila de collar negro
Subespecie posible; *leucocephalus* (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Familia **Haematopodidae**

Haematopus palliatus durnfordi Sharpe, 1896: (Desembocadura del
Río Chubut; Tambo Point, Chubut, Argentina).

Familia **Charadriidae**

Charadrius semipalmatus Chorlo simipalmado
Especie monotípica; *Ch. semipalmatus* Bonaparte, 1825: (Costas de
Nueva Jersey).

Familia **Scolopacidae**Subfamilia **Gallinagoninae**

Gallinago undulata (Boddaert), 1783 Becasina grande
Subespecie posible: (2) *gigantea* (Temminck), 1826: (Estado de São
Paulo, Brasil).

Familia **Laridae**Subfamilia **Larinae**

Larus cirrocephalus Gaviota de capucho gris
Subespecie posible: *cirrocephalus* Vieillot, 1818: (Brasil).

Subfamilia **Sterninae**

Sterna sandvicensis Latham, 1887 Gaviotín de pico negro
Subespecie posible: (4) *acuflavida* Cabot, 1847: (Yucatán, México).

Familia **Phalacrocoracidae**

Phalacrocorax magellanicus (1) Cormorán de Magallanes
Especie monotípica; *Ph. magellanicus* (Gmelin), 1789: (Tierra del Fuego e Isla de los Estados).

Phalacrocorax atriceps (2) Cormorán imperial
Subespecie posible: *atriceps* King, 1828: (Estrecho de Magallanes).

Familia **Anatidae**Subfamilia **Anatinae**Tribu **Tadornini**Género **Chloëphaga** Eyton, 1838

Chloëphaga picta (Gmelin), 1789 Avutarda
Subespecie posible; *pita* (Gmelin), 1789; (Isla de los Estados).

Género **Sarkidiornis** Eyton, 1838

Sarkidiornis melanotos (Pennant), 1769 Pato crestado
Subespecie posible: *sylvicola* Ihering & Ihering, 1907: (Se acepta el noreste del Brasil, como localidad típica).

Familia **Vulturidae**Subfamilia **Vulturinae**Género **Sarcoramphus** Duméril, 1806

Sarcoramphus papa Rey de los Buitres
Especie monotípica (1) *S. papa* (Linné), 1758: ("India occidentalis" = Surinam, según Berlepsch, 1908:289).

Familia **Accipitridae**Género **Elanoides** Vieillot, 1818

Elanoides forficatus (Linné), 1758 Halcón tijereta
Subespecie posible: *yetapa* (Vieillot), 1818: (Paraguay).

Género **Harpyhaliaetus** Lafresnaye, 1842

Harpyhaliaetus coronatus Aguila coronada
Especie monotípica; *H. coronatus* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Busarellus** Lafresnaye, 1842

Busarellus nigricollis (Latham), 1790 Aguila de collar negro
Subespecie posible; *leucocephalus* (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Familia **Haematopodidae**

Haematopus palliatus durnfordi Sharpe, 1896: (Desembocadura del
Río Chubut; Tambo Point, Chubut, Argentina).

Familia **Charadriidae**

Charadrius semipalmatus Chorlo simipalmado
Especie monotípica; *Ch. semipalmatus* Bonaparte, 1825: (Costas de
Nueva Jersey).

Familia **Scolopacidae**Subfamilia **Gallinagoninae**

Gallinago undulata (Boddaert), 1783 Becasina grande
Subespecie posible: (2) *gigantea* (Temminck), 1826: (Estado de São
Paulo, Brasil).

Familia **Laridae**Subfamilia **Larinae**

Larus cirrocephalus Gaviota de capucho gris
Subespecie posible: *cirrocephalus* Vieillot, 1818: (Brasil).

Subfamilia **Sterninae**

Sterna sandvicensis Latham, 1887 Gaviotín de pico negro
Subespecie posible: (4) *acuflavida* Cabot, 1847: (Yucatán, México).

Familia **Psittacidae**Género **Anodorynchus** Spix, 1824

Anodorynchus glaucus Guacamayo azul
Especie monotípica; *A. glaucus* (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Aratinga acuticaudata Loro de cabeza azul
Subespecie posible: *acuticaudata* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Amazona** Lesson, 1830 (1831)

Amazona pretrei Loro de cabeza roja
Subespecie posible: *pretrei* (Temminck), 1830: (Sin localidad típica indicada; Río Grande do Sul, según Pinto, 1938:209).

Familia **Caprimulgidae**Género **Eleothreptus** Gray, 1840

Eleothreptus anomalus Dormilón de los pantanos
Especie monotípica; *E. anomalus* (Gould), 1838: (Demerara = São Paulo, Brasil; localidad típica designada por Pinto, 1938:237).

Familia **Trochilidae**Género **Anthracothorax** Boie, 1831

Anthracothorax nigricollis Picaflor de garganta negra
Especie monotípica; *A. nigricollis* (Vieillot), 1817: (Brasil; Belém, Estado de Pará, localidad típica restringida por Zimmer, 1950:7).

Género **Thalurania** Gould, 1848

Thalurania glaucopis Picaflor de corona violeta
Especie monotípica; *T. glaucopis* (Gmelin), 1788: (Brasil).