

MUSEO DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA
Nº 1 — Serie de Divulgación — 1985

JUAN P. CUELLO

**Lista de Referencia
y Bibliografía
de las Aves Uruguayas**

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

Departamento de Cultura

Servicio de Divulgación Científica

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	5
TOTAL DE GENEROS Y ESPECIES DE AVES EN EL URUGUAY ..	11
LISTA DE ESPECIES	17
ESPECIES CITADAS PARA EL URUGUAY, CUYA PRESENCIA NECESITA SER CONFIRMADA CON EL APORTE DE EJEMPLARES OBTENIDOS EN EL PAIS	71
NOTAS ACLARATORIAS Y BIBLIOGRAFIA BASICA	79
BIBLIOGRAFIA GENERAL	91
BIBLIOGRAFIA (REFERENTE A LAS AVES URUGUAYAS)	101

INTRODUCCION

La presente lista y recopilación bibliográfica, ha sido preparada con la única intención de servir como referencia para estudiantes o personas interesadas profesionalmente en el estudio de las aves del país, y muy especialmente para los aficionados, cuyo deseo de conocerlas mejor, es de capital importancia para la conservación de tan singular grupo de seres.

La parte de nomenclatura, incluye el nombre científico de las especies; así como el de las razas o subespecies que ocurren en el Uruguay, el autor y año en que fueron descritas, la localidad típica y el nombre común corrientemente usado.

Con referencia a la información bibliográfica, la misma se compone de tres partes: una bibliografía básica que acompaña las notas aclaratorias sobre los distintos taxa; la bibliografía general, que incluye además de las obras y trabajos citados en el texto, otras muchas referentes a las aves neotropicales, etc. Por último, se enumera la mayoría de los trabajos conocidos acerca de las aves uruguayas en particular.

Según las últimas investigaciones y el correspondiente aporte bibliográfico, el elenco de aves del país, puede situarse en poco más de 400 especies, de las que 42, incluyendo tres subespecies, son listadas aparte en razón de que su presencia necesita ser confirmada.

Aproximadamente el 65% de las especies, son residentes permanentes, casi sin componentes endémicos y por lo tanto comunes a las regiones vecinas del extremo sur del Brasil, sur del Paraguay y norte y este de Argentina. Alrededor del 10% son residentes de verano que nidifican y se retiran durante el invierno a latitudes más septentrionales dentro del hemisferio sur; igual porcentaje está referido a visitantes de verano, que provienen en su mayoría del hemisferio norte; en tanto que un grupo aún más numeroso, corresponde a especies —particularmente aves marinas— que migran desde las zonas antárticas y subantárticas y del extremo sur de nuestro continente.

En cuanto a la distribución de las aves en los distintos ecosistemas y zonas de vida en territorio uruguayo, cabe anotar que Escalante, 1973a y 1983c (Introducción), lo mismo que Escalante & Palerm, 1973, han señalado que algo más de la mitad de las especies, están relacionadas con los ambientes acuáticos; tales como aguas marinas, estuario platense, grandes bañados, lagunas y charcos, cursos de agua dulce y sus desembocaduras, tanto en el Río de la Plata como en el Océano Atlántico. Algo más de 100 especies habitan en zonas de monte indígena, propio de laderas, gargantas o quebradas de los distintos accidentes orográficos, así como también en la vecindad de las numerosas corrientes de agua dulce, islas de monte nativo dispersas en la pradera a las que hay que agregar las zonas de matorral. Por último, la pradera, que ocupa la mayor parte del territorio nacional, sirve de refugio a unas 80 especies.


Durante la preparación de esta lista, hemos recibido ayuda y apoyo bibliográfico personal de Rodolfo Escalante; lo mismo que de Miguel A. Klappenbach, Héctor Osorio y Alvaro Mones (Museo Nacional de Historia Natural) y muy especialmente del personal de biblioteca de la misma Institución; también de Samuel Narosky (Argentina), Pierce Brodkorb y Robert W. Storer (U.S.A.). A todos y cada uno de ellos, vaya nuestro reconocimiento.

Por último, el homenaje a los que por siempre ausentes, viven en nuestra memoria como Braulio Orejas y Pablo San Martín.

JUAN P. CUELLO

Montevideo, junio de 1985

Territorio de la República Oriental del Uruguay



Superficie terrestre	Kms. ²	176.215
Mar territorial	"	120.684
Río de La Plata	"	15.219
Río Uruguay e Islas	"	833
Laguna Merim	"	1.031
Antártida (a determinar)		
<hr/>		
Superficie parcial	Kms. ²	313.782

TOTAL DE GENEROS Y ESPECIES DE AVES EN EL URUGUAY

TAXON	GENEROS		ESPECIES
STRUTHIONIFORMES	1		1
<i>Rheidae</i>		1	1
TINAMIFORMES	2		2
<i>Tinamidae</i>		2	2
PODICIPEDIFORMES	4		4
<i>Podicipedidae</i>		4	4
PROCELLARIIFORMES	14		25
<i>Diomedeidae</i>		1	4
<i>Procellariidae</i>		9	17
<i>Oceanitidae</i>		3	3
<i>Pelecanoididae</i>		1	1
SPHENISCIFORMES	2		2
<i>Spheniscidae</i>		2	2
PELECANIFORMES	4		7
<i>Fregatidae</i>		1	1
<i>Phalacrocoracidae</i>		1	4
<i>Anhinginae</i>		1	1
<i>Sulidae</i>		1	1
CICONIIFORMES	16		19
<i>Ardeidae</i>		8	11
<i>Ardeinae</i>		4	7
<i>Nycticoracinae</i>		1	1
<i>Tigrisomatinae</i>		1	1
<i>Botaurinae</i>		2	2
<i>Ciconiidae</i>		3	3
<i>Plataleidae</i>		5	5
<i>Threskiornithinae</i>		4	4
<i>Plataleinae</i>		1	1

TAXON	GENEROS	ESPECIES
PHOENICOPTERIFORMES	1	1
<i>Phoenicopteridae</i>	1	1
ANSERIFORMES	13	22
<i>Anhimidae</i>	1	1
<i>Anatidae</i>	12	21
<i>Anserinae</i>	3	4
<i>Anatinae</i>	9	17
CATHARTIFORMES	3	4
<i>Vulturidae</i>	3	4
ACCIPITRIFORMES	13	19
<i>Accipitridae</i>	12	18
<i>Pandioninae</i>	1	1
<i>Accipitrinae</i>	12	18
FALCONIFORMES	2	6
<i>Falconidae</i>	2	6
GALLIFORMES	1	1
<i>Cracidae</i>	1	1
GRUIFORMES	11	17
<i>Rallidae</i>	9	15
<i>Rallinae</i>	6	9
<i>Gallinulinae</i>	2	3
<i>Fulicinae</i>	1	3
<i>Aramidae</i>	1	1
<i>Cariamidae</i>	1	1
CHARADRIIFORMES	28	55
<i>Jacanidae</i>	1	1
<i>Rostratulidae</i>	1	1
<i>Haematopodidae</i>	1	2
<i>Recurvirostridae</i>	1	1
<i>Charadriidae</i>	4	7
<i>Vanellinae</i>	1	1
<i>Charadriinae</i>	3	6

TAXON	GENEROS	ESPECIES
<i>Scolopacidae</i>	11	18
<i>Tringinae</i>	5	7
<i>Arenariinae</i>	1	1
<i>Phalaropodinae</i>	1	1
<i>Gallinagoninae</i>	1	2
<i>Calidridinae</i>	3	7
<i>Thinocoridae</i>	1	1
<i>Chionididae</i>	1	1
<i>Laridae</i>	7	21
<i>Stercorariinae</i>	1	4
<i>Larinae</i>	1	4
<i>Sternae</i>	4	12
<i>Rynchopinae</i>	1	1
COLUMBIFORMES	4	9
<i>Columbidae</i>	4	9
PSITTACIFORMES	6	7
<i>Psittacidae</i>	6	7
CUCULIFORMES	5	8
<i>Cuculidae</i>	5	8
<i>Coccyzinae</i>	2	4
<i>Crotophaginae</i>	2	3
<i>Geococcyginae</i>	1	1
STRIGIFORMES	7	9
<i>Tytonidae</i>	1	1
<i>Strigidae</i>	6	8
<i>Buboninae</i>	4	5
<i>Striginae</i>	2	3
CAPRIMULGIFORMES	6	7
<i>Nyctibiidae</i>	1	1
<i>Caprimulgidae</i>	5	6
<i>Chordeilinae</i>	2	2
<i>Caprimulginae</i>	3	4
APODIFORMES	1	1
<i>Cypseloidinae</i>	1	1

TAXON	GENEROS	ESPECIES
TROCHILIFORMES	7	7
<i>Trochilidae</i>	7	7
TROGONIFORMES	1	1
<i>Trogonidae</i>	1	1
CORACIIFORMES	2	3
<i>Alcyonidae</i>	2	3
PICIFORMES	7	8
<i>Picidae</i>	7	8
<i>Picumninae</i>	1	1
<i>Picinae</i>	6	7
PASSERIFORMES	105	160
<i>Furnariidae</i>	17	26
<i>Furnariinae</i>	4	4
<i>Synallaxinae</i>	10	19
<i>Philydorinae</i>	3	3
<i>Dendrocolaptidae</i>	2	2
<i>Formicariidae</i>	1	2
<i>Tyrannidae</i>	32	43
<i>Elaeniinae</i>	11	14
<i>Fluvicolinae</i>	15	20
<i>Tyranninae</i>	5	7
<i>Tityrinae</i>	1	2
<i>Phytotomidae</i>	1	1
<i>Hirundinidae</i>	8	11
<i>Motacillidae</i>	1	4
<i>Troglodytidae</i>	1	1
<i>Mimidae</i>	1	2
<i>Muscicapidae</i>	2	4
<i>Sylviinae</i>	1	1
<i>Turdinae</i>	1	3
<i>Emberizidae</i>	22	36
<i>Emberizinae</i>	13	22
<i>Cardinalinae</i>	2	5
<i>Thraupinae</i>	7	9

TAXON	GENEROS	ESPECIES
<i>Coerebidae</i>	4	5
<i>Vireonidae</i>	2	2
<i>Cyclarhinae</i>	1	1
<i>Vireoninae</i>	1	1
<i>Icteridae</i>	8	15
<i>Icterinae</i>	8	15
<i>Fringillidae</i>	1	3
<i>Carduelinae</i>	1	3
<i>Passeridae</i>	1	1
<i>Corvidae</i>	1	2
<i>Garrulinae</i>	1	2
TOTALES:		
No Passeriformes	161	244
Passeriformes	105	160
	266	404

LISTA DE ESPECIES

Clase **AVES** Linné, 1758

Subclase **NEORNITHES** Gadow, 1893

Superorden **PALEOGNATHAE** Pycraft, 1900

Orden **STRUTHIONIFORMES** (Latham), 1790

Suborden **Rheae** Forbes, 1884

Familia **Rheidae** Bonaparte, 1853

Género **Rhea** Brisson, 1760

Rhea americana (Linné), 1758 Ñandú
R.a. intermedia Rothschild & Chubb, 1914: (Barra Ayo. San Juan,
Colonia, Uruguay).

Orden **TINAMIFORMES** (Huxley), 1872

Familia **Tinamidae** Gray, 1840

Género **Rhynchotus** Spix, 1825

Rhynchotus rufescens Martineta
R.r. rufescens (Temminck), 1815: (São Paulo, Brasil; según Hellmayr,
1929:479).

Género **Nothura** Wagler, 1827

Nothura maculosa Perdíz común
N.m. maculosa (Temminck), 1815: (Paraguay).

Superorden **NEOGNATHAE** Pycraft, 1900

Orden **PODICIPEDIFORMES** (Fürbringer), 1888

Familia **Podicipedidae** (Bonaparte), 1831

Género **Rollandia** Bonaparte, 1856

Rollandia rolland (Quoy & Gaimard), 1824 Macá común
R.r. chilensis (Lesson), 1828: (Concepción, Chile).

Género **Podilymbus** Lesson, 1831

Podilymbus podiceps (Linné), 1758 Macá de pico grueso
P.p. antarcticus (Lesson), 1842: (Valparaíso, Chile).

Género **Podiceps** Latham, 1787

Podiceps major Macá grande
P.m. major (Boddaert), 1783: ("Cayenne": error. Montevideo, Uruguay) (1)

Orden **PROCELLARIIFORMES** Fürbringer, 1888

Familia **Diomedeidae** (Gray), 1840

Género **Diomedea** Linné, 1758

Diomedea epomophora Albatros real
Especie monotípica; *D. epomophora* Lesson, 1825: (Isla Campbell).

Diomedea melanophrys Albatros de ceja negra
D.m. melanophrys Temminck, 1828: (Cabo de Buena Esperanza).

Diomedea chlororhynchos Albatros de pico amarillo y negro
Especie monotípica; *D. chlororhynchos* Gmelin, 1789: (Mares del Cabo de Buena Esperanza).

Familia **Procellariidae** (Boie), 1826

Género **Macronectes** Richmond, 1905

Macronectes giganteus Petrel gigante
Especie monotípica; *M. giganteus* (Gmelin), 1789: (Isla de los Estados).

Macronectes halli (1) Petrel gigante
Especie monotípica; *M. halli* Mathews, 1912: (Islas Kerguelen).

Género **Fulmarus** Stephens, 1826

Fulmarus glacialoides Petrel gris plateado
Especie monotípica; *F. glacialoides* (A. Smith), 1840: (Cerca de la costa Sudafricana).

Género **Daption** Stephens, 1826

Daption capense (2) Damero del cabo
D.c. capense (Linné), 1758; (Cabo de Buena Esperanza).

Género **Pterodroma** Bonaparte, 1856

Pterodroma brevirostris (3) Petrel de Kerguelen
P.b. brevirostris (Lesson), 1831: (Sin localidad típica indicada). Cabo de Buena Esperanza, según Hellmayr & Conover, 1948, 1 (2): 74.

Género **Halobaena** Bonaparte, 1856

Halobaena caerulea Petrel azulado
Especie monotípica *H. caerulea* (Gmelin), 1789: (Océano Atlántico, 58° lat. sur).

Género **Pachyptila** (4) Illiger, 1811

Pachyptila desolata (Gmelin), 1789 ... Petrel azul de pico ancho
P.d. banksi Smith, 1840: (Mares del Cabo).

Pachyptila belcheri (5) (Mathews), 1912 Petrel azul de pico delgado
P.b. falklandica (Mathews), 1939: (Islas Malvinas).

Género **Procellaria** Linné, 1758

Procellaria cinerea (6) Petrel gris
Especie monotípica; *P. cinerea* Gmelin, 1789 (Círculo Antártico = Mares de Nueva Zelandia, lat. 48° sur).

Procellaria aequinoctialis Petrel negro de barba blanca
P.a. aequinoctialis Linné, 1758: (Cabo de Buena Esperanza).

Género **Calonectris** Mathews & Iredale, 1915

Calonectris diomedea (7) (Scopoli), 1769 Petrel ceniciento
C.d. borealis (8) (Cory), 1881: (Fuera de la Isla Chatham, Mass., Estados Unidos).

Género **Puffinus** Brisson, 1760

Puffinus gravis Petrel pardo
 Especie monotípica; *P. gravis* (O'Reilly), 1818: (Cabo Farewell y Staten Hook hasta Terranova).

Puffinus griseus Petrel oscuro
 Especie monotípica; *P. griseus* (Gmelin), 1789: (Nueva Zelandia).

Puffinus puffinus (9) Petrel blanco y negro
P.p. puffinus (Brünnich), 1764: (Islas Faeroes, Noruega).

Familia **Oceanitidae** (1) (Salvin), 1896

Género **Oceanites** Keyserling & Blasius, 1840

Oceanites oceanicus Petrel chico de las tormentas
O.o. oceanicus (Kuhl), 1820: (Georgia del Sur; según Murphy, 1918:128).

Género **Pelagodroma** Reichenbach, 1852

Pelagodroma marina Petrel de las tormentas de cara blanca
P.m. marina (Latham), 1790: (Océanos Australes = frente a la desembocadura del Río de la Plata, lat. 35° - 37° sur).

Género **Fregetta** Bonaparte, 1855

Fregetta tropica (2) Petrel de las tormentas de vientre negro
 Especie monotípica; *F. tropica* (Gould), 1844: (A los 6° 33' lat. N. 18° 8' long. W; Océano Atlántico).

Familia **Pelecanoididae** (Gray), 1871
 Género **Pelecanoides** Lacépède, 1799

Pelecanoides urinator(1) (Gmelin), 1789 Petrel zambullidor
P.u. berard (Gaimard), 1823: (Cerca de las Islas Malvinas).

Orden **SPHENISCIFORMES** Sharpe, 1891
 Familia **Spheniscidae** Bonaparte, 1831
 Género **Eudyptes** Vieillot, 1816

Eudyptes chrysocome(1) Pingüino de penachos amarillos
E.ch. chrysocome (Forster), 1781: (Islas Malvinas).

Género **Spheniscus** Brisson, 1760

Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes
 Especie monotípica; *S. magellanicus* (L.R. Forster), 1781: (Estrecho de Magallanes).

Orden **PELECANIFORMES** Sharpe, 1891
 Suborden **PELECANI** (Sharpe), 1891
 Familia **Fregatidae** Garrod, 1874
 Género **Fregata** Lacépède, 1799

Fregata magnificens Fragata
 Especie monotípica; *F. magnificens* Mathews, 1914: (Islas Galápagos)

Familia **Phalacrocoracidae** (Bonaparte), 1853
 Subfamilia **Phalacrocoracinae** Bonaparte, 1854
 Género **Phalacrocorax** Brisson, 1760

Phalacrocorax olivaceus Viguá común
P.o. olivaceus (Humboldt), 1805: (Bancos del Río Magdalena, Colombia).

Phalacrocorax albiventer Vigüá de vientre blanco
Especie monotípica; *Ph. albiventer* (Lesson), 1831: Islas Malvinas.

Subfamilia **Anhinginae** (Ridgway), 1887
Género **Anhinga** Brisson, 1760

Anhinga anhinga Vigüá víbora
A.a. anhinga (Linné), 1766: (Brasil nororiental= Río Tapajoz; según
Griscom & Greenway, 1941:103).

Familia **Sulidae** (Reichenbach), 1849
Género **Sula** Brisson, 1760

Sula leucogaster Piquero pardo
S.l. leucogaster (Boddaert), 1783: (Cayena).

Orden **CICONIIFORMES** (1) (Bonaparte), 1854

Suborden **ARDEAE** Wagler, 1831

Familia **Ardeidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Ardeinae** (Vigors), 1825

Género **Syrigma** Ridgway, 1878

Syrigma sibilatrix (1) Garza silbadora
S.s. sibilatrix (Temminck), 1824: (Paraguay y Brasil).

Género **Ardea** Linné, 1758

Ardea cocoi Garza mora
Especie monotípica; *A. cocoi* Linné, 1766: (Cayena).

Ardea alba (2) Linné, 1758 Garza blanca grande
A.a. egretta Gmelin, 1789: (Cayena).

Género **Egretta** Forster, 1817

Egretta ibis (3) Garza bueyera
E.i. ibis (Linné), 1758: (Egipto).

Egretta caerulea (4) Garza azul
Especie monotípica; *E. caerulea* (Linné), 1758: (Carolina del Sur).

Egretta thula Garza blanca chica
E.t. thula (Molina), 1782: (Chile).

Género **Ardeola** Boie, 1822

Ardeola striata (5) Garcita azulada
A.s. striata (Linné), 1758: (Surinam).

Subfamilia **Nycticoracinae** Payne & Risley, 1976

Tribu **Nycticoracini**

Género **Nycticorax** Forster, 1817

Nycticorax nycticorax (6) Garza bruja
N.n. nycticorax (Linné), 1758: (Sur de Europa).

Subfamilia **Tigrisomatinae** Payne & Risley, 1976

Género **Tigrisoma** Swainson, 1828

Tigrisoma lineatum (Boddaert), 1783 Garza colorada
T.l. marmoratum (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Subfamilia **Botaurinae** Payne & Risley, 1976

Tribu **Botaurini**

Género **Ixobrychus** Billberg, 1828

Ixobrychus involucris Mirasol chico
Especie monotípica; *I. involucris* (Vieillot), 1823: (Paraguay).

Género **Botaurus** Stephens, 1819

Botaurus pinnatus Mirasol grande
B.p. pinnatus (Wagler), 1829: (Estado de Bahía, Brasil).

Suborden **CICONIAE** Bonaparte, 1854

Familia **Ciconiidae** (Gray), 1840

Tribu **Mycteriini**

Género **Mycteria** Linné, 1758

Mycteria americana Cigüeña de cabeza pelada
Especie monotípica; *M. americana* Linné, 1758: (America calidiore
= Brasil).

Tribu **Ciconiini**

Género **Ciconia** Brisson, 1760

Ciconia maguari (1) Cigüeña común
Especie monotípica; *C. maguari* (Gmelin), 1789: (Noreste del Brasil)

Tribu **Leptoptilini**

Género **Jabiru** Hellmayr, 1906

Jabiru mycteria Juan Grande
Especie monotípica; *J. mycteria* (Lichtenstein), 1817-1818 (1819):
Brasil.

Suborden **PLATALEAE** Newton, 1884

Familia **Plataleidae** Bonaparte, 1838

Subfamilia **Threskiornithidae** (Richmond), 1917

Género **Harpiprion** Wagler, 1832

Harpiprion caerulescens Bandurria mora
Especie monotípica; *H. caerulescens* (Vieillot), 1817: (Paraguay).

Género **Theristicus** Wagler, 1832

Theristicus caudatus (Boddaert) 1783 Bandurria amarilla
T.c. hyperorius Todd, 1948: (Buena Vista, Bolivia).

Género **Phimosus** Wagler, 1832

Phimosus infuscatus Cuervillo de cara afeitada
P.i. infuscatus (Lichtenstein), 1823: (Paraguay).

Género **Plegadis** Kaup, 1829

Plegadis chihi Cuervillo común
 Especie monotípica; *P. chihi* (Vieillot), 1817: (Paraguay y campos de Buenos Aires).

Subfamilia **Plataleinae** Bonaparte, 1838Género **Platalea** Linné, 1758

Platalea ajaja(1) Espátula rosada
 Especie monotípica; *P. ajaja* Linné, 1758: (Río São Francisco, oeste del Brasil, localidad típica designada por Berlepsch, 1908:301).

Orden **PHOENICOPTERIFORMES** (1) (Fürbringer), 1888Familia **Phoenicopteridae** Bonaparte, 1831Género **Phoenicopus** Linné, 1758

Phoenicopus chilensis Flamenco común
 Especie monotípica; *P. chilensis* Molina, 1782: (Chile).

Orden **ANSERIFORMES** (Wagler), 1831Suborden **ANHIMAE** Wetmore & Miller, 1926Familia **Anhimidae** Stejneger, 1885Género **Chauna** Illiger, 1811

Chauna torquata Chajá
 Especie monotípica; *Ch. torquata* (Oken), 1816: (Paraguay y barrancas del Río de la Plata).

Suborden **ANSERES** Wagler, 1831

Familia **Anatidae** Vigors, 1825

Subfamilia **Anserinae** (Vigors), 1825

Tribu **Dendrocygnini**

Género **Dendrocygna** Swainson, 1837

Dendrocygna bicolor Pato silbón rojizo
Especie monotípica; (1) *D. bicolor* (Vieillot), 1816: (Paraguay y Buenos Aires).

Dendrocygna viduata Pato de cara blanca
Especie monotípica; *D. viduata* (Linné), 1766: (Cartagena, Colombia).

Tribu **Anserini**

Género **Cygnus** Bechstein, 1803

Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro
Especie monotípica; *C. melancoryphus* (Molina), 1782: (Chile).

Género **Coscoroba** Reichenbach, 1852

Coscoroba coscoroba Ganso blanco
Especie monotípica; *C. coscoroba* (Molina), 1782: (Chile).

Subfamilia **Anatinae** (Vigors), 1825

Tribu **Cairinini**

Género **Cairina** Fleming, 1822

Cairina moschata Pato criollo
Especie monotípica; *C. moschata* (Linné), 1758: (Brasil).

Género **Callonetta** Delacour, 1936

Callonetta leucophrys Pato de collar
Especie monotípica ; *C. leucophrys* (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Género **Amazonetta** Boetticher, 1929

Amazonetta brasiliensis (Gmelin) 1789 Pato de ala verde
A.b. ipecutiri (Vieillot), 1816: (Paraguay).

Tribu **Anatini**Género **Anas** Linné, 1758

Anas flavirostris Pato barcino
A.f. flavirostris Vieillot, 1816: (Buenos Aires).

Anas sibilatrix Pato overo
 Especie monotípica; *A. sibilatrix* Poepping, 1828: (Chile).

Anas georgica Gmelin, 1789 Pato pardo
A.g. spinicauda Vieillot, 1816: (Buenos Aires).

Anas bahamensis Linné, 1758 Pato gargantilla
A.b. rubrirostris Vieillot, 1816: (Buenos Aires).

Anas versicolor Pato capuchino
A.v. versicolor Vieillot, 1816: (Paraguay).

Anas discors Pato de ala azul
 Especie monotípica(2); *A. discors* Linné, 1766: (Virginia o Carolina, Norteamérica).

Anas cyanoptera Pato colorado
A.c. cyanoptera Vieillot, 1816: (Río de la Plata y Buenos Aires).

Anas platalea Pato espátula
 Especie monotípica; *A. platalea* Vieillot, 1816: (Paraguay y B. Aires)

Tribu **Aythiini**Género **Netta** Kaup, 1829

Netta peposaca Pato picazo
 Especie monotípica; *N. peposaca* (Vieillot), 1816: (Paraguay y Argentina).

Tribu **Oxyurini**Género **Heteronetta** Salvadori, 1865

Heteronetta atricapilla Pato de cabeza negra
Especie monotípica; *H. atricapilla* (Merrem), 1841: (Buenos Aires).

Género **Oxyura** Bonaparte, 1828

Oxyura dominica Pato sapo
Especie monotípica; *O. dominica* (Linné), 1766: (América del Sur).

Oxyura vittata Pato zambullidor
Especie monotípica; *O. vittata* (R.A. Philippi), 1860: (Chile).

Orden **CATHARTIFORMES** (Seeböhm), 1890Familia **Vulturidae** (1) (Illiger), 1811Subfamilia **Vulturinae** (Illiger), 1811Género **Cathartes** Illiger, 1811

Cathartes aura (Linné), 1758 Buitre de cabeza roja
C.a. ruficollis Spix, 1824: (Joazeiro, Bahía septentrional, Brasil; localidad típica designada por Pinto, 1938:59).

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 Buitre de cabeza amarilla
C.b. urubutinga Pelzeln, 1861: (Forte do Río Branco, Amazonas, Brasil; según Hellmayr & Conover, 1949:12).

Género **Coragyps** Geoffroy, 1853

Coragyps atratus (Bechstein), 1793 Buitre de cabeza negra
C.a. foetens (2) (Lichtenstein), 1818: (Paraguay; localidad típica restringida a Asunción por Brodtkorb, 1944:119).

Orden **ACCIPITRIFORMES** (Vieillot), 1816

Familia **Accipitridae** (Vieillot), 1816

Subfamilia **Pandioninae** Sclater & Salvin, 1873

Género **Pandion** Savigny, 1809

Pandion haliaetus (Linné), 1758 Aguila pescadora
P.h. carolinensis (Gmelin), 1788: (Carolina del Sur, Estados Unidos).

Subfamilia **Accipitrinae** (Vieillot), 1816

Género **Elanus** Savigny, 1809

Elanus leucurus Halcón blanco
E.l. leucurus (Vieillot), 1818: (Paraguay).

Género **Rosthamus** Lesson, 1830

Rosthamus sociabilis Aguila caracolera
R.s. sociabilis (Vieillot), 1817: (Corrientes y Río de la Plata).

Género **Circus** Lacépède, 1799

Circus cinereus Gavilán ceniciento
Especie monotípica(1); *C. cinereus* Vieillot, 1816: (Paraguay y cerca del Río de la Plata).

Circus buffoni Gavilán de alas largas
Especie monotípica; *C. buffoni* (Gmelin), 1788: (Cayena).

Género **Accipiter** Brisson, 1760

Accipiter striatus Vieillot, 1807 Gavilán chico
A.s. erythronemius Kaup, 1850: (Bolivia).

Accipiter bicolor (Vieillot), 1817 Gavilán pardo
A.b. pileatus (Temminck), 1823: (Isla Cachoeirinha, Río Belmonte, Bahía, Brasil; según Hellmayr, 1929: 458).

Género **Ischnosceles** Strickland, 1844

Ischnosceles caerulescens (2) (Vieillot), 1817 . . . Gavilán aplomado
I.c. flexipes (Peters), 1935: (Resistencia, Chaco, Argentina).

Género **Buteogallus** Lesson, 1830

Buteogallus urubitinga Aguila negra
B. u. urubitinga (Gmelin), 1788; (Brasil; Pernambuco, localidad típica probable, según Pinto: 1938: 76).

Buteogallus meridionalis (3) Aguila colorada
 Especie monotípica; *B. meridionalis* (4) (Latham), 1790: (Cayena).

Género **Geranoaetus** Kaup, 1844

Geranoaetus melanoleucus (5) Aguila mora
G.m. melanoleucus (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Género **Parabuteo** Ridgway, 1874

Parabuteo unicinctus Gavilán mixto
P.u. unicinctus (Temminck), 1824: (Cercanías de Río Grande, Boa Vista, Brasil).

Género **Buteo** Lacépède, 1799

Buteo magnirostris Gmelin, 1788 Gavilán común
B.m. pucherani (J. & E. Verreaux), 1855: (Paraguay, según Bourne & Chubb, 1912:68)

Buteo swainsoni Gavilán de Swainson
 Especie monotípica; *B. swainsoni* Bonaparte, 1838: (Río Columbia, Estados Unidos).

Buteo albicaudatus Aguila de cola blanca
B.a. albicaudatus Vieillot, 1816: (Paraguay; por designación de Swann, según Pinto, 1938:70).

Buteo polyosoma Aguila de lomo rojo
B.p. polyosoma (Quoy & Gaimard), 1824: (Islas Malvinas).

Orden **FALCONIFORMES** (Sharpe), 1874
 Familia **Falconidae** Vigors, 1824
 Tribu **Polyborini**
 Género **Polyborus** Vieillot, 1816

Polyborus plancus Carancho común
P.p. plancus (J. F. Miller), 1777: (Tierra del Fuego).

Polyborus chimango (1) Chimango
P.ch. chimango Vieillot, 1816: (Río de La Plata).

Polyborus chimachima Chimachima
P.ch. chimachima Vieillot, 1816: (Paraguay).

Tribu **Falconini**
 Género **Falco** Linné, 1758

Falco sparverius Linné, 1758 Halconcito común
F.s. cinnamominus Swainson, 1837: (Chile).

Falco femoralis Halcón azulado
F.f. femoralis Temminck, 1822: (Brasil).

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Halcón peregrino
F.p. cassini Sharpe, 1873: (Chile y Estrecho de Magallanes).
F.p. tundrius White, 1968: (Sherman Basin, Península de Adelaida, Canadá).

Orden **GALLIFORMES** (Temminck), 1820
 Superfamilia **Cracoidea** Amer. Ornithologists' Union,
 Familia **Cracidae** (Vigors), 1825 1931
 Género **Penelope** Merren, 1876

Penelope obscura Pava de monte
P.o. obscura Temminck, 1815: (Paraguay hasta el Río de La Plata).

Orden **GRUIFORMES** (1) (Bonaparte), 1854
 Suborden **Ralli** (Reichenbach), 1852
 Familia **Rallidae** Vigors, 1825
 Subfamilia **Rallinae** (Vigors), 1825
 Género **Pardirallus** Bonaparte, 1856

Pardirallus sanguinolentus (1) Gallineta de pico rojo y azul
P.s. sanguinolentus (Swainson), 1837: (Brasil).

Pardirallus maculatus Gallineta overa
P.m. maculatus (Boddaert), 1873: (Cayena).

Género **Aramides** Pucheran, 1845

Aramides cajanea (2) Chiricote
A.c. cajanea (P.L.S. Müller), 1776: (Cayena).

Aramides ypecaha Gallineta grande
 Especie monotípica; *A. ypecaha* (Vieillot), 1819: (Paraguay y Buenos Aires).

Género **Porzana** Vieillot, 1816

Porzana flaviventer (3) Burrito de pecho amarillo
P.f. flaviventer (Boddaert), 1783: (Cayena).

Porzana spiloptera Burrito overo
 Especie monotípica; *P. spiloptera* Durnford, 1877: (Belgrano, Buenos Aires, Argentina).

Género **Laterallus** Gray, 1855

Laterallus melanophaius Burrito de patas verdes
L.m. melanophaius (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Laterallus leucopyrrhus Burrito de patas rojas
 Especie monotípica; *L. leucopyrrhus* (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Género **Coturnicops** Gray, 1855

Coturnicops notata Burrito pintado
Especie monotípica; *C. notata* (Gould), 1841: (Río de la Plata).

Subfamilia **Gallinulinae** Gray, 1840

Género **Gallinula** Brisson, 1760

Gallinula melanops Gallineta de pico verde
G.m. melanops (Vieillot), 1819: (Paraguay).

Gallinula chloropus (Linné), 1758 Polla de agua
G.ch. galeata (Lichtenstein), 1818: (Paraguay).

Género **Porphyryla** Blyth, 1849

Porphyryla martinica Gallineta azul
Especie monotípica; *P. martinica* (Linné), 1766: (Martinica, Antillas).

Subfamilia **Fulicinae** (Nitzsch), 1820

Género **Fulica** Linné, 1758

Fulica armillata Gallareta grande
Especie monotípica; *F. armillata* Vieillot, 1817: (Paraguay).

Fulica leucoptera Gallareta de alas blancas
Especie monotípica; *F. leucoptera* Vieillot, 1817: (Paraguay y Buenos Aires).

Fulica rufifrons Gallareta de escudete rojo
Especie monotípica; *F. rufifrons* Philippi & Landbeck, 1861: (Chile).

Suborden **Grues** Bonaparte, 1854

Familia **Aramidae** Bonaparte, 1849

Género **Aramus** Vieillot, 1816

Aramus guarauna Carao
A.g. guarauna (Linné), 1766: ("In america australi" = Cayena; según Hellmayr & Conover, 1942:301).